

Book (Buff) 589.222 R41c

OAK ST. HDSF



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

589.222

R41c

The person charging this material is responsible for its return on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

University of Illinois Library

AUG 14 1969

MAY 20 1974

MAY 30 1974

FEB 26 1985

NOV 17 1984


NOV 02 1987

NOV 19 1987

JUL 13 2009

L161—O-1096

PLANTES CELLULAIRES.



CATALOGUE

RAISONNÉ

DES CHAMPIGNONS

QUI CROISSENT

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE.

PUBLICATION DE LA SOCIÉTÉ DES SCIENCES ET ARTS
DE VITRY-LE-FRANÇOIS.

CATALOGUE RAISONNÉ DES CHAMPIGNONS

QUI CROISSENT

DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MARNE,

Etabli d'après les *Classifications des Auteurs modernes*,
FRIES, QUÉLET, BOUDIER, SACCARDO.

ORNÉ DE DESSINS FAITS D'APRÈS NATURE,
LITHOGRAPHIÉS,

représentant les Types des principales Familles,

ET DE DEUX TABLEAUX DE M. E. ROZE

sur les AGARICINÉES, avec 4 planches à l'appui de sa Classification;

Suivi d'une Table Alphabétique d'environ 700 Genres

accompagnés chacun de la figure et de la dimension des spores qui les caractérisent,

ET D'UNE EXPOSITION MÉTHODIQUE DES CHAMPIGNONS
VÉNÉNEUX ET COMESTIBLES CITÉS DANS L'OUVRAGE,

Par CH. RICHON,


Membre titulaire de la Société Botanique de France, de la Société d'Agriculture,
Sciences et Arts de la Marne, et de la Société des Sciences et Arts
de Vitry-le-François.



VITRY-LE-FRANÇOIS

TYPOGRAPHIE Vve TAVERNIER ET FILS.

1889.



Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign Alternates

589.222

R4/c

A MON PETIT-FILS BIEN AIMÉ,

CHARLES RICHON,

ENCOURAGEMENT A L'ÉTUDE DE LA MYCOLOGIE.



Après trente ans de recherches sur la Mycologie, j'ai pensé qu'il convenait d'utiliser une partie de mes collections cryptogamiques en dressant un catalogue des champignons que j'ai récoltés moi-même dans le département de la Marne. Aujourd'hui, mon travail est terminé, je le présente à la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François.

Déjà en 1846, M. Léonce de Lambertye fit paraître un catalogue raisonné des plantes vasculaires du Département, publié sous les auspices de la Société d'Agriculture, Sciences et Arts de Châlons ; il résumait les découvertes de MM. de Lambertye, de Mellet, Saubinet, Levant. Périn, Royer et Jules Remy ; toutes les espèces litigieuses avaient été revues par M. Godron de Nancy ; une carte botanique de la Marne indiquant les principaux bassins et terrains géologiques avec les hauteurs et un aperçu géologique et topographique sur le Département, précédaient le texte.

Cet ouvrage remarquable conquist de nombreux

adeptes dans tous les arrondissements, et en peu d'années le chiffre des espèces découvertes ne le cédait en rien à celui de la flore parisienne.

Un tel succès me donne le courage, peut-être téméraire, de suivre l'exemple de M. de Lambertye en ce qui concerne les champignons. Je ne me dissimule pas les difficultés qui peuvent surgir et s'opposer à la réussite immédiate de mon entreprise ; elles tiennent à des causes multiples dont je signalerai les principales :

1^o L'indifférence qui s'attache à cette classe de plantes humbles et cachées comparée à la faveur accordée sans réserve, aux Phanérogames qui ornent nos parcs et nos jardins.

2^o L'opinion généralement répandue de l'inutilité ou des qualités dangereuses des Champignons.

3^o L'ignorance absolue de leur degré d'importance dans le règne végétal et de la profusion avec laquelle ils sont disséminés.

4^o La difficulté de détermination des espèces, réputée insurmontable ; enfin , la nécessité de l'emploi du microscope.

Quelques réflexions modifieront, j'en espère, les idées faussement établies sur ce sujet.

Les *Phanérogames* attirent instinctivement l'attention par leur taille élevée et par l'éclat de leurs fleurs visibles ; les plantes *Cryptogames* passent ordinairement inaperçues, cependant examinées de près, elles étonnent et intéressent au même degré le naturaliste et l'artiste, depuis le *Lycoperdon giganteum* qui mesure près d'un mètre de circonférence jusqu'aux monades et aux microbes qui atteignent à peine un millième de millimètre.

Les mucédinées surtout affectent des formes variées et élégantes dont la seule vue captive et récompense le botaniste observateur.

L'opinion, très contestable de l'inutilité et des qualités dangereuses des champignons en général, est le fait de la méfiance motivée par les accidents qui résultent de leur emploi culinaire, cela se comprend chez les gens du monde qui n'ont aucun moyen de contrôle, mais elle est sans valeur pour le botaniste destiné par ses études à en faire un choix judicieux. Du reste, cette méfiance ne vise que les champignons d'un certain volume et qui peuvent exciter la convoitise.

Une foule d'autres espèces, dont le nombre est incalculable intéressent les savants et occupent, suivant *Fries*, la plus grande place dans le règne végétal ; elles envahissent tous les milieux, même l'air qu'on respire et leur influence sur notre organisme est à cette heure l'objet de recherches fructueuses qui font honneur à la science. Envisagée sous ce point de vue, la *Mycologie* a droit au respect du botaniste et à sa préférence. Il peut sans hésiter en entreprendre l'étude certain d'arriver à la détermination des espèces avec le concours des nouvelles méthodes d'analyse, et *l'emploi constant et indispensable du microscope*. Il ne rencontrera plus les obstacles qui ont entravé la marche des anciens Mycologues privés d'ouvrages clairs et précis, de dessins fidèles et de guides expérimentés : ces éléments précieux de travail créés récemment par des naturalistes infatigables, sont désormais à sa disposition. Parmi ces derniers nous citerons : Lévêillé, Boudier, Quélet, Bernard, Mougeot, Gillet d'une part ; de Seynes, Roze, Maxime Cornu, Vantieghem, Pasteur

de l'autre ; ces courageux champions à force de travail et de persévérance ont aplani les difficultés et débrouillé un véritable chaos. Les uns habitant la campagne, ont rectifié bien des erreurs en saisissant sur place les secrets de la nature et en analysant consciencieusement les espèces ; les autres, recherchant plus spécialement au moyen des cultures en cellules les phénomènes de la physiologie végétale chez les infiniment petits, ont enrichi la science et l'humanité de précieuses découvertes ; leurs ouvrages destinés à l'étude sont écrits la plupart en français et accompagnés d'analyses dichotomiques.

Depuis 15 ans , les Sociétés savantes ont favorisé ces tendances vers la Mycologie. La Société botanique de France possède sa section de Cryptogamie et, à l'instar de l'Angleterre, organise des *Sessions* et des *Congrès Mycologiques* où sont conviées les célébrités botaniques étrangères.

De plus, une Société mycologique nouvelle s'est organisée et rayonne par toute la France , elle ne compte pas moins de 200 membres.

Ces heureuses innovations contribuent puissamment aux progrès rapides de la Cryptogamie ; l'étude des champignons est à l'ordre du jour, non seulement en France mais dans toute l'Europe et déjà (sans parler des œuvres magistrales des Tulasne, des Fries, des Berkeley, des Saccardo) des catalogues et des flores locales mycologiques existent dans les départements du Doubs, du Jura, des Vosges, de Vaucluse, des Charentes, de Seine-et-Oise, etc.

Notre catalogue du Département de la Marne vient prendre une modeste place dans cette phalange de

livres utiles ; il est patronné et publié par la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François à qui j'exprime ici toute ma reconnaissance.

Les Champignons sont des plantes cellulaires privées de chlorophylle, pourvues d'un système végétatif et d'un système de fructification.

Le système végétatif, *Mycelium*, vulgairement blanc de champignon, donne naissance au système de fructification, *Réceptacle*, chargé de porter et de protéger les organes de la reproduction *Spores*. Fries compare (abstraction faite du mode de développement) le *Mycelium* à un arbre, le *Réceptacle* au fruit, et les *Spores* aux semences.

Autrefois, le *Réceptacle* considéré comme le champignon tout entier, préoccupait seul les naturalistes et les classifications étaient basées sur sa forme, sa consistance, sa couleur, etc. Il en résultait, surtout pour les petites espèces, des erreurs et une confusion regrettables qui ont souvent causé le découragement et l'abandon de cette intéressante partie de la Cryptogamie. Aujourd'hui, sans négliger l'étude du *Mycelium* et du *Réceptacle*, on donne (de même que pour les Phanérogames) la plus haute importance aux

organes de la reproduction, et prenant pour base les caractères précieux fournis par les *Spores*, portées sur des *basides* ou renfermées dans des *thèques*, ainsi que la couleur et la forme de ces spores, on a créé de nouvelles classifications qui suppriment les difficultés anciennes.

Tous les champignons connus, le microscope aidant, ont été soumis à cette méthode et le succès le plus éclatant en a couronné l'épreuve.

C'est alors que des milliers d'espèces ignorées ou mal déterminées, appartenant aux *Pyrenomycètes*, aux *Mucédinées*, aux *Urédinées* etc., ont été casées sans peine et scientifiquement dans les cadres préparés à l'avance.

J'ai suivi avec le plus grand intérêt ces innovations utiles à la Mycologie et, chaque fois qu'elles se sont produites, j'ai dû modifier les Catalogues que j'avais coutume de renouveler chaque année.

Notre Catalogue de la Marne profite de ces changements successifs et j'ai eu soin de revoir attentivement, avant sa publication, les espèces qu'il renferme. Mes remerciements les plus sincères à mes amis Boudier, Quélet, Andréle Breton et Roze qui ont maintes fois rendu mon travail facile par leurs savants conseils et leurs communications.

Plus de 2,200 espèces et de nombreuses variétés forment le contingent des récoltes que j'ai faites pendant 30 ans dans le département; une centaine d'espèces sont de nouvelles découvertes pour la science; nous en donnons plus loin la liste alphabétique. Ce chiffre déjà respectable le serait beaucoup plus si j'avais eu dans la Marne des compagnons d'étude et de recherches :

j'estime qu'il pourrait à l'avenir être augmenté d'une centaine d'espèces par an.

Une moisson abondante et précieuse est certainement réservée à ceux qui voudront poursuivre ma tâche dans les riches contrées du département que je n'ai pu explorer. Mes investigations en effet ont été dirigées principalement dans l'arrondissement de Vitry dont le sol est composé, au sud-est, de grès verts supérieurs et d'une bande de craie-tufau ; à l'est, de craie blanche, terrain crétacé supérieur.

J'ai parcouru entre-temps les bois de la montagne de Reims reposant sur le calcaire siliceux, et quelques localités dans les autres arrondissements. En somme, les bois de Vanault-les-Dames et de Charmont, de St-Remy-en-Bouzemont, la forêt de Sermaize à St-Dizier, les plantations de pins sylvestres qui couvrent le sol crayeux entre la Moivre et Vitry-le-François, les terrains d'alluvion avec les parties boisées qui bordent les cours d'eau, les plateaux élevés qui dominent la vallée de la Marne, de Dizy à Rilly-la-Montagne, telles sont les stations favorables que j'ai visitées si longtemps et toujours avec fruit.

On voit par cette énumération que les arrondissements d'Epernay et de Ste-Menehould sillonnés de forêts importantes font complètement défaut ; nous signalerons particulièrement aux Mycologues les bois et les marais d'Anglure, la forêt de Traconne, les marais de St-Gond, les bois de St-Martin-d'Ablois, de Montmort et la forêt d'Epernay d'une part ; de l'autre, la forêt de l'Argonne qui gagne Ste-Menehould et se prolonge jusqu'au Chatellier. Ces centres d'exploration complètement ignorés recèlent, à n'en pas douter, des

richesses qui surprendront les naturalistes et les dédommageront de leurs peines. Ils devront avant d'entreprendre ces excursions mycologiques connaître suffisamment la flore phanérogamique de la contrée et posséder des données sommaires sur la saison, l'habitat, la durée et la récolte des cryptogames. Quelques renseignements à ce sujet ne seront pas inutiles.

S'il est vrai de dire qu'il y a des champignons partout et qu'on peut en récolter toute l'année, (puisque certaines espèces, comme les Polypores ligneux, vivent de 10 à 15 ans et que les plantes mortes ou languissantes, voire même l'organisme animal n'échappent en aucun temps à leur envahissement), il faut reconnaître néanmoins, que l'apparition de chaque espèce se fait avec une régularité bien constatée, sous l'influence des milieux et de la température.

L'humidité et la chaleur modérée favorisent le développement des champignons charnus, de sorte que leur saison par excellence est la fin de l'été et l'automne. A cette époque, l'humus des bois formé par les détritiques des feuilles, les vieux troncs d'arbres, les matières azotées, les végétaux pourris en sont littéralement couverts. Chaque espèce a choisi pour croître le moment et le lieu qui conviennent à sa nature ; le Pin, le Chêne, le Charme, etc. abritent des espèces différentes ; c'est encore en automne que les plantes herbacées et les feuilles des arbres vivantes mais privées de leur vitalité première, deviennent la station spéciale des Urédinées et d'un grand nombre de Pyrénomycètes.

Au printemps, le nombre des grandes espèces est plus restreint, c'est la saison des Morilles, des Mousserons, des Pezizes.

Les grandes chaleurs de l'été et la sécheresse ralentissent ou interdisent leur végétation.

En hiver, les espèces charnues et tendres ont disparu complètement et ont fait place aux champignons (improprement dits inférieurs) à enveloppe dure, charbonneuse, *Pyrenomycètes*, ou de structure celluleuse et filamenteuse telles que les *Mucédinées*.

La végétation active et prompte des champignons est proverbiale ; on dit « pousser comme un champignon ». Un ou deux jours suffisent au développement total des *Agaricinées* charnues et des *Bolets* ; les *Lycoperdons* et les *Bovista*, dont le volume est parfois si considérable, poussent en une seule nuit ; il ne faut que quelques heures pour les *Coprins* dont l'existence totale ne dépasse pas une journée. Une pluie abondante suivie de chaleur peuple abondamment une forêt qui, la veille n'offrait aucune trace de cryptogames. C'est au botaniste à tenir compte de ces conditions atmosphériques et à visiter plusieurs fois dans une saison les mêmes localités ; son œil scrutateur doit sonder et fouiller les taillis, les replis des terrains humides, les hautes herbes, les amas de feuilles et les racines qui recèlent des espèces précieuses ; autour des habitations, les vieilles haies, les palissades, les fumiers, les fagots mis en tas, les chantiers, les caves et toutes les substances putrescibles.

La plus humble plante, avant sa décomposition complète, intéresse ; l'*Ortie* suivant Cooke donne asile à 24 espèces de champignons.

Lorsque la récolte des espèces a pour objet l'étude, on doit prendre la précaution de recueillir, sans les froisser, des échantillons de différents âges, même avec

leurs supports, sans lesquels il serait difficile de constater et d'apprécier leur parasitisme.

Il s'agit ensuite de les transporter sans encombre au logis ; pour cela faire, il est d'usage de placer les petites espèces avec un peu de mousse dans des boîtes qui tiennent dans la poche, et les grandes espèces dans la boîte traditionnelle des botanistes ou dans des paniers confectionnés exprès. Quant à moi, j'emploie un procédé rustique et primitif qui m'a rendu de bons services ; un clayon en osier, rond, de 30 centimètres de diamètre et un mouchoir assez grand en font tous les frais. Le clayon posé sur le mouchoir et les extrémités de celui-ci nouées ensemble, constituent un panier improvisé dont les parois ne froissent pas les champignons.

Quand l'excursion est terminée, je profite d'un quart d'heure de repos pour organiser solidement mon précieux colis ; j'installe une à une, sur le sol, mes trouvailles qui ont été placées sans ordre au fur et à mesure de la récolte ; puis garnissant le clayon d'une mince épaisseur de mousse ou de graminées je fais une première couche avec les champignons les plus résistants ; je les recouvre également de mousse et par dessus une seconde couche de champignons plus fragiles et ainsi de suite ; de sorte que, dans le voyage qui me reste à faire, même en voiture et en chemin de fer les espèces souffrent peu du tassement et de la pesanteur.

Aussitôt rentré à domicile je débarrasse le clayon des champignons exposés à se déformer et à moisir dans la mousse humide et je me hâte d'étudier d'abord, les individus les plus fragiles, laissant les plus fermes et les plus coriaces pour la fin.

J'ai soin de poser certaines espèces sur du papier blanc, la face fructifère tournée en bas pendant quelques heures, afin de recueillir les *spores* qui s'y déposent en masse ; je puis alors en apprécier la couleur et la forme. Je dessine dans leur état de fraîcheur les champignons charnus, putrescibles, déliquescents ou fugaces et je réserve pour mon herbier les plus résistants.

Je fais suivre ces considérations générales d'une exposition méthodique de la classification adoptée pour notre Catalogue.

Pour établir les groupes des familles, des genres et des espèces, j'ai eu recours aux classifications modernes et j'ai emprunté ce qui pouvait élever notre Catalogue à la hauteur des découvertes récentes de la Science. Ces éléments m'ont permis de dresser un cadre susceptible de donner asile à nos richesses mycologiques et à celles que les progrès de la botanique nous réservent.

La classification de Fries modifiée par le Dr Quélet pour les *Hyménomycètes*, celle de M. Boudier de Montmorency pour les *Discomycètes* et le travail gigantesque du Dr Saccardo de Padoue pour les *Pyrénomycètes* en général et pour les *Hyphomycètes*, ont été mes meilleurs guides.

Tenant compte en outre, des caractères essentiels et fondamentaux reconnus depuis peu dans quelques groupes, voire même dans quelques espèces, j'ai admis sans hésiter avec rang d'ordre, les *Plasmodiophores* de Fuckel, les *Phycomycètes* de de Bary, les *Asconémées* de Kickx et les *Onigénées* de Tulasne. Ces ordres une fois établis, j'ai groupé sans difficulté une trentaine de familles, plus de six cents genres et des milliers d'espèces récoltées dans nos parages.

La classification des champignons de la Marne que nous avons adoptée pour le Catalogue comprend trois divisions principales et un appendice, subdivisés en neuf ordres et trente familles.

Tous les champignons arrivés au terme le plus complet de leur évolution font partie des deux premières divisions ; les autres champignons sont relégués dans la troisième.

La 1^{re} division se compose des *Exospores*, champignons dont les *spores* (véritables semences) sont libres ; elle est représentée par 4 ordres « les *Hyméniés*, Quélet, les *Péridiés*, Quélet, les *Plasmodiophores*, Fuckel, et les *Hypodermés*, de Bary.

La 2^e division se compose des *Endospores*, champignons dont les spores (sporidies) sont renfermées dans des thèques (petits sacs ou utricules cellulaires) ; elle est représentée par 5 ordres, les *Phycomycètes*, de Bary ; les *Asconémés*, Kickx ; les *Onigénés*, Tulasne ; les *Cupulés*, Quélet ; les *Nuclées*, Quélet.

La 3^e division se compose des *Fungi nondum perfecti* ou champignons dont les organes de reproduction indiquent un état préformatif, très naturel d'ailleurs, dont le cycle de végétation n'est pas complet ; elle

forme un groupe de trois familles, conservées provisoirement, mais destinées à disparaître à mesure que de nouvelles découvertes permettront de les associer aux espèces parfaites dont elles dépendent ; ce sont les *Sphéropsidées*, Lévillé ; *Mélanconiées*, Berkl ; les *Hyphomycètes*, Martius. Les spores des *Sphéropsidées* sont dites *sporules* ; celles des *Mélanconiées* et des *Hyphomycètes*, *conidies*.

Enfin, sous le titre d'*Appendice* est compris un nombre très restreint de productions fongines stériles ou de nature douteuse et certaines altérations pathologiques considérées jadis comme des espèces autonomes.

Les 30 familles, dont les 9 ordres et la 3^e division se composent, sont séparées l'une de l'autre par des caractères très tranchés, signalés en partie par le Dr Quélet dans les Champignons du Jura et des Vosges et par le Dr Saccardo dans son *Sylloge Fungorum*. Dans notre tableau synoptique, nous les avons mis en regard du nom des familles ; ces caractères différentiels méritent l'attention des botanistes commençants ; ils feront bien de les consulter souvent ; en remontant ainsi à la source de la classification et en suivant scrupuleusement les tables analytiques et les *descriptions des meilleurs auteurs appuyées par de bons dessins* (comme l'a fort bien dit le Dr Quélet à la première session mycologique française en 1876), ils arriveront à la détermination exacte des espèces.

Nous faisons précéder notre catalogue :

1^o D'une énumération méthodique des principaux ouvrages que j'ai consultés de 1855 à 1887 ;

2^o De l'indication des ouvrages français qui doivent diriger les premiers pas des mycologues ;

3° D'un tableau annoté de la classification toute entière ;

4° De 6 planches de dessins d'après nature et lithographiés , accompagnés d'un texte explicatif assez étendu, représentant par ordre, les types de toutes les familles avec leurs organes de reproduction ;

5° A titre de document intéressant, deux tableaux sur les *Agaricinées*, indiquant la répartition des genres par familles d'après la couleur des spores et d'un essai de classification des *Agaricinées* par M. E. Roze ; (*)

6° De 4 planches représentant les types des familles proposées par M. Roze pour la classification des Agaricinées.

La liste des genres dressée à la fin du catalogue sera suivie de plusieurs planches représentant les spores, sporidies et conidies des espèces considérées comme types de chaque genre inscrit.

Le but que nous nous proposons est de donner aux botanistes, à l'aide de notre classification, une idée générale des organes essentiels qui caractérisent chaque famille, de les renseigner sur la répartition des genres et des espèces, enfin d'indiquer les stations naturelles des plantes et les localités où elles ont été récoltées, leur utilité, leur degré de rareté et le moment de leur apparition.

Là, se borne la prétention de notre œuvre qui ne peut être assimilée à une Flore complète ou à un cours de Mycologie.

(*) Je dois à la bienveillance et à l'amitié de l'auteur la permission de publier ce tableau.

OUVRAGES CONSULTÉS DE 1855 A 1887.

BOTANIQUE DESCRIPTIVE.

<i>Ordre 1^{er}</i> HYMÉNIÉES	{ HYMENOMYCETES EUROPÆI. — Fries. HYMENOMYCETES — SYLLOGE FUNGORUM. — Saccardo. LES CHAMPIGNONS DE FRANCE. — Gillet. LES CHAMPIGNONS DU JURA ET DES VOSGES. — Quélet. CLAVIS HYMENOMYCETUM. — Cooke et Quélet.
<i>Ordre 2^e</i> PÉRIDIÉS	{ CARPOLOGIA FUNGORUM. — Tulasne.
<i>Ordre 3^e</i> PLASMODIOPHORES	{ SYSTEMA MYCOLOGICUM. — Fries. FLORE CRYPTOLOGAMIQUE DES FLANDRES Kickx. NOTICE SUR LES MYXOMYCÈTES. — E. Roze.
<i>Ordre 4^e</i> HYPODERMÈS	{ FLORE DES FLANDRES. — Kickx. SYMBOLÆ MYCOLOGICÆ — Fuckel. FLORE FRANÇAISE. — Decandolle.
<i>Ordre 5^e</i> PHYCOMYCÈTES	{ FLORE DES FLANDRES. — Kickx. MUCORINEES. — Van Tieghem. PERONOSPORÉES. — Max-Cornu.
<i>Ordre 6^e</i> ASCONÉMÈS	{ FLORE DES FLANDRES. Kickx. SYMBOLÆ MYCOLOGICÆ. — Fuckel. DIE PILZE. — Otto Vünsche.

<i>Ordre 7^e</i> ONIGÈNÈS	{ ANN.SCIENCES NATURELLES. --Tulasne.
<i>Ordre 8^e</i> CUPULÈS	{ FLORE DU JURA ET DES VOSGES. — Quélet. NOUVELLE CLASSIFICATION DES DIS-COMYCÈTES. — Boudier. MÉMOIRE SUR LES ASCOBOLES. — Boudier. SYSTEMA MYCOLOGICUM. — Fries. MYCOLOGIA FENNICA. — Karsten.
<i>Ordre 9^e</i> NUCLÉES	{ SYLLOGE FUNGORUM. — Saccardo. Les deux premiers volumes et suppléments.
FUNGI NONDUM PERFECTI	{ Pour les SPHEROPSIDÉES et les MÉLANCONIÈES, le 3 ^e vol. du SYLLOGE FUNGORUM avec les suppléments. — Saccardo. FLORE CRYPTO GAMIQUE DES FLANDRES — Kickx. Pour les HYPHOMYCÈTES, ICONES FUNGORUM. — Corda. SYLLOGE FUNGORUM — 4 ^e vol. — Saccardo.

ICONOGRAPHIES.

- ICONES FUNGORUM. — Schœffer — Ratisbonne 1761.
 CHAMPIGNONS DE FRANCE. — Bulliard 1780-1798.
 TRAITÉ DES CHAMPIGNONS. — Paulet — 1793-1835.
 ENGLISCH FUNGI. — Sowerby — London — 1797-1815.
 ICONES SELECTÆ HYMENOMYCETUM. — Fries — 1877.
 ABBILDUNGEN DER SCHWAMME. — Krombholtz — 1831-1849.
 ICONES FUNGORUM. — Corda — Prague — 1837-1842.
 CHAMPIGNONS DE FRANCE. — Gillet.
 ATLAS DES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX ET COMESTIBLES. — Richon et Roze 1886-1887.

MYCOLOGIE GÉNÉRALE.

SYSTEMA MYCOLOGIUM. — Fries.

SYNOPSIS FUNGORUM. — Persoon.

ICONES FUNGORUM. — Corda.

SYLLOGE FUNGORUM. — Saccardo.

*Ouvrages français particulièrement recommandés
aux commençants.*

FLORE DU JURA ET DES VOSGES avec les suppléments, par
le Dr Quélet.

LES ASCOBOLES ET LES PEZIZES, par M. Boudier.

LES CHAMPIGNONS DE FRANCE, par Gillet.

LES CHAMPIGNONS DE FRANCE, par Bulliard. (Iconographie).

L'ATLAS DES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX ET COMESTIBLES
publié en commun par MM. Roze et Richon. — Année 1887.
Texte et gravures.

TABLES ANALYTIQUES DES CHAMPIGNONS, publication nou-
velle de M. N. Patouillard.

CLASSIFICATION
DES
CHAMPIGNONS

DISPOSITION GÉNÉRALE DES FAMILLES.

1^{re} DIVISION.

EXOSPORES.

1^{er} ORDRE. — **Hyméniées.** — *Quélet.*

1. **AGARICINÉES** *Fries.* Hymenium lamellé.
2. **POLYPORÉES.** *Mich.* Hymenium tubuleux ou poreux.
3. **HYDNÉES.** *Fries.* Hymenium aiguillé ou denté.
4. **AURICULARINÉES.** *Fries.* Hymenium uni et horizontal.
5. **CLAVARIÉES.** *Bull.* Hymenium uni et vertical, simple et rameux.
6. **TRÉMELLINÉES.** *Fries.* Hymenium indéfini et gélatineux.

2^e ORDRE. — **Péridiés.** — *Quelet.*

1. **NIDULARIÉES.** *Cord-Tul.* Péridium (*) à hymenium charnu. ni pulvérulent ni déliquescent.
2. **PHALLOIDÉES.** *Fries.* Péridium double, renfermant une couche de gélatine ; hymenium déliquescent,
3. **LYCOPERDINÉES.** *Fries.* Péridium à hymenium charnu puis pulvérulent.
4. **HYPOGÉES.** *Berk.* Péridium membraneux, indéhiscant ; glèbe lacuneuse, déliquescente, privée de capillitium.

3^e ORDRE. — **Plasmodiophores.** — *Fuckel.*

MYXOMYCÈTES. *de Bary.* Mycelium absent ; d'abord substance mucilagineuse, informe, fluxile, puis prenant une consistance et une forme déterminée suivant les genres.

4^e ORDRE. — **Hypodermés.** — *de Bary.*

USTILAGINÉES. *Tul.* Plantes parasites. sous épidermiques. pulvérulentes, détruisant les tissus.

URÉDINÉES. *Tul.* Plantes parasites, sous-épidermiques ne détruisant pas les tissus.

2^e DIVISION.

ENDOSPORES.

5^e ORDRE. — **Phycomycètes.** — *Kunz.* — *de Bary.*

1. **PERONOSPORÉES.** *de By.* Petites plantes filamenteuses, parasites sur les feuilles vivantes. à ramifications extérieures et intérieures terminées par des Sporangies qui contiennent les spores.

(*) *Péridium.* Enveloppe close, tapissée intérieurement par l'hymenium.

Hymenium. Membrane fructifère.

Mycelium. Tissu cellulaire composant le système végétatif des Champignons.

2. **MUCORINÉES.** *de By.* Plantes filamenteuses, parasites sur les corps qui entrent en décomposition. — Ramifications extérieures terminées par des sporanges.

6^e ORDRE. — **Asconémées.** — *Kickx.*

1. **ASCOMYCÉES.** *Kickx.* Petites plantes parasites sur les feuilles vivantes, réduites à une seule cellule ou thèque contenant les spores.

7^e ORDRE. — **Onigénés.** — *Tulasne.*

1. **ONIGÉNÉES.** *Tul.* Plantes parasites sur les substances animales ; apparence de Lycoperdinées ; filaments du capillitium terminés par des thèques.

8^e ORDRE. — **Cupulés.** — *Quélet.* Discomycètes. — *Fries.*

1. **HELVELLÉES.** *Fries.* Cupules extérieures.
2. **TUBERACÉES.** *Tul.* Cupules intérieures, plissées chiffonnées.

9^e ORDRE — **Nuclées.** — *Quélet.* Pyrenomycètes. — *Fries.*

1. **PERISPORIACÉES.** *Fries.* Périthèces(1) membraneux, coriaces ou charbonneux sans ouverture.
2. **SPHÆRIACÉES.** *Fries.* Périthèces charbonneux, coriaces ou membraneux, s'ouvrant par un ostiole arrondi.
3. **HYPOCREACÉES.** *de Not.* Périthèces presque charnus, céracés-membraneux, la plupart de couleur rouge. ostiole arrondi.
4. **DOTHIDÉACÉES.** *Nitsk.* Périthèces formés par la substance du strôme (1) dans laquelle ils sont plongés ; ostiole papilliforme.

(1). Peridium des *Nuclées* et des *Sphæropsidées*.

(1) *Strôme*, parenchyme des champignons supportant ou renfermant dans sa substance plusieurs Périthèces.

5. **MICROTHYRIACÉES.** *Sacc.* Périthèces membraneux ou charbonneux, dimidiés, scutiformes; tissu à fibres rayonnantes.
 6. **LOPHIOSTOMACÉES.** *Sacc.* Périthèces charbonneux, adnés à la base ou incrustés; ostiole comprimé s'ouvrant en fente.
 7. **HYSTÉRIACÉES.** *Corda.* Périthèces oblongs ou linéaires, coriaces, ou charbonneux. — Ouverture en fente qui parcourt toute la longueur du périthèce.
- PHACIDIACÉES.** *Tul.* Périthèces en disques, s'ouvrant par fentes valviformes, simples ou multiples.

3^e DIVISION.

FUNGI NONDUM PERFECTI.


1. **SPHÆROPSIDÉES.** *Lév.* Périthèces privés de thèques, contenant des sporules portées par des basides plus ou moins manifestes.
 2. **MÉLANCONIÉES.** *Berk.* Champignons privés de périthèces et de thèques; conidies portées sur des basides variées, issues d'un substratum prolifère.
- HYPHOMYCÈTES.** *Martius.* Champignons privés de périthèces et de thèques consistant en filaments plus ou moins développés et en conidies libres.

NOTA. — Les *Fungi imperfecti* ou *nondum perfecti* des auteurs sont des champignons considérés comme des formes primitives des *Nuclées à endospores*; leurs organes de fructification sont *Exospores*, renfermés dans des conceptacles (sphæropsidées) ou libres (melanconiees, hyphomycètes).

APPENDICE.


1. **MYCELIA STERILIA.** *Fries.* Tissus fongiques . privés de fructification.
 2. **EXANTHEMATA.** *Kickx.* Altérations pathologiques dûes aux piqures d'insectes.
 3. **NOSOPHLÆA.** *Fries.* Renflements bulleux de l'épiderme des troncs et rameaux vivants, s'ouvrant par fentes et laissant échapper sous forme de corpuscules pulvérulents, les cellules désagrégées de l'écorce.
-

EXOSPORES . I^{er} Ord. Hyménies. Quelet .
I. Agaricinées .




Amanita Cæsarxa .

II. Polyporées .




Boletus edulis . *Polyporus versicolor* .

III. Hydnières .




Hydnum repandum .

IV Auricularinées .




Stereum purpureum .

V. Clavariées .



Clavaria Amethystea .

VI. Tremellinées .



Tremella Mesenterica .

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

- Fig. 1. **AMANITA CÆSAREA.** *Pers.* Etat adulte ; coupe de chapeau garni en dessous de lamelles ; état jeune, chapeau encore enveloppé par le volva ; coupe du champignon avant la rupture du volva ; basides et spores.
- Fig. 2. **BOLETUS EDULIS.** *Bull.* Etat adulte ; coupe du chapeau garni de tubes ; basides et spores.
POLYPORUS VERSICOLOR. *Fries.* Chapeaux sessiles, superposés ; chapeaux vus en dessous, sporeux ; spores vus à la loupe.
- Fig. 3. **HYDNUM REPANDUM.** *Linn.* Etat adulte ; coupe du chapeau garni d'aiguillons ; aiguillons vus à la loupe ; baside et spores.
- Fig. 4. **STEREUM PURPUREUM.** *Fries.* Champignon membraneux, à hymenium lisse, appliqué en rosace sur le bois ou réfléchi supérieurement ; basides et spores.
- Fig. 5. **CLAVARIA AMETHYSTEA.** *Bull.* Champignon vertical, rameux ; hymenium tapissant la surface des rameaux ; basides et spores.
- Fig. 6. **TREMELLA MESENERICA.** *Retz.* Champignon gélatineux, sinueux, lobé, échantillon grandeur naturelle et échantillon plus petit sur branche de peuplier ; basides globuleuses puis émettant 4 apicules terminés par les spores ; spores isolés.

PLANCHE II.

Fig. 7. **CYATHUS STRIATUS**. *Hoffm.* Deux sujets grandeur naturelle, l'un fermé par un diaphragme, l'autre ouvert; coupe d'un peridium; deux péridioles isolés; basides et spores.

Fig. 8. **PHALLUS IMPUDICUS**. *Linn.* Phallus adulte; coupe du peridium et de la columelle ou stipe; cellules réticulées du capitule grossies, grandeur 1/3.

PHALLUS CANINUS. *Fuckel.* Phallus adulte: presque de grandeur naturelle; hymenium capituliforme adhérent complètement au stipe; basides et spores.

Fig. 9. **SCLERODERMA VERRUCOSUM**. *Pers.* Peridium globuleux, verruqueux; 1/3 grand nat. spore brune, entourée d'une bordure transparente; basides piriformes et tétraspores.

LYCOPERDON EXCIPULIFORME. *Scop.* Peridium muni d'un pédicule très développé, couvert d'aspérités coniques; basides renflées portant deux longs apicules sporifères; spore tuberculeuse avec apicule; spore libre, brune-verdâtre.


Fig. 10. **RHIZOPOGON LUTEOLUS**. *Fries.* Peridium 1/2 grand. nat. lisse, fendillé; coupe. glébe jaune-verdâtre; hymenium labyrinthiforme; basides et spores; spores isolées.

Fig. 11. **DICTYDIUM UMBILICATUM**. *Schrad.* Groupe sur bois; un peu plus grand que nature: Dictydium très développé; spores sphériques, ombiliquées.

SPUMARIA ALBA. *Pers.* Masse blanche à l'état spumeux, puis organisée en membranes et en expansions rameuses, terminées par des


EXOSPORES. II^e Ord. Péridiès. Quelet.

I. Nidularièes.




Cyathus striatus.

II. Phalloïdées.




Phallus impudicus. Cynophallus.

III. Lycoperdinées.



Scleroderma verrucosum. Lycoperdon excipuliforme.

IV. Hypogées.



Rhizopogon luteolus.

EXOSPORES. III^e Ord. Plasmodiophores. Fuckel.

I. Myxomycètes.



Dictydium umbilicatum.

Spumaria alba.

Physarum striatum.


EXOSPORES. IV^e Ord. Hypodermès. de Bary.

I. Ustilaginées.



Tilletia caries. Ustilago segetum.

II. Urédinées.



Puccinia graminis. Uredo linearis.

ENDOSPORES. V^e Ord. Phycomycètes. de Bary.

I. Peronosporées.



Peronospora Viticola. Mildew.


II. Mucorinées.



Thamnidium elegans.

END. VI^e Ord. Asconémès. Kickx.


I. Ascomycées.



Exoascus bullatus.

END. VII^e Ord. Onigénès. Tul.

I. Onigénées.



Onigena Corvina.

logettes grises, réceptacles des spores, filaments bruns ; spores libres, noires-bleuâtres, verruqueuses.

PHYSARUM STRIATUM. *Fries.* Groupe de *Physarum* un peu plus grands que nature ; peridium blanc, globuleux, ombiliqué en dessous, pédicule strié, court, épais.

PLANCHE III.

Fig. 12. **TILLETIA CARIES.** *Tul.* Epi de blé envahi : grain de blé malade sans changement de forme, brunâtre ; coupe de grain de blé rempli de spores brunes à odeur fétide ; spore globuleuse, réticulée.

USTILAGO SEGETUM. *Corda.* Epi d'avoine envahi : grains et glumes détruits, remplacés par la masse des spores noires ; spores lisses, noires, rondes-ovales.

Fig. 13. **PUCCINIA GRAMINIS.** *Pers.* Groupe de puccinia sur feuille et gaine de graminée ; groupe grossi de forme elliptique, brun ; spores brunes, pédicelles incolores.

UREDOLINEARIS. *Pers.* Stylospore de *Puccinia graminis* ; groupe allongé, jaune : stylospores sessiles, globuleuses, jaune-d'or.

Fig. 14. **PERONOSPORA VITICOLA.** *De Bary.* Feuille de vigne, envahie notamment le long des nervures, par les groupes blancs, pulvérulents de *Peronospora* (mildew.) ; groupe de filaments arborescents de *peronospora* filament arborescent isolé ; sporange isolé, émettant ses zoospores ; zoospores ciliées.

Fig. 15. **THAMNIDIUM ELEGANS.** *Link.* Groupe de *Thamnidium* dont chaque filament est terminé

par un sporange globuleux et souvent muni à son tiers inférieur d'une couronne de filaments dichotômes, deuxième sorte de fructification à petits sporanges contenant 2-3 spores ; sporange terminal isolé et spores ; sporange brisé ; couronne de rameaux dichotômes insérée sur le filament principal ; rameau dichotôme et sporanges très grossies.

Fig. 16. **EXOASCUS BULLATUS**. *Berk.* Feuille de poirier boursoufflée par la présence de l'*Exoascus* ; groupe de thèques, constituant chacune un champignon tout entier ; thèque isolée renfermant 8 spores ; spores libres.

Fig. 17. **ONIGENA CORVINA**. *Alb. et Schw.* Plume d'oiseau envahie par trois spécimens d'*onigena* un peu plus grands que nature ; *onigena* plus développé, peridium en partie détruit, laissant le capitule à nu, composé de filaments thécigères ; groupe de filaments munis de thèques terminales ; thèque isolée, très grossie, ovale, contenant de 6 à 8 spores ; spores libres.

PLANCHE IV.


Fig. 18. **MORCHELLA ESCULENTA**. *Vitt.* Morille commune, stipe épais, creux, blanchâtre, mitre ou chapeau ovale, couvert d'aréoles et de fossettes profondes, blondes ou brunes ; Thèque et paraphyse ; spore isolée.

ACETABULA ACETABULUM. *Boudier.* Acetabula en forme de coupe, ornée extérieurement de côtes anastomosées, brune ; thèque et paraphyse ; spore isolée.

Fig. 19. **TUBER MESENTERICUM**. *Vitt.* Tubercule subglobuleux, brun, couvert de verrues pyra-

ENDOSPORES. VIII^e Ord. Cupulés. Quelet.
I. Tubéracées.


19



Tuber Mesentericum. T. Cibarium.

II. Helvellées.


18



Morchella esculenta. Acetabula acetabulum.

ENDOSPORES. IX^e Ord. Nuclées. Quelet.
II. Sphériacées.

21



Melanomma pulvis pyrius.

I. Périsporiacées.


20



Phyllactinia Suffulta.

IV. Dothidéacées.


23



Scirrha rimosa. Dothidea puccinioides.

III. Hypocréacées.

22



Nectria Sinopica. Hypocrea gelatinosa.



midales ; coupe mettant à nu la glèbe blanche puis brune et marbrée de blanc ; thèque contenant 2 spores aréolées ; spore libre.

TUBER CIBARIUM. *Pers.* Tubercule de même forme, mais plus gros que le précédent ; thèque renfermant quatre spores ; spore noire, couverte d'aiguillons droits.

Fig. 20. **PHYLLACTINIA SUFFULTA.** *Sacc.* Feuille de *Corylus avellana* couverte de phyllactinia ; portion de feuille grossie ; périthèce muni d'appendices bulbeux à la base ; périthèce brisé, thèques à découvert ; thèques isolées renfermant 2-4 spores ; spores isolées.

Fig. 21. **MELANOMMA PULVIS-PYRIUS.** *Nke.* Rameau de *Corylus* envahi par le *Melanomma* ; fragment du rameau grossi ; périthèces isolés, entier et avec coupe ; groupe de thèques et paraphyses ; thèque isolée ; spores.

Fig. 22. **NECTRIA SINOPICA.** *Fries.* Groupe de *Nectria grossis*, sur sarment de lierre ; thèques et spores monostiques ou distiques ; spores isolées.

HYPOCREA GELATINOSA. *Fries.* Sur branche de *Pinus abies*, tubercules épars d'*Hypocrea*, jaunes-roux, mous ; coupe de tubercule, périthèces à la périphérie ; thèques et spores uniseptées simulant 16 spores ; spores isolées.

Fig. 23. **SCIRRHIA RIMOSA.** *Nke.* Sur chaume de phragmites, strômes de *Scirrhia* elliptiques-aigüs, grisâtres ; strôme coupé transversalement mettant à découvert les périthèces plongés dans la substance du strôme ; thèques ; spores isolées.


DOTHIDEA PUCCINIoidES. *Fries.* Rameau de buis envahi par les tubercules de *Dothidea* ; tubercules, l'un entier, l'autre coupé transversalement ; thèques tétraspores : spores isolées, incolores puis brunes.

PLANCHE V.

- Fig. 24. **MICROTHYRIUM VISCI.** *Ch. R.* Rameau de *Viscum album* envahi par les périthèces de *Microthyrium* ; portion du rameau grossi, périthèces vus à la loupe ; périthèce isolé, brisé, laissant voir les thèques disposées en rosette ; thèques octospores ; spores diverses, jeunes, adultes.
- Fig. 25. **LOPHIOSTOMA CRENATUM** *Nek.* Rameau de prunier couvert de *Lophiostoma* ; 2 périthèces grossies, dont l'un est incrusté à sa base dans le bois, libre supérieurement et l'autre coupé transversalement ; groupe de thèques et paraphyses ; thèque octospore et paraphyses ; spores libres, incolores.
- Fig. 26. **HYSTEROGRAPHIUM FRAXINI.** *de Not.* Rameau de Frêne envahi par l'*Hysterographium* ; périthèces incrustés dans l'écorce, vus à la loupe ; thèques et paraphyses ; spore jaune-d'or, murale, adulte ; spore jeune, incolore entourée d'un sacculus.
- Fig. 27. **PHACIDIUM DENTATUM.** *Kze.* Feuille de chêne, phacidium épars à la face supérieure ; portion de feuille vue à la loupe ; groupe de thèques ; thèque isolée ; spores filiformes, munies de gouttelettes, incolores.
- Fig. 28. **CYTOSPORA CHRYSOSPERMA.** *Sacc.* Rameau de peuplier abritant sous l'épiderme, les

V. Microthyriacées.


24



Microthyrium visci.

VI. Lophiostomacées.


25



Lophiostoma crenatum.

VII. Hystériacées.


26



Hysteroglyphum Fraxini.

VIII. Phacidiacées.

27




Phacidium dentatum.

FUNGI NONDUM

I. Sphéròpsidées. Lev.

28




Cytospora Chrysosperma

PERFECTI.

II. Mélanconiées. Berk.

29



Asterosporium Hoffmanni. Melanconium Hedera

III . Hyphomycètes .

30




Oidium tuckeri .

Botrytis cinerea .

Cladosporium herbarum .

MYCELIA STERILIA . Fries .


31



Sclerotium durum . *Himantia candida* .

EXANTHEMATA . Kickx .


32



Erineum acerinum . *Phyllerium vitis* .

NOSOPHLÆA . Fries .

33



Nosophlæa Alnea .

pustules de *Cytospora* ; de chaque pustule s'échappe un cirrhe de spores long, tortueux, d'un beau jaune-d'or ; sommets des pustules vus à la loupe ; pustule isolée ; hymenium de *cytospora* ; basides filiformes avec leur sporule terminale ; sporules libres.

Fig. 29. **MELANCONIUM HEDERÆ.** *Pr.* Sursarment de lierre, petites taches noires de *Melanconium* ; pustule sous-épidermique ; groupe de basides et sporules ; 2 basides et sporules très grossies ; sporules libres.

ASTEROSPORIUM HOFFMANNI. *Kze.* Rameau de hêtre envahi ; pustule sous-épidermique d'*Asterosporium* ; groupe de basides et conidies ; conidies isolées, brunes, portées par des filaments rameux, composées de lobes cloisonnés disposés en étoile.

PLANCHE VI.

Fig. 30. **CLADOSPORIUM HERBARUM.** *Link.* Tige d'*Althea officinalis* couverte de taches velues, verdâtres de *Cladosporium* ; groupe de *cladosporium* vu à la loupe ; groupe de filaments fertiles plus grossis ; spores diverses.

BOTRYTIS CINEREA. *Pers.* *Sclerotium durum* émettant à sa surface un groupe compact de *Botrytis cinerea* var. *sclerotiophila* de Saccardo ; plusieurs filaments grossis, terminés par des sporules disposées en capitule : capitule de spores plus développé ; portion de filament très grossie ; sporules libres.

OIDIUM TUCKERI. *Berk.* Sur feuilles de vignetaches blanches arachnoïdes, confluentes, formées par l'*Oïdium Tuckeri* ; groupe de fila-

ments et de sporules en chapelets ; deux chapelets plus développés, à différents âges.

Fig. 31. **HIMANTIA CANDIDA.** *Pers.* Sur feuille d'orme, expansion blanche, mince, fibrilleuse, stérile, précédant probablement l'apparition d'un corticium.

SCLEROTIUM DURUM. *Pers.* Sur tige herbacée trois tubercules sclérotiques, grandeur naturelle ; coupe d'un sclérote noir, ridé extérieurement et de substance blanche, dure intérieurement ; tissu sclérotique vu au microscope ; les sclérotés sont des mycelium concentrés, destinés à donner naissance (après un laps de temps variable) à différentes espèces de champignons (agaries, pezizes, typhula, etc).

Fig. 32. **PHYLLERIUM VITIS.** *Fries.* Feuille de vigne dont la face inférieure présente des groupes de filaments d'un blanc rosé ou jaunâtre qui dépriment la feuille ; fragment de feuille avec dépression et filaments plus visibles ; filaments simples, tortueux, enchevêtrés.

ERINEUM ACERINUM. *Pers.* Feuille d'acer platanoides dont la face inférieure est envahie par les groupes rougeâtres de l'Eri-neum ; filaments courts en forme de coupe ou de cône renversé, jaunes puis couleur de rouille.

Fig. 33. **NOSOPHLEA ALNEA.** *Fries.* Fragment d'écorce d'*Alnus glutinosa* dont l'épiderme est soulevé çà et là en phlyctènes sinueuses ; phlyctènes remplies de cellules désagrégées qui ressemblent à des sporules ; cellules grossies.

La Famille des **Agaricinées** de l'Ordre des **Hyméniés** est la première et en même temps la plus intéressante de la Classification.

Les espèces qui la composent ont des caractères communs et une physionomie uniforme qui permettent de les confondre ; aussi l'étude en est-elle difficile.

Persoon est le premier Mycologue à qui l'on doit la découverte des formes similaires, constantes dans certains groupes de champignons, qui ont servi de base à sa division des nombreuses espèces en Genres et en sous-Genres.

Le célèbre Fries, dans sa Classification plus récente, acceptant les Genres de Persoon, en fit des groupes distincts classés d'après la coloration des spores. Cette innovation eut le grand avantage de faciliter l'étude des Agaricinées, mais sépara certains genres qui devaient être réunis. Sa méthode paraît plus ingénieuse que naturelle.

M. Roze, dans son essai de Classification publié par la Société botanique de France, en Mars 1876, cherche

à concilier les deux méthodes au moyen de tableaux que nous mettons sous les yeux du lecteur.

L'un représente la clef de son système qui se rapproche de la Classification de Persoon ; les deux autres (faits postérieurement) intitulés *Répartition des Genres dans les Familles d'après la Coloration des spores*, sont disposés de telle sorte que les lignes transversales indiquent les Familles et les Genres qu'il a réunis, en prenant pour base la similitude de forme et de consistance du *Réceptacle* ; tandis que les lignes ou bandes longitudinales contiennent les Familles et les Genres différents qui possèdent des spores de même coloration et souvent de même forme.

Ces tableaux ainsi construits permettent de recueillir d'un seul coup d'œil, les renseignements de premier ordre nécessaires à l'analyse et à la détermination des Agaricinées.

LES CHAMPIGNONS DE LA FRANCE (HYMÉNOMYCÈTES).
 Agaricinées.

Répartition des genres par familles d'après la couleur des spores.

Tableau I.

Tribus & Familles.	Spores blanches, grises ou jaune-pâle.	Spores roses.	Spores brun-pourpre.	Spores noires.	Spores ochracées.
†. APLOPHYLLÉES					
★. AMALOPILÉES					
A. <i>Libérolamelles</i>					
1. Amanitées	<i>Amanita</i>	»	»	»	»
2. Psalliotées	»	»	<i>Psalliota</i>	»	»
3. Volvariées	<i>Amanitopsis</i>	<i>Volvaria</i>	<i>Chitonina</i>	<i>Montagnites</i>	»
4. Annulariées	<i>Lepiota</i>	<i>Chamaeota</i>	»	<i>Coprinus</i>	»
5. Plutéinées	»	<i>Pluteus</i>	»	»	<i>Pluteolus</i>
B. <i>Connexolamelles</i>					

7. Mycénées	<i>Mycena</i>	<i>Nolanea</i>	<i>Psathyra</i>	<i>Panæolus</i> <i>Psathyrella</i>	<i>Bolbitius</i> <i>Galera</i> <i>Tubaria</i>
8. Omphaliées	<i>Omphalia</i>	<i>Eccilia</i>	<i>Deconica</i>	»	»
9. Craterellacées	<i>Craterellus</i>	»	»	»	»
10. Marasmiées	<i>Marasmius</i>	»	»	»	»
β. Sarcopodées					
α. <i>Crassilamellées</i>					
11. Russulariées	<i>Lactarius</i> <i>Russula</i>	»	»	»	»
12. Hygrophorées	<i>Hygrophorus</i>	»	»	<i>Gomphidius</i>	<i>Nyctalis</i>
	<i>Lepista</i> <i>Cantharellus</i>	»	»	»	<i>Paxillus</i>
	<i>Xérotus</i>	»	»	»	»
13. Cantharellidées	<i>Phlebotus</i> <i>Trogia</i>	»	»	»	»
14. Ptychellacées	»	»	»	»	<i>Ptychella</i>

Agaricinées

Répartition des genres par familles d'après la couleur des spores (Suite).


Tableau II.

Tribus & Familles	Spores blanches, grises ou jaune-pâle	Spores roses	Spores brun-pourpre	Spores noires	Spores ochracées.
† APLOPHYLLÉES (Suite)					
★ AMALOPILÉES (Suite)					
B. <i>Conexolamellées</i> (Suite)					
β. <i>Sarcopodées</i> (Suite)					
b. <i>Tenuilamellées</i>					
15. Locellinées	»	»	»	»	<i>Locellina</i>
16. Armillariées	<i>Armillaria</i>	»	<i>Stropharia</i>	»	<i>Pholiota</i>
17. Cortinariées	<i>Cortinellus</i>	»	<i>Hypopholoma</i>	»	<i>Cortinarius</i>
18. Inocybées	»	»	»	»	<i>Inocybe</i>

20. Clitopilees	<i>Clitocybe</i>	<i>Clitopilus</i>	»	»	»	»
21. Lentinées	<i>Lentinus</i>	»	»	»	»	»
22. Pleuropodées	<i>Pleurotus</i>	»	»	»	»	<i>Crepidotus</i>
23. Hyptiotées	<i>Hyptiotus</i>	<i>Claudopus</i>	»	»	»	»
★★ XYLOPHILÉES						
24. <i>Lenzitéacées</i>	<i>Lenzites</i>	»	»	»	»	»
†† DIPOPHYLLÉES						
25. <i>Schizopphyllacées</i>	<i>Schizophyllum</i>	»	»	»	»	»

Agaricinées .

Types des Familles .



1

Amanitées.



2

Psalliotées.



3

Volvariées.



4

Annulariées.



5

Plutéinées.



6

Collybiées.


Agaricinées .

Types des Familles .



7

Mycénées.



8

Omphaliées.



9

Cratèrellacées.



10

Marasmiées.



11

Russulariées.



12

Hygrophorées.

Agaricinées .

Types des Familles .



13

Cantharellidées .




14

Ptychellacées .




15

Locellinées .




16

Armillariées .



17

Cortinariées .




18

Inocybées .

Agaricinées .

Types des Familles .



19

Tricholomées .



20

Clitopilées .



21

Lentinées .



22

Pleuropodées .

Hyptiotées .




23



24

Lenzitèacées .



25

Schizophyllacées .

ESSAI D'UNE CLASSIFICATION DES AGARICINÉES.

E. Roze.

CLEF DU SYSTÈME.

AGARICINÉES

SCHIZOPHYLLÉES HOLOPHYLLÉES

(*Lamelles fendues.*) (*Lamelles entières.*)

CHONDROPODÉES

(*Stipe cartilagineux.* *Tissu du stipe et du chapeau*
hétérogène)

SARCOPODÉES

CRASSILAMELLÉES TENUILAMELLÉES

(*Lamelles épaisses soudées* (*Lamelles minces, libres*).
ou anastomosées.)

LIBÉROSTIPTÉES

CINCTOSTIPTÉES

(*Lamelles sans adhérence* (*Lamelles adhérentes au*
avec le stipe et dépourvues *stipe et sans voile, ou*
de voile.) *libres mais voilées.*)

Suivant le tableau de la Classification proposée par M. Roze , les **Agaricinées** sont divisées en **25 Familles** distinctes l'une de l'autre par des caractères différentiels. Nous essayons de mettre ces caractères en évidence en reproduisant les dessins pris sur nature de la coupe des 25 Champignons-types dont voici la liste par numéro d'ordre :

1. AMANITA CÆSAREA. <i>Schæff.</i>	Fam. Amanitées.
2. PSALLIOTA CAMPESTRIS. <i>Lin.</i>	— Psalliotées.
3. VOLVARIA BOMBYCINA. <i>Schæff.</i>	— Volvariées.
4. LEPiota PROCERA. <i>Scop.</i>	— Annulariées.
5. PLUTEUS CERVINUS. <i>Hoff.</i>	— Plutéinées.
6. COLLYBIA DRYOPHILA. <i>Bull.</i>	— Collybiées.
7. MYCENA FLAVIPES. <i>Quélet.</i>	— Mycénées.
8. OMPHALIA FIBULA. <i>Bull.</i>	— Omphaliées.
9. CRATERELLUS TUBÆFORMIS. <i>Schæff.</i>	— Craterellacées.
10. MARASMIUS ROTULA. <i>Scop.</i>	— Marasmiées.
11. RUSSULA INTEGRA. <i>Lin.</i>	— Russulariées.
12. HYGROPHORUS EBURNEUS. <i>Bull.</i>	— Hygrophorées.
13. CANTHARELLUS CIBARIUS. <i>Fries.</i>	— Cantharellidées.
14. PTYCHELLA OCRACEA. <i>Roze.</i>	— Ptychellacées.
15. LOCELLINA ALEXANDRI. <i>Gillet.</i>	— Locellinées.

- | | |
|---|---------------------|
| 16. ARMILLARIA MELLEA. <i>Fl. D.</i> | — Armillariées. |
| 17. CORTINARIUS CINEREO-VIOLACEUS. <i>Pers.</i> | — Cortinariées. |
| 18. INOCYBE AMARA. <i>Alb. et Schw.</i> | — Inocybées. |
| 19. TRICHOLOMA TERREUM. <i>Schæff.</i> | — Tricholomées. |
| 20. CLITOCYBE CLAVIPES. <i>Pers.</i> | — Clitopilées. |
| 21. LENTINUS COCHLEATUS. <i>Pers.</i> | — Lentinées. |
| 22. PLEUROTUS CORTICATUS. <i>Fries.</i> | — Pleuropodées. |
| 23. CLAUDOPUS VARIABILIS. <i>Pers.</i> | — Hyptiotées. |
| 24. LENZITES ABIETINA. <i>Bull.</i> | — Lenziteacées. |
| 25. SCHIZOPHYLLUM COMMUNE. <i>Bull.</i> | — Schizophyllacées. |
-

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

QUI EXISTENT DANS LE CATALOGUE.

AUTEURS

<i>Alb. et Schw.</i> — Albertini et Schweinitz.	<i>Holms.</i> — Holmskiöld.
<i>De By.</i> — De Bary.	<i>Hoff.</i> — Hoffmann.
<i>Bat.</i> — Battara.	<i>Huds.</i> — Hudson.
..... — Batsch.	<i>Hedw.</i> — Hedwig.
<i>Berk.</i> — Berkeley.	<i>Jacq.</i> — Jacquin.
<i>Bolt.</i> — Bolton.	<i>Kalch.</i> — Kalchbrenner.
<i>Brond.</i> — Brondeau.	<i>Karst.</i> — Karsten.
<i>Bull.</i> — Bulliard.	<i>Kromb.</i> — Krombholz.
<i>Cast.</i> — Castagne. — Kühn.
<i>Chail.</i> — Chaillet.	<i>L. Lin.</i> — Linné.
<i>Ch. R.</i> — Charles Richon.	<i>Lasch.</i> — Lasch.
<i>Curt.</i> — Curtis. — Lenz.
<i>D. C.</i> — De Candolle.	<i>Lév.</i> — Léveillé.
<i>Desm.</i> — Desmazières.	<i>Lib.</i> — Libert.
<i>Ditm.</i> — Dittmar.	<i>L. K.</i> — Link.
<i>Dur.</i> — Durieu de Maisonneuve	<i>Mart.</i> — Martius.
<i>Ehrh.</i> — Ehrhenberg.	<i>Mont.</i> — Montagne
<i>Fl. D.</i> — Flore Danoise.	<i>Müll.</i> — Müller.
<i>Gil.</i> — Gillet.	<i>Nees.</i> — Nees von Esenbeck
<i>Gmel.</i> — Gmelin.	<i>Noul.</i> — Noulet.
	<i>Obs.</i> — Obseck.

<i>Ott.</i> — Otto Wünsche.	<i>Schrad.</i> — Schrader.
<i>Pass.</i> — Passerini.	<i>Schulz.</i> — Schulzer.
<i>Pers.</i> — Persoon.	<i>Schum.</i> — Schumacher.
<i>Poit.</i> — Poiteau.	<i>Scop.</i> — Scopoli.
<i>Purt.</i> — Purton.	<i>Somm.</i> — Sommerfelt.
<i>Quél.</i> — Quélet.	<i>Sow.</i> — Sowerby.
<i>Rbh.</i> — Rabenhost.	<i>Str.</i> — Strauss.
<i>Reb.</i> — Rebentisch.	<i>Trog.</i> — Trog.
<i>Relh.</i> — Relhan.	<i>Tul.</i> — Tulasne.
<i>Retz.</i> — Retzius.	<i>Wallr.</i> — Wallroth
<i>Rostk.</i> — Rostkovius.	<i>Wein.</i> — Weinmann.
<i>Saund. et Schm.</i> — Saunders	<i>Wild.</i> — Willdenow.
et Schmith.	<i>Vitt.</i> — Vittadini.
<i>Schœff.</i> — Schœffler.	<i>West.</i> — Westendorp.

ABRÉVIATIONS DIVERSES.

Atl. Champ. — Atlas des Champignons vénéneux et comestibles.

C — CC — CCC. — Commun — très-commun — extrêmement commun.

R — RR — RRR. — Rare — très-rare — extrêmement rare.

P. — Page.

Pl. — Planche.

Rec. — Recueil.

T. — Table.

Alb. de l'Est.

CHAMPIGNONS

1^{re} DIVISION.

EXOSPORES.

1^{er} ORDRE. — **HYMÉNIÉES.** — *Quélet.*

1^{re} FAM. — **Agaricinées.** *Fries.*

Hymenium lamellé ; lamelles disposées en rayons.

A. Leucospori. — Spores blanches ou blanchâtres.

1^{er} GENRE. — **AMANITA.**

1. **A. CÆSAREA.** *Scop.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 7, pl. 1. — ORONGE VRAIE. — JAZERAN. — *Comestible.* — Forêts de Reims, Charmont, Trois-Fontaines. — Terrains sablonneux, calcaires-siliceux. — RR. — Été-automne.
2. **A. OVOIDEA.** *Bull.* t. 364. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 9, pl. IV. ORONGE BLANCHE. — *Comestible.*

-- Forêts des plateaux de l'arrondissement d'Epernay et de la montagne de Reims. — Août-Septembre. — RR.

Les caractères qui distinguent cette belle espèce existent au moment de l'épanouissement du chapeau ; plus tard, le large collier moelleux et fragile disparaît. Si on la récoltait dans cet état on pourrait, comme certains auteurs, la nommer improprement *A. Gloiocephala*. *A. Gigantea*.

3. **A. VIROSA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 10, pl. III. — *Vénéneux.* — Forêt de Sermaize à Cheminon. — Fin d'Août. — RRR. — Trouvée une seule fois.
4. **A. PHALLOIDES.** *Fries.* — *Kromb.* t. 28. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 12, pl. XIII. A. bulbeux. — *Bull.* — ORONGE CIGUE VERTE, PAULET. — Forêts de chênes, de charmes, etc. — *Vénéneux.* — CCC. — Été-Automne.
5. **A. VERNA.** *Bull.* t. 108. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 11, pl. XIII. — ORONGE CIGUE BLANCHE. — PAULET. — Espèce printanière qu'on trouve isolément et rarement dans les terrains sablonneux de la forêt de Maurupt à Cheminon. — Mai-Juin. — *Vénéneux.* — RRR.
6. **A. MAPPA.** *Fries.* — *Schæff.* t. 241. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 17, pl. XI. — Bois couverts ; Sermaize, Vavray-le-Petit, Cheminon, etc. — Été-Automne. — CCC. — La Var. *Alba* doit son absence de couleur aux influences atmosphériques et pour ce motif est très rare ou très commune dans certaines années.

7. **A. RECUTITA.** *Fries.* — *Gon et Rab.* t. 2. — Forêt de Maurupt. — Août-Septembre. — AR. — *Vénéneux.*
8. **A. MUSCARIA.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 14, pl. 1. — FAUSSE ORONGE. — Chapeau d'un beau rouge-orangé, feuillets, collier, volva, et débris sur le chapeau tantôt blanc de neige, tantôt légèrement teintés de jaune-citrin. — Été-Automne. — Lieux un peu humides dans toutes les forêts. — CC. — *Vénéneux.*
9. **A. PANTHERINA.** *Fries.* — *Schæf.* -- t. 90. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 20, pl. V. — Forêts de Charmont, Trois-Fontaines, Reims, etc. — Été-Automne. — CC. — *Vénéneux.*
10. **A. STRANGULATA.** *Fries.* — *Saund. et Schm.* t. 40. — Bois de Vavray-le-Petit. — RR. — Octobre. — *Comestible.*
11. **A. STROBILIFORMIS.** *Witt.* t. 9. — Pomme de pin. — Forêt d'Épernay. — A l'orée des bois, tranchées. — Automne. — R. — *Comestible.*
12. **A. RUBESCENS.** *Fries.* — *Kromb.* t. 10. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, P. 19, pl. VI. — GOLMETTE VRAIE. — Forêts de chênes, charmes, hêtres. — Été-Automne. — CCC. — On en fait un grand usage dans les pays avoisinant les forêts de l'Est du département. — *Comestible.* — La chair rougit à la cassure.
13. **A. SPISSA.** *Fries.* — *Kromb.* t. 29, f. 1-5. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 22, pl. V. — ORONGE PERLÉE. — Forêt de Sermaize — Été-Automne. — AR. — *Suspect.*

14. **A. VAGINATA**. *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 25, pl. VIII. — GRISETTE, COULEMELLE GRISE. Bois et forêts humides. — CCC. — *Comestible*. — Var. Jaune-fauve. — COULEMELLE JAUNE. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 23. pl. XIX.

2^e GENRE. — **LEPIOTA**. — *Fries*.

15. **L. PROCERA**. *Scop.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 29. pl. XX. — COULEUVRÉE, GRANDE COULEMELLE, GRISETTE. — Forêts de Sermaize, Cheminon, Épernay. — AR. — Automne. — *Comestible*.
16. **L. RACHODES**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 34. pl. XXII. — Très voisine de *L. Procera*. — Mêmes localités. — RR. — Automne. — *Comestible*.
17. **L. EXCORIATA**. *Schæff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 35. pl. XXII. — Pâturage, limite de Seine-et-Marne. — AR. — *Comestible*.
18. **L. MASTOIDEA**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 32. pl. XXII. — Bois de charmes et de hêtres. — Charmont, Cheminon. — AR. — Automne. — *Comestible*.
19. **L. FRIESII**. *Lasch.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 33. pl. XXIII. — Communiqué par M. Boudier. — R. — *Comestible*.
20. **L. BADHAMI**. *Berk. et Br.* — Album de l'Est. Ch. R. — Récolté sur le tan à Sermaize. — RR. — Suivant *Fries* odeur vireuse. — *Suspect*.
21. **L. CLYPEOLARIA**. *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 31. pl. XXI. — COULEMELLE D'EAU. — Bois humides. — Possesse, Trois-Fontaines, St-Remy-en-Bouzemont. — CC. — Automne. — *Comestible*.

22. **L. CRISTATA.** *Bolt.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze p. 32, pl. XXI. — PETITE COULEMELLE. — Bois et taillis. — St-Amand, Soulanges, Bassu, etc. — CC. — Automne. — *Suspect.*
23. **L. HOLOSERICEA.** — *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 36, pl. X. — Champs des terrains calcaires à Soulanges. — Été-Automne. — R.
24. **L. NAUCINA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 35, pl. VIII. — Pâturages — Clairières des bois. — Sermaize, St-Amand, Aulnay-l'Aître. — AC. — Automne. — *Comestible.*
25. **L. CARNEIFOLIA.** *Gill.* — Alb. de l'Est, communiqué par le Dr Reguis. — Départements du Midi, (inscrit pour mémoire).
26. **L. CEPESTIPES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Croît dans les serres chaudes sur le tan. — R. — Sermaize. — *Douteux.*
Var. Flammula, de belle couleur citrine, puis tournant au gris-livide en vieillissant, même localité.
27. **L. CARCHARIAS.** *Fries.* — Album de l'Est. Ch. R. — Bois taillis, sapinières. — St-Amand, Soulanges. — AR. — Automne. — *Comestible.*
28. **L. GRANULOSA.** *Batsch.* — Album de l'Est. Ch. R. — Bois de pins. — St-Amand, Aulnay-l'Aître. — RR. — *Comestible.*
29. **L. AMIANTHINA.** *Fries.* — Album de l'Est. Ch. R. — Lieux herbus des bois, sapinières. — CCC. — Été-Automne. — *Comestible.*
30. **L. HÆMATITES.** Alb. de l'Est. Ch. R. — Belle espèce, pourpre-noirâtre, sur le tan des allées, dans un jardin à Sermaize. — Automne — RR.

3^e GENRE. — **ARMILLARIA**. — *Fries*.

31. **A. ROBUSTA**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 60, pl. XXIV. — Lieux découverts dans les bois de pins. — RRR. — Près de Reims, 1878. — Octobre.
32. **A. CINGULATA**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. — Croît en cercles sous les saules Marceau plantés dans les bois de pins sylvestres. — St-Amand. — Automne.
33. **A. CONSTRICTA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. Ch. R. — Un seul échantillon trouvé dans les bois de pins à St-Gibrien, près de Châlons par M. Morize en 1884. — Automne.
34. **A. MELLEA**. *Fl. D.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 61, pl. XXIV. — TÊTE DE MÉDUSE. — Très commun sur les troncs coupés à ras de terre, dans les bois, les jardins ; son mycelium noir fibreux (rhizomorph) — fruitiers, vignes. — CCC. — Automne. — *Comestible* selon quelques auteurs.
35. **A. MUCIDA**. *Schrad.* — Album de l'Est. Ch. R. — Croît en groupes sur les morceaux ou troncs de hêtres exposés à la pluie. — Automne. — AR. — Charmont.

4^e GENRE. — **TRICHOLOMA**. — *Fries*.

36. **T. EQUESTRE**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. P. 77, pl. XXXII. — Bois de pins, terrains sablonneux, environs d'Epernay. — RR. — Automne 1877. — *Comestible*.
37. **T. SEJUNCTUM**. *Sow.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. P. 78, pl. XXXII. — AGARIC ÉMARGINÉ.

- Sous les chênes dans les forêts de Charmont, Trois-Fontaines, Vavray. — Automne. — CC. — *Comestible*.
38. **T. COLOSSUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté dans la Meuse sur la lisière de la Marne. Bois de pins. — RRR. — *Comestible*.
39. **T. USTALE.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. P. 83, pl. XXVII. — Bois de Vavray-le-Petit. — R. — Automne. — *Comestible*.
40. **T. PESSUNDATUM.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 81 pl. XXVIII. — Forêts de Trois-Fontaines, St-Remy-en-Bouzemont. — AR. — Automne. — *Comestible ?*
41. **T. RUSSULA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 80, pl. XXVIII. — Bois de charmes et de hêtres — Récolté à Brillon (Haute-Marne) avec le Dr Cordier, probablement dans la Marne. — R. — *Comestible*.
42. **T. RESPLENDENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Espèce rare dans nos contrées ; elle se rapproche de *T. Columbetta*. — Bois de Cheminon. — Automne.
43. **T. RUTILANS.** *Schœff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 81, pl. XXVII. — Bois de pins, environs d'Epernay, St-Martin d'Ablois. — AR. — Automne.
44. **T. PSAMMOPUS.** *Kalch.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Bois de pins sylvestres, lieux arides, St-Amand, Soulanges, Aulnay-l'Aître. — AR. — Automne.
45. **T. COLUMBETTA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze p. 87, pl. XL. — Forêt de Cheminon à Sermaize — AR. — Automne. — Espèce blanche dont le pied bleuit par le froissement. — *Comestible*.

46. **T. IMMUNDUM.** *Berk.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Bois de chênes à Vavray-le-Petit — Lieux ombragés. — R. — Automne. — Noircit en vieillissant et par le froissement.
47. **T. TERREUM.** *Sow.* — Alb. de l'Est. — Dans les bois de pins, croît en cercles très nombreux autour des arbres. — Automne et commencement de l'hiver. — CCC. — *Comestible* — peu savoureux.
Var. Album. *Argyraceum* de Bulliard. — AC. — mêmes localités.
Var. Chrysites. Feuilletés prenant une teinte citrine en vieillissant, moins fréquent, dans les sapinières sur les terrains crétacés. — Automne.
48. **T. SAPONACEUM.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 84, pl. XXIX. — Dans les bois de chênes de haute futaie. Sermaize, Charmont, montagne de Reims. — C. — Automne. — *Suspect.*
49. **T. MURINACEUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Bois de Vavray-le-Petit, de Lisse, croît isolément — espèces AR. lamelles grises ; chapeau et pédicule ornés de petites écailles noires, dressées, ressemble un peu au *T. Terreum*. — Automne.
50. **T. HORDUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Trouvé avec le précédent à Vavray-le-Petit. Sous les hêtres. — R. — Automne. — Récolté plusieurs années de suite dans l'allée du château d'Aulnay-l'Aître. — *Suspect.*
51. **T. SULFUREUM.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 77, pl. XXXI. — Commun autour des chênes dans les lieux humides des forêts. Exhale une odeur vireuse très prononcée. — Automne. — *Vénéneux.*

52. **T. BUFONIUM.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 79, pl. XXXI. — Diffère du précédent par sa teinte vergetée-bistrée et par son odeur nulle ou à peine accentuée. — Mêmes localités. — Automne. — *Vénéneux*.
53. **T. { ALBELLUM.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et
54. **T. { GAMBOSUM.** *Fries.* Roze. p. 85-87. pl.
55. **T. { GEORGII.** *Fries.* XXX. — Ces trois espèces de *Fries* connues sous le nom de MOUSSE-
RON BLANC, nous paraissent être des variétés de la même espèce. — Récolte au printemps dans les prés qui avoisinent les forêts de Charmont, St-Eulien, etc. — *Comestibles*.
56. **T. ACERBUM.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 79, pl. XXIX. — Bois de Possesse, Vanault-les-Dames, Vavray-le-Petit. — Chapeau à bords enroulés en dessous et fortement sillonnés. — AC. Automne. — *Vénéneux* selon le Dr Mougeot.
57. **T. PERSONATUM.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 88, pl. XXXIV. — Récolté dans la Meuse à la fin d'octobre, peu commun, ressemble à *T. Nudum* mais est plus robuste et strié de violet et de blanc. — *Comestible*.
58. **T. NUDUM.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 89, pl. XXXIV. — Très commun dans les bois de pins. — Automne. — Belle couleur violette changeant avec l'âge, persiste souvent dans les hivers doux. — *Comestible*.
59. **T. MELALEUCUM.** *Pers.* — Album de l'Est. — Dans les bois de pins ; le long des sentiers. — Automne. — CCC. — *Comestible*.

Var. Porphyroleucum. Moins commune. — Bayarne. Ablancourt.

60. **T. BREVIPES.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sermaize. dans les allées d'un jardin où l'on avait répandu du tan. — RR. — Automne. — *Comestible.*
61. **T. HUMILE.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Trouvé une seule fois dans un chemin herbu à St-Amand. — Le chapeau presque appliqué sur le sol est sinueux et les feuillets un peu decurrents. — RR. — Automne.
62. **T. VIRGATUM.** *Fries.* — Album de l'Est. Ch. R. — Récolté dans les bois de Sermaize et de St-Lumier. — Chapeau remarquable par les lignes noires qui vergettent la surface du chapeau. — Lamelles passant du blanc au gris sale. — R.
63. **T. SORDIDUM.** *Fries.* — Album de l'Est. Ch. R. — Cette espèce croît isolément dans les bois de pins à St-Amand, Bassu, Soulanges. — AC. — Automne. — *Comestible.*

5^e GENRE. — **CLITOCYBE.**

64. **CL. NEBULARIS.** *Batsch.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 99, pl. XXXI. — Bois de Charmont, Trois-Fontaines. — AR. — Automne. — *Suspect.*
65. **CL. CLAVIPES.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 100, pl. XXXI. — Bois de pins de la Meuse et des Vosges, probablement dans la Marne. — Plus petit que *Cl. Nebularis.* — Stipe renflé à la base. — *Suspect.*
65. **CL. ODORA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — AGARIC ANISÉ — Vient solitaire dans les forêts;

- sa présence est dévoilée par une odeur d'anis très prononcée. — CC. — Automne. — *Comestible*.
67. **CL. PHYLLOPHILA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Charmont, Cheminon, St-Remy-en-Bouzemont, etc. ; sur les feuilles de chênes pourries. — CC. — Été-Automne. — *Comestible*.
68. **CL. PITHYOPHILA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins sylvestres. — CC. — Automne. — *Comestible*.
69. **CL. DEALBATA.** *Sow.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Commun en Été et en Automne dans les sapinières ; il forme des cercles sous les pins, en compagnie des *Hebel. crustulini-forme*. — *Comestible*.
70. **CL. COFFŒATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Bois couverts de Vavray-le-Petit. — AR. — Été-Automne.
71. **CL. DECASTES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Bois de Vanault-les-Dames, Sermaize ; dans les allées et les rives herbues des tranchées. — AR. — Automne.
- Var.** à chapeau rougeâtre. — Allée de jardin à St-Amand, 1881.
72. **CL. CATINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — Dans les terrains calcaires plantés de pins, de saules Marceau. — AC. — A la fin de l'été. St-Amand, Soulanges, etc. — *Comestible*.
73. **CL. INVERSA.** *Fries.* — Atlas Champ. Ch. R. et Roze, p. 103, pl. XXXI — Dans les sapinières et les taillis qui les avoisinent. — AC. — Automne.

74. **CL. CYATHIFORMIS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 105, pl. XXXII. — Dans bois-taillis, sapinières ; présente plusieurs variétés différant seulement par la couleur qui passe du gris-fauve au bistre. — AC. — Automne. — *Comestible.*
75. **CL. EXPALLENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Même forme que le précédent, mais plus petit et de couleur blanc-sale ou grise. — AC. — Bois de Pins.
76. **CL. OBBATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les plantations de pins ; hauteurs de Bassu, Lisse, Bayarne. — Lamelles grises, décurrentes. — AC. — Automne.
77. **CL. SUAVEOLENS.** *Schum.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. P. 102, pl. XXXII. — Bois-taillis, sapinières ; St-Amand, Ablancourt, Francheville. — AC. — Très odorant surtout étant sec. — Automne. — *Comestible.*
78. **CL. FRAGRANS.** *Sow.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 103, pl. XXXII. — Dans la mousse, au pied des pins, broussailles ; St-Amand, Soulanges, etc. — AC. — Odorant. — *Comestible.*
79. **CL. METACHROUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Ch. R. — En groupes dans la mousse des plantations de conifères ; lamelles grises en vieillissant, se détachant facilement du stipe. — AR. — Automne. — *Comestible.*
80. **CL. OBSOLETA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les sapinières. — AC. Dans les Vosges. —

- R. Dans la Marne. — Automne. — *Comestible*.
81. **CL. LACCATA**. *Scop.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 100, pl. XXXIV. — Espèce très commune, surtout au pied des saules, des peupliers. — **Var. Violascens**. — Dans les forêts — Automne. — *Comestible*. — peu délicat.
82. **CL. PROXIMA**. *Boudier*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 101, pl. XXXIV. — Espèce voisine de la précédente et confondue avec elle. Elles diffèrent entre elles par la forme des spores. — *Comestible*.
83. **CL. TORTILIS**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Forêts de chênes et de charmes. Dans les chemins humides et les fossés. — Croît sans doute sur les radicelles mises à découvert. Vanault-les-Dames, Possesse, Vavray-le-Petit, etc. — C. — Été-automne.

6^e GENRE. — **COLLYBIA**. — *Fries*.

84. **COL. RADICATA**. — *Relh.* — Alb. de l'Est. — Croît isolément dans tous les bois, près des troncs pourris. Son stipe est très long et renflé en fuseau à l'extrémité inférieure. — CC. — Été-automne. — *Suspect*.
85. **COL. LONGIPES**. *Bull.* — Alb. de l'Est. — Ressemble au précédent, mais est velouté sur toute sa surface. Je ne l'ai jamais rencontré sur la craie. — Forêts de Cheminon, St-Remy-en-Bouzemont. — AC. — Automne. — *Comestible*.

86. **COL. SEMITALIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. - Aspect d'un *Tricholoma*. — Dans les bois de Vavray-le-Petit, Sermaize ; sur les sciures de bois et la terre fraîchement remuée. — AC. — Automne.
87. **COL. PLATIPHYLLA.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 159, pl. XXIX. — Dans les forêts de chênes à Cheminon, Charmont, Trois-Fontaines ; stipe terminé par une longue racine traçante. — Été-Automne. — AC. — *Indigeste*.
88. **COL. FUSIPES.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 160, pl. XLVIII. — AGARIC EN FUSEAU. — CHENIER VENTRU. — Croît en faisceaux à la base des vieux chênes. — Été-Automne. — Le *Col. œdematopus* de Schœffer n'est qu'une variété à stipe ventru. — *Comestible*.
89. **COL. MACULATA.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Récolté pour la première fois en octobre, à Sermaize près de la Colotte, en compagnie du *Cortinarius armillatus* et du *Boletus felleus* champignons également rares. — *Suspect*.
90. **COL. BUTYRACEA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Cheminon, sous les hêtres de haute futaie. — R. — Fin de l'Été. Automne. — *Suspect*.
91. **COL. VELUTIPES.** *Curt.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce, dont le stipe est brun velouté, croît en faisceaux sur les branches et troncs morts d'arbres de différentes essences, depuis le mois d'octobre jusqu'aux gelées. — Forêts, jardins. — CCC.

92. **COL. STIPITARIA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux, feuilles mortes, brindilles; dans les bois de toute nature. — CC. — Automne-Printemps.
93. **COL. TUBEROSA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Commun dans les bois de pins sylvestres, sur la mousse et sur les vieux agarics. — Stipe terminé par un sclérote. — CC. — Automne.
94. **COL. CIRRHATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les sapinières; ressemble au précédent, mais au lieu d'être terminée par un sclérote, la racine est tortueuse et fibrilleuse. — CC. — Automne.
95. **COL. CLAVA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — A la base des vieux troncs coupés à ras de terre et sur les racines exposées à l'air. — Forêts de Sermaize. — R. — Espèce très petite d'une belle couleur orangée.
96. **COL. ESCULENTA.** *Wulf.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 162, pl. XLVIII. — En automne et à la fin de l'été, dans les sapinières de Bayarne, St-Amand. — AR. — Malgré sa petite taille, — *Comestible.*
97. **COL. DRYOPHILA.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 161, pl. XLIX. — Bois, forêts et sapinières. — Sur les feuilles tombées. — Paraît toute l'année. — CCC. — Suivant le Dr Quélet *Comestible.* — Le chapeau en vieillissant donne asile au *Mucor fusiger.*
98. **COL. AMBUSTA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Trois-Fontaines et de Charmont. —

Récolté autour des lieux abandonnés où l'on a fait du charbon. — RR.

99. **COL. CONIGENA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Dans tous les bois de pins, d'Epicea. — Croît sur les cônes couverts de terre ou humides. — Pendant l'automne et même une partie de l'hiver et du printemps. — CCC.

7^e GENRE. — **MYCENA.** — *Fries.*

100. **MYC. PURA.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 168, pl. XXXIII. — Fréquent en automne. dans les lieux herbus et dans la mousse des bois de toute essence. — *Suspect.*
101. **MYC. ADONIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les brindilles, feuilles mortes. — Forêts de Cheminon, Vanault-les-Dames. — Été-Automne. — AC.
102. **MYC. CHLORANTHA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans la mousse, au pied des pins sylvestres. La Chaussée, Bayarne. — Été.
103. **MYC. LACTEA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Bois couverts, sapinières, dans la mousse. — Automne. — CC.
104. **MYC. RUGOSA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs pourris de vieux saules. — Partout. — Automne et hiver. — CCC.
105. **MYG. GALERICULATA.** *Scop.* — Alb. de l'Est. — Cespiteux sur les vieux troncs. — Sermaize. St-Remy-en-Bouzemont, etc. — CC. — Automne.

Var. Calopus. *Fries.* — Souches. — Dans les sentiers des forêts. — Sermaize, Cheminon; dans les bois d'Aulnay-l'Aître. — Stipe variant du jaune au rouge-brun. — AR.

Var. Tenella. *Fries.* — Sur les troncs de pins coupés à ras de terre. — Taille grêle. — AR.

106. **MYC. POLYGRAMMA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Parsemé ça et là dans les forêts de chênes et de charmes. Sermaize, Cheminon, Vavray-le-Petit. — AC. — Automne. — Stipe sillonné de stries longitudinales.

107. **MYC. PARABOLICA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Cheminon à Trois-Fontaines, Vanault-les-Dames; sur les feuilles mortes, dans les lieux frais. — Automne. — AR.

108. **MYC. ALCALINA.** — *Fries.* — Alb. de l'Est. — Trouvé une seule fois sur un tronc de saule à St-Amand. — Groupe cespiteux. — Odeur alliagée ou ammoniacale. — RRR. — Automne.

109. **MYC. FILOPES.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Espèce très commune dans les bois et dans les lieux moussus des sapins. — Automne et quelquefois au printemps. — CCC.

110. **MYC. AMICTA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — Près des souches. — RR. — Automne.

111. **MYC. VITILIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans la mousse des sapinières de St-Amand à Francheville. — Automne. — AR.

112. **MYC. ACICULA.** *Schæff.* — Alb. de l'Est. — Au pied des arbres mourants et des vieilles sou-

- ches. Couleur rouge-orangée. Lamelles jaunes.
— CC. — Automne. — St-Amand, Lisse, Soulanges, etc.
113. **MYC. LUTEO-ALBA.** — *Fries.* — Alb. de l'Est. — St-Amand. — Sur les aiguilles de pin et sur les feuilles mortes ; dans les plantations de saules mêlés de pins sylvestres. — AR. — Automne.
114. **MYC. GALOPA.** *Schrad.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Cheminon, Trois-Fontaines, St-Remy ; sur les feuilles pourries à terre. Le stipe brisé laisse échapper une goutte lactescente. — AC. — Automne.
115. **MYC. EPIPTERIGIA.** *Scop.* — Alb. de l'Est. — Fréquent dans les forêts après les pluies. — Teinte du chapeau et du stipe jaune-citron lavé. — Visqueux. — AC. — Charmont, Vanault-les-Dames, Cheminon, etc. — Automne.
116. **MYC. RORIDA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Plus petit que le précédent, blanc, stipe jaunâtre, très visqueux, lamelles décurrentes. — Automne après les pluies. — R. — Sur les feuilles. — Sermaize.
117. **MYC. VULGARIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est — Croît sur les aiguilles de pin, dans les sapinières. — Bassu, Francheville. — AR. — Automne.
118. **MYC. DILATATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sermaize, Vavray-le-Petit, etc. — Sur les feuilles de chêne mortes. — AR. — Automne.
119. **MYC. CORTICOLA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les mousses et lichens adhérents à l'écorce

des arbres. — CCC. — En automne et pendant les hivers doux.

120. **MYC. HYEMALIS.** *Obs.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs moussus des arbres fruitiers ; jardins. — Automne-hiver. — AC.

121. **MYC. CAPILLARIS.** *Schum.* — Alb. de l'Est. — Très petite espèce à stipe capillaire. — Sur les feuilles mortes dans les forêts. — Vavray-le-Petit, Cheminon, etc. — C. — Automne.

8^e GENRE. — **OMPHALIA.**

122. **OMPH. UMBILICATA.** *Schœff.* — Alb. de l'Est. — Dans les bois de pins, sur la mousse. CCC. — Vient en groupes. — Automne.

123. **OMPH. SCYPHOIDES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur la mousse et les touffes d'herbe au pied des pins des collines de Soulanges, d'Ablancourt. — AR. — Automne.

124. **OMPH. TRICOLOR.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois à St-Amand, sur le bord d'un talus entourant un jardin. — RRR. — Fin de l'été.

125. **OMPH. UMBELLIFERA.** *L.* — Alb. de l'Est. — Espèce rare trouvée dans les terrains marécageux de St-Amand à St-Lumier-en-Champagne. — RR. — Fin de l'été.

126. **OMPH. PSEUDO-ANDROSACEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois du pont la Lisse entre St-Lumier et St-Amand. — RR. — Automne.

127. **OMPH. STELLATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Prairies de Soulanges et d'Ablancourt, bois

de Vavray-le-Petit. — Sur les racines et tiges languissantes de la grande Consoude. — Automne. — AC.

123. **OMPH. INTEGRELLA.** — *Pers.* — Alb. de l'Est. — Bois de St-Amand à St-Lumier ; ressemble un peu à la précédente. Lamelles très décurrentes. — Automne. — AR.

129. **OMPH. FIBULA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Très commun dans les bois et surtout sur la mousse qui tapisse les plantations de pins. — Été-Automne.

130. **OMPH. GRISEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans l'herbe des bois de pins sylvestres. — La Chaussée. — AR. — Automne

131. **OMPH. ATROPUNCTA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Collines plantées en pins sylvestres, entre St-Amand et Soulanges. — Cette espèce a une odeur fétide insupportable. — AR. — Été.

9^e GENRE. — **PLEUROTUS.** — *Pers.*

132. **PL. CORTICATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de noyers languissants et sur les vieux saules creux. — St-Amand, Soulanges, Vavray-le-Petit. — On ne distingue le voile annulaire que chez les jeunes sujets. — AR. — Été-Automne.

133. **PL. ULMARIUS.** *Bull.* — Atl. Champ. — Ch. R. et Roze, p. 150 , pl. XLVI. — Cette belle et grande espèce croît sur les troncs languissants de l'orme. — Je ne l'ai trouvée

qu'une seule fois dans le Département ; près du château d'Aulnay-l'Aître. — Automne. — *Comestible*.

134. **PL. OSTREATUS.** *Jacq.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 151. pl. XLVII. — OREILLE DE NOURET. — Très fréquent à l'arrière-saison sur les vieux noyers dont les branches sont quelquefois garnies dans toute leur longueur. A la suite de l'hiver rigoureux de 1880, le tiers des noyers centenaires en étaient couverts. On le rencontre aussi sur les troncs de peupliers coupés à ras de terre. — Dans ce cas, les feuillets des chapeaux situés près du sol sont attaqués par un insecte qui produit de petits tubercules glanduleux, d'où vient le nom de la variété *Pl. Glandulosus* de *Bulliard*. — Automne et hivers doux. — St-Amand, St-Lumier, Soulanges, etc. — *Comestible*.

135. **PL. SUBPALMATUS.** *Fries.* — *Sow.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs d'ormes abattus. — St-Amand, Merlaut, Soulanges. — AR. — J'ai récolté dans les bois d'Aulnay-l'Aître un échantillon à pied central de couleur rose, le chapeau était orné d'un réseau à mailles blanches, saillantes d'un très bel effet. J'ai donné alors à cet échantillon le nom d'AGARIC A RÉSEAU ; plus tard j'ai reconnu que c'était une variété remarquable de *Pl. Subpalmatus*. — Été-Automne.

136. **PL. ERYNGII.** *D. C.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 154, pl. XLVI. — RAGOULE, OREILLE DE CHARDON. — Croît sur les racines de

- l'*Eryngium campestre* à Omev, sur les bords de la route, en face du château. — RR. — *Comestible*.
137. **PL. GEOGENIUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 149, pl. XLV. — Sur la terre avoisinant les bois de pins ; Soulanges. — RR. — Automne. — *Suspect*.
138. **PL. PERPUSILLUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Petite espèce mesurant de 2 à 8 mill. sur rameau de *Pinus sylvestris* depuis longtemps dans l'herbe humide, insérée, sur le côté de la branche tournée vers le sol. — Aulnay-l'Aître. — R. — Automne.
139. **PL. PORRIGENS.** *Faund et Schm.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de pins sylvestres en décomposition ; palissades en sapin. — Aulnay-l'Aître. — RR. Automne.
140. **PL. NIDULANS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Vanault-les-Dames, Trois-Fontaines. — Sur les branches de chêne qui jonchent le sol. — AR. — Automne.
141. **PL. APPLICATUS.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Dans les jardins et les vignes, sur les échelas et les vieilles branches de chêne. — CCC.
Var. Cyphelloëformis. *Fries.* — Variété à teinte bleuâtre, stipe plus accentué. — Forêt de Maurupt. — R. — Automne.
142. **PL. DICTYORHIZUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les detritus des végétaux, brindilles de chêne, d'érable ; dans les lieux qui ont été inondés. — St-Lumier-en-Champagne, fossés du château. — RR. -- Été.

B. Hyporhodii. — Spores roses ou couleur de rouille claire.

10^e GENRE. — **VOLVARIA.** — *Fries.*

143. **VOL. BOMBYCINA.** *Schœff.* — Alb. de l'Est. — *Amanite incarnate* de Pers. — Récolté une seule fois dans l'excavation d'un vieux tronc de noyer à Bassu. — RRR. — Été. — *Comestible.*

144. **VOL. SPECIOSA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 27, pl. IX. — Solitaire, sur les décombres et detritus des jardins. — Ponthion, Favresse, Ablancourt. — R. — Été. — Automne. — *Vénéneux.*

145. **VOL. GLOIOCEPHALA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 26, pl. VII. — Bords des routes avoisinant les bois ; sur les amas de sciures mélangées à l'humus. — Vanault-les-Dames. — AR. — Été-automne. — *Vénéneux.*

146. **VOL. PARVULA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les prairies, dans les jardins, allées herbues des bois ; St-Amand, La Chaussée, St-Lumier. — Été-automne. — AC.

11^e GENRE. — **PLUTEUS.** — *Fries.*

147. **PL. CERVINUS.** *Schœffer.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 95, pl. XXXV. — Forêt de Trois-Fontaines, Charmont. Vanault-les-Dames, etc. — CC. — Automne. — *Suspect.* *

Var. Rigens. *Fries.* — Bois de St-Lumier à St-Amand. — Été-automne. — RR.

Var. Petasatus. *Fries.* — Dans les bois de Vauvaut-les-Dames, sur les sciures de bois. — AC.

148. **PL. EPHEBEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois sur un tronc d'*Alnus glutinosus* à St-Amand. — RR. — Automne.

149. **PL. PELLITUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Bois de Sermaize et de St-Amand. — R. — Automne.

150. **PL. NANUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre limoneuse des bords de la Marne, dans un bois planté d'ormes. — Soulanges. — Été. — R.

151. **PL. SEMIBULBOSUS.** *Lasch.* — Alb. de l'Est. — Trouvé une seule fois à Ablancourt dans les bois et saussaies qui bordent la Marne. — R. — Automne.

152. **PL. HISPIDULUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté en assez grand nombre sur le chemin herbu qui longe les sapinières de Bayarne à Soulanges, en 1885. — Automne. — R.

153. **PL. CHRYSOPHÆUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les écaïlles et sciures de peuplier. — Été-Automne. — CC.

154. **PL. PHLEBOPHORUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Rameaux, brindilles et sciures de bois. — St-Amand, Lisse, La Chaussée, etc. — CC. — Automne.

155. **PL. LEONINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les écaïlles et morceaux de bois pourris.

St-Lumier, La Chaussée. — Moins commun que les espèces précédentes. — Automne.

12^e GENRE. — **ENTOLOMA**. — *Fries*.

156. **ENT. LIVIDUM**. *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 90, pl. XXXV. — Forêts de Sermaize, de Charmont, de Reims. — CC. — Été-Automne. — *Vénéneux*.

157. **ENT. PRUNULOIDES**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 91, pl. XXXV. — Croît isolément sur les chemins herbus près des plantations de pins. — Soulanges, Francheville. — AC. — Été-Automne. — *Suspect*.

158. **ENT. REPANDUM**. *Bull.* — Alb. de l'Est — Bois de Vanault-les-Dames. — Dans les sentiers herbus, apparence d'un *Inocybe*. — Été. — RR.

159. **ENT. RHODOPOLIUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Forêts de Cheminon, St-Remy-en-Bouzemont, Charmont, etc. — Autour des chênes. — CCC. — Automne.

160. **ENT. SERICEUM**. *Bull.* — Alb. de l'Est. — Dans les sapinières de Bassu, Francheville, etc. — CC. — Automne.

161. **ENT. JUBATUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Récolté en octobre 1885 sur les chemins herbus qui longent les pièces de pins de Bayarne à Soulanges. — AR. — *Suspect*.

13^e GENRE. — **CLITOPHILUS**. — *Fries*.

162. **CLIT. PRUNULUS**. *Scop.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 106, pl. XXXVI. — Mous-

SERON-ORCELLE. — Prés autour des bois à Vavray-le-Petit. — Se distingue du suivant par la régularité de ses formes, sa consistance plus ferme et l'épaisseur plus égale de son stipe. — AR. — Été-Automne. — *Comestible*.

163. **CLIT. ORCELLA.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 107, pl. XXXVI. — ORCELLE. — Espèce très commune dans les forêts du Département. — Son chapeau est blanc-grisâtre, luisant, sinué ; ses feuillets roses, très décurrents, sur un stipe excentrique renflé à la base. — Fin de l'Été, Automne. — Elle exhale une odeur de farine prononcée.

14^e GENRE. — **LEPTONIA.** — *Fries.*

164. **LEPT. EUCHROA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 167, pl. XXXIII. — Sur les vieux troncs pourris de saule Marceau. — Bois de St-Amand, Soulanges, Ablancourt. — C. — Automne. — Teinte du chapeau gris-bleuâtre, feuillets et stipe d'un bleu intense. — AC. — Automne.

165. **LEPT. EUCHLORA.** *Lasch.* — Alb. de l'Est. — Pelouses. collines herbues des bois de pins. — Soulanges. Bassu. — Après les pluies d'Automne. — C.

15^e GENRE. — **NOLANEA.** — *Fries.*

166. **NOL. MAMMOSA.** *L.* — Alb. de l'Est. — Récolté plusieurs fois sur la lisière d'un bois de pins, à Bassu. — RR. — Automne.

167. **NOL. ARANEOSA.** *Quélet.* — Alb. de l'Est.
— Récolté en 1873 à St-Amand, au bois du
Rupt, et plusieurs fois depuis à St-Lumier, sous
les feuilles mortes, à l'ombre des ormes et des
érables. — RR. — Automne.

16^e GENRE. — **ECCHILIA.** — *Fries.*

168. **ECC. POLITA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. —
St-Amand; sur la terre des bois ombragés. —
RR. — Été.
169. **ECC. ATROPUNCTA.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Bois de pins sylvestres. sur les colli-
nes de St-Amand. — R. Automne.

17^e GENRE. — **CLAUDOPUS.** — *Fries.*

170. **CL. VARIABILIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. —
Très commun dans tous les bois et forêts, sur
les rameaux et brindilles tombés à terre. —
Été-Automne, et hivers doux.
171. **CL. DEPLUENS.** *Batsch.* — Alb. de l'Est.
— Parasite sur les souches et troncs de pins
sylvestres, près de terre. — St-Amand, Sou-
langes. — AC. — Automne.

C. — Dermi. — Spores ferrugineuses ou ocracées.

18^e GENRE. — **PHOLIOTA.** — *Fries.*

172. **PH. CAPERATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. —
Forêts de Charmont, Sermaize, Vanault-les-Dames.
— C. — Automne. — *Comestible.*

173. **PH. EREBIA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sermaize, Vanault-les-Dames ; sur les tas de sciures exposées au soleil. Croît en groupes fasciculés. — Automne. — RR.
174. **PH. OMBROPHILA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les mêmes localités que le précédent, avec lequel il a quelque analogie. — R. — Automne.
175. **PH. TOGULARIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Prairies près des bois à La Chaussée. — RR. — Automne.
176. **PH. BLATTARIA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — St-Lumier, jardins, bords de la rivière. — AR. — Automne.
177. **PH. DURA.** *Bolt.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 63, pl. XXV. — Terrains cultivés pour jardins à la *Cense des Prés.* — Trouvé une seule fois en Été. — *Suspect.*
178. **PH. PRECOX.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 64, pl. XXX. — Croît le long des chemins herbus ; pelouses, champs de luzerne ; prés. — C. — Été-Automne.
179. **PH. GIBBEROSA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — St-Amand, St-Lumier ; sur les souches de saules plantés près des habitations. — Fin de l'Été. — AR.
180. **PH. RADICOSA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Bois et forêts ; Possesse, Sermaize, Vavray-le-Petit, etc. Au pied des chênes. — CCC. — Été-Automne. — *Suspect.*
181. **PH. PUDICA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —

Forêt de Sermaize. simple ou cespiteux. — R.
— Automne.

182. **PH. CYLINDRICA.** *D. C.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 65, pl. XXVI. — St-Amand,
La Chaussée, Bassu. — Sur les vieux pieds de
sureau et de saule. Stipe courbe, cylindrique.
AC. — Automne. — *Comestible.*

183. **PH. ATTENUATA.** *D. C.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 66, pl. XXVI. — PIVOULADE.
— Bois de St-Amand à St-Lumier ; bords du
Fion à La Chaussée ; Jalons-les-Vignes. Sur les
troncs de peuplier coupés. — Automne. — AR.

184. **PH. DESTRUENS.** *Brond.* — Alb. de l'Est.
— Sur les bois de peuplier travaillés pour la
charpente ; croît une année ou deux après
l'abatage des arbres. Partout. — CCC. — Été-
Automne.

185. **PH. COMOSA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté
une seule fois sur des troncs de chêne mis en
tas dans une cour à St-Amand. — Automne. —
Chapeau et stipe couverts de squames grises,
stipe glabre au-dessus de l'anneau ; lamelles
blanches puis grises ; stipe courbé, chair blan-
che. — RRR.

186. **PH. AURIVELLA.** *Batsch.* — Alb. de l'Est.
— St-Amand, Lisse. Sur les saules et les noyers
languissants. — RR. — Été-Automne.

187. **PH. SQUARROSA.** *Mull.* — Alb. de l'Est. —
Récolté sur de vieux troncs de noyer et de
frêne, dans les bois de St-Lumier et à Bassuet.
R. — Automne. — *Comestible.* — Peu délicat.

188. **PH. SPECTABILIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Bois de Vanault-les-Dames, forêt de Trois-Fontaines. — Sur les souches de chêne, près du sol. — RR. — Automne. — *Comestible.*
189. **PH. ADIPOSA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bassuet, Lisse, sur les troncs de noyers. Le Baisil près d'Epernay, communiqué par M. Royer, mycologue. — *Suspect.*
190. **PH. MURICATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Vanault-les-Dames. — Sur les monceaux de sciures de bois exposés depuis plusieurs années au soleil et à l'humidité. — Croît en groupes nombreux, fasciculés. Récolté trois ans de suite dans la même localité. — Été-Automne. — RR.
191. **PH. MUTABILIS.** *Schæff.* — Alb. de l'Est. — Dans tous les bois; sur les souches d'arbres, près de terre, en faisceaux nombreux. — Automne. — CCC. — *Comestible fade*, selon Quélet.
192. **PH. MARGINATA.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Sapinières de St-Amand, La Chaussée, Bassu, etc. Dans la mousse qui entoure les pins. — CCC. — Automne.
193. **PH. ARRHENII.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — St-Amand, St-Lumier. — Lieux herbus, champs en friche. — AC. — Automne.
194. **PH. MYCENOIDES.** *Fries.* — Alb. de l'Est — St-Lumier; Bois humides et pâturages avoisinant la rivière; Jardins. — AC. — Été-Automne.

19^e GENRE. — **INOCYBE**. — *Fries*.

195. **IN. DULCAMARA**. *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins et plantations de saules en ligne, dans les terrains calcaires. — St-Amand, La Chaussée, Bassu, etc. Polymorphe. — CC. — Automne.
196. — **IN. PLUMOSA**. *Balt.* — Alb. de l'Est. — Bois, saussaies, à St-Amand, La Chaussée. — Automne. — AC.
197. **IN. OBSCURA** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Terrains calcaires plantés de pins. Soulanges, Bassu. — C. — Automne.
198. **IN. PYRIODORA**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Bois humides des bords du Fion ; Aulnay-l'Aître, St-Amand. Notamment sous les peupliers. — AC. — Automne.
199. **IN. CORYDALINA**. *Quélet.* — Alb. de l'Est. Forêt de Cheminon, de Charmont ; bois de Vavray-le-Petit. — Automne. — AC.
200. **IN. FLOCCULOSA**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins, dans un parc réservé à Ablancourt. Automne. — RRR.
201. **IN. FASTIGIATA**. *Schœff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 97, pl. XXI. — Bois-taillis. St-Amand, Aulnay-l'Aître. — Plus rare que *In. Rimosa*. — Automne. — *Suspect*.
202. **IN. RIMOSA**. *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 96, pl. XXI. — Forêts, bois, sapinières, jardins. — CCC. — Été-Automne. — *Suspect*.

203. **IN. GODEYI.** *Gillet.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre des bois de pins ; collines crayeuses ; chapeau et stipe lavés de rouge vermillon. — Bassu, St-Amand, Soulanges. — AR. — Automne.
204. **IN. DESTRICTA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de St-Lumier-en-Champagne , autour des peupliers , lieux humides. — Automne. — R.
205. **IN. GEOPHILA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre des bois humides. — Vanault-les-Dames, Sermaize, St-Remy-en-Bouzemont, etc. — CC. — Automne. — Chapeau blanc ou violet-lilas.
206. **IN. PETIGINOSA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides des bois couverts , taillis , forêts. — Possesse, Sermaize, St-Amand. — AC. — Automne.

20^e GENRE. — **HEBELOMA.** — *Fries.*

207. **HEB. FASTIBILE.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch, R. et Roze . p. 94 , pl. XXIII. — Bois de Vavray-le-Petit. L'échantillon que j'ai récolté avait l'aspect, le port et la couleur de *Heb. Crustuliniforme*. de plus il était muni d'un voile (cortine) très apparent. — RR. — Fin de l'été. — *Suspect.*
208. **HEB. MESOPHŒUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins des terrains calcaires ; St-Amand, Bassu, La Chaussée, etc. — CCC. — Automne.
209. **HEB. FLOS-AURANTII.** *Cornu.* — Alb. de l'Est. — Bois de St-Amand, sous les peupliers. Forêt de Sermaize , dans les sentiers humides. — AC. — Automne.

210. **HEB. CRUSTULINIFORME.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 96, pl. XXVII. — Bois couverts, forêts et notamment dans les sapinières des terrains calcaires dont le sol est jonché de champignons en cercles dits *cercles magiques*. — CCC. — Automne. — *Comestible* en Franche-Comté, suivant le Dr Mougeot.
211. **HEB. ELATUM.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Charmont, Vanault-les-Dames, St-Remy-en-Bouzemont. — AC. — Automne.
212. **HEB. NUDIPES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté dans une seule localité, dans les bois de Vanault-les-Dames; au rond-point où aboutissent les grandes tranchées. — RR. — Automne.
- 21^e GENRE. — **FLAMMULA.** — *Fries.*
213. **FL. PARADOXA.** *Gillet.* — Alb. de l'Est. — Trouvé une seule fois dans les bois de Mau-rupt. Cet agaricinée a le port d'un bolet; ses feuillets sont d'un beau jaune et son chapeau d'un brun-pourpre. — RRR. — Été.
214. **FL. GUMMOSA.** *Lasch.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides des bois de Charmont. — AR. — Été. Automne.
215. **FL. CARBONARIA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Sermaize à Cheminon, Charmont. — Lieux où l'on a fait du charbon. — Automne. — AC.
216. **FL. ALNICOLA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Bois-taillis, sur les troncs pourris d'*Alnus glutinosa*. — St-Amand, La Chaussée, etc. — CC. — Été-Automne.

217. **FL. FLAVIDA.** *Schœff.* — Alb. de l'Est. — Sur les écaïlles, racines et souches de chênes, dans les forêts. — Sermaize, Vavray, Vanault-les-Dames. — AC. — Automne.
218. **FL. CONISSANS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois-taillis, forêts, jardins. — Croît en touffes considérables sur les vieux troncs à ras de terre. — CCC. — Été. Automne.
219. **FL. TRICHOLOMA.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois dans les bois de St-Amand sur les feuilles pourries, — probablement plus fréquent dans les forêts de chênes. — AR. — Automne.
220. **FL. APICREA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sermaize, Trois-Fontaines ; cespiteux sur les souches. — C. — Été-Automne.
221. **FL. GYMNOPODIA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Les Mycologues paraissent incertains sur l'identité de cette espèce. — Je nomme ainsi le *Flammula* qui croît en groupes fasciculés sur les souches de chênes coupés à ras de terre. — Il ressemble à l'*Armillaria mellea*, mais il est privé d'anneau. — CCC. — Dans toutes les forêts. — Été-Automne.

22^e GENRE. — **NAUCORIA.** — *Fries.*

222. **N. CERODES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans la mousse et dans l'herbe des chemins et tranchées des bois. — Sermaize, Vavray, Francheville. — AC. — Été-Automne.

223. **N. MELINOIDES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Lieux herbus, bords des routes, bois de pins ; collines de Bassu, Soulanges, St-Lumier. — AC. — Automne.
224. **N. PEDIADES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Plantations de pins sylvestres de La Chaussée, Bassu, Meigneux, etc. — CC. — Automne.
225. **N. SEMIORBICULARIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Champs en friche. — Bords des chemins, prairies. — St-Amand, Aulnay-l'Aître, Ablancourt, etc. — AC. — Été-Automne. — Ressemble à un bouton d'or au milieu de la verdure.
226. **N. MYOSOTIS. Var. Tenax.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides des forêts. — Vanault-les-Dames, Sermaize, Vavray-le-Petit. — AR. — Chapeau campanulé, fauve, verdâtre à la marge ; stipe concolore ; lamelles olive. — Automne.
227. **N. ERINICEA.** — *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes de *Rosa canina*. — Dans un bois de pins bordé de broussailles à Soulanges. — Automne et hivers doux. — RR.
228. **N. SIPARIA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Très voisin du précédent ; s'en distingue par son stipe velu-hispide dans toute sa longueur.
- Le stipe de *N. Erinacea* est nu à son tiers supérieur. — RR. — Automne.
229. **N. ESCHAROIDES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois humides, bords des ruisseaux. — St-Amand, Sermaize, etc. — CCC. — Automne.

230. **N. ARVALIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Commun en automne dans les vieux champs de luzerne, sur les bords des chemins ; jardins. — Stipe terminé par une racine filiforme. — St-Amand, St-Lumier, etc.

23^e GENRE. — **GALERA.** — *Fries.*

231. **GAL. TENER.** *Schæff.* — Alb. de l'Est. — Jardins, près, lieux herbus des bois. — CCC. — Été. Automne. — Espèce extrêmement fragile.
Var. Minor. — Mêmes localités.

232. **GAL. HYPNORUM.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Forêts, bois de pins, dans la mousse. — CC. — Été. Automne.

Var. Sphagnorum. — Beaucoup plus grand. — Sermaize, tranchées des bois près du finage d'Andernay.

233. **GAL. MYCENOPSIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sermaize, Vavray. — Prés avoisinant les bois. — AR. — Automne.

24^e GENRE. — **TUBARIA.** — *Fries.*

234. **TUB. FURFURACEA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Croît en groupes sur les brindilles et sur la terre humide des bois — Partout. — Automne. — CCC.

235. **TUB. CROBULA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre des plantations de pins. vis-à-vis du château d'Aulnay-l'Aître. — RR. — Automne.

236. **TUB. INQUILINA.** **Var. Ecbola.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Collines de La Chaussée à

Francheville, sapinières. — Sur les racines des graminées et sur la mousse. — Feuilletts presque décurrents. fuligineux, brunâtres. — R. — Automne.

25^e GENRE. — **CREPIDOTUS**. — *Fries*.

237. **CREP. MOLLIS**. *Schæff*. — Alb. de l'Est. — Très commun sur les souches de peupliers déterrées et sur les troncs languissants. — Partout. — Été. Automne et quelquefois en hiver.
-

D. — Pratelli. — Spores pourpres-brunes.

26^e GENRE. — **PSALLIOTA**. — *Fries*.

238. **PS. VAILLANTII**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 46, pl. XII. — Bois de Charmont, Vanault-les-Dames, Srupt. — A. Rare. — Été. Automne. — *Comestible*.
239. **PS. ARVENSIS**. *Schæff*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 45, pl. X. — Cultivé sur couches, champs, bois, jardins. — CC. — Anneau doublé, chair blanche, immuable.
240. **PS. VILLATICA**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 49, pl. XV. — Espèce très grosse, à chapeau couvert de squames brunes, concentriques ; anneau simple, très épais, distant ; odeur fade, peu agréable. Récolté à Pargny-sur-Saulx par le Dr Mougins. — RRR.

241. **PS. HÉMORRHOIDALIS.** *Kalch.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 49, pl. XVI. — A chair rougissant à la cassure. — Lieux découverts des forêts. — RR.
242. **PS. PRATENSIS.** *Schæff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 54, pl. VIII. — Charmont, St-Eulien, etc. — Prairies avoisinant les bois. — Printemps. Été. — CC. — *Comestible.*
243. **PS. RICHONI.** *Roze.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 48, pl. XVI. — Cette espèce dont je fais ample récolte tous les ans, est exquise et possède un parfum d'anis très prononcé. — Elle croît notamment dans les caves construites depuis peu d'années et autour des granges et écuries. C'est dans les jointures des pierres qu'apparaissent les groupes de chapeaux d'une belle couleur blanche, jaunissant en vieillissant; leur développement est sans doute dû à la composition du mortier qui unit les pierres fait de terre, de chaux et de crottin de cheval. — St-Amand, St-Lumier. — Été. Automne. — Rare ailleurs.
244. **PS. COMTULA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 57, pl. XVIII. — Espèce beaucoup plus petite que les précédentes. Récolté une seule fois dans la forêt de Charmont. — Automne. — R.

27^e GENRE. — **STROPHARIA.** — *Fries.*

245. **STR. ÆRUGINOSA.** *Curt.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 87, pl. XXXIII. — Commun

dans la mousse des bois et sapinières, après les pluies d'été et d'automne. — Partout.

Var. Albocyanea, avec le type, p. 68, pl. XXXIII. — *Suspect*.

246. **STR. OBTURATA**. *Fries*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 69, pl. XV. — Champs en friche, bords des chemins, prés. — La Chaussée, St-Amand. — C. — Automne. — *Douteux*.
247. **STR. CORONILLA**. *Bull*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 69, pl. XV. — Champs, lisières des bois, collines herbues. — St-Amand, Ablancourt. — C. — Été. Automne. — *Douteux*.
248. **STR. MERDARIA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les excréments humains desséchés à l'ombre. — St-Amand. — Printemps. — RR.
249. **STR. SEMIGLOBATA**. *Batsch*. — Alb. de l'Est. — Sur le crottin de cheval. — St-Amand, Francheville, La Chaussée. — CC. — Prés, collines herbues. — Automne. — *Vénéneux*.
250. **STR. ACULEATA**. *Quélet*. — Alb. de l'Est. — Sur les tas de sciures de peupliers, dans les bois exploités depuis un an ou deux. — St-Amand, St-Lumier-en-Champagne. — Été. — Après les pluies, en compagnie d'*Hypholoma Candollecanum*. — AR. — Automne.

28^e GENRE — **HYPHOLOMA**. — *Fries*.

251. **HYPH. SUBLATERITIUM**. *Schæff*. — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 73, pl. XXV. — Allées herbues et sentiers des forêts, prés des

vieilles souches de chêne. — Vanault-les-Dames, Charmont, Trois-Fontaines. — C. — Automne. — *Vénéneux*.

252. **HYPH. EPIXANTHUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de pins sylvestres abattus. — Sapinières de Soulanges. — Automne. — R.

253. **HYPH. ELÆODES.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 74, pl. XXV. — En faisceaux sur les écailles et rameaux pourris de chêne. — Vanault-les-Dames. — AR. — Automne. — *Vénéneux*.

254. **HYPH. FASCICULARE.** *Huds.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 75, pl. XXV. — Souches de chênes, dans les forêts. CC. — Automne. — *Vénéneux*.

255. **HYPH. LACRYMABUNDUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois humides, près, jardins. — Automne. — CCC. — *Douteux*.

256. **HYPH. PYROTRICHUM.** *Holms.* — Alb. de l'Est. — Bois couverts, chemins herbus, après d'abondantes pluies. — St-Amand. — C. — Automne.

257. **HYPH. CANDOLLEANUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Troncs de peupliers, frênes ; tas d'écailles ; vergers, bois, prairies. — Partout. — CC. — Été. Automne.

258. **HYPH. ANNULATUM.** *Ch. R.* — Espèce nouvelle. — Alb. de l'Est. — Se rapproche d'*Hyph. appendiculatum*. — Stipe muni d'un collier distant, très entier.

259. **HYPH. APPENDICULATUM.** *Bull.* — Alb.

de l'Est. — Groupes fasciculés au pied des frênes. — St-Amand, St-Lumier. — CC. — Été. Automne.

260. **HYPH. PILULÆFORME.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur les souches d'ormes et de frênes à ras de terre, près du château d'Aulnay-l'Aître. — RR. — Automne.

261. **HYPH. HYDROPHILUM.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Bois et forêts ; croît en touffes très considérables sur les vieilles souches et sur les racines superficielles après les pluies abondantes. — CC. — Automne.

29^e GENRE. — **PSILOCYBE.** — *Fries.*

262. **PS. COPROPHILA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur le crottin de cheval ; dans les lieux herbus des collines de Francheville, St-Amand ; bords des bois. — AC. — Automne.

263. **PS. CERNUA.** *Fl. D.* — Alb. de l'Est. — Jardins, vergers à St-Amand. — R. — Automne.

264. **PS. PHÆNISECII.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Prés, Jardins. — St-Amand. La Chaussée. — AC. — Été.

265. **PS. SPADICEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Groupé au pied des peupliers et des frênes — St-Amand, La Chaussée ; dans les bois qui bordent la rivière. — AC. — Été. Automne.

30^e GENRE. — **PSATHYRA.** — *Fries.*

266. **PSATH. CONOPILEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Au pied des palissades et des haies des jardins ; partout. — CCC. — Automne.

267. **PSATH. CORRUGIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Terres fumées. jardins, bois. — CCC. —
Eté. Automne.
268. **PSATH. GIROFLEXA.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Le long des haies et des murs
humides. — St-Amand. — R. — Été. Automne.
269. **PSATH. OBTUSATA.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Lieux herbus des collines couvertes
de pins sylvestres : entre La Chaussée et Fran-
cheville. — AR. — Automne.
270. **PSATH. FATUA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —
Trouvé une seule fois dans un jardin avoisi-
nant la rivière. à St-Amand. — R. — Automne.
271. **PSATH. GORDONI.** *Berk. et Br.* — Alb.
de l'Est. — Rare — Dans les bois de St-Lumier-
en-Champagne. au pied des frênes. — Automne.
-

E. Coprinarii. — Spores noires.

31^e GENRE. — **PANÆOLUS.** — *Fries.*

272. **PAN. FIMIPUTRIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— Bords des chemins herbus ; jardins, allées
des bois ; sur le crottin. — AC. — Automne.
273. **PAN. PHALÆNARUM.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Isolé. — Bois de Vanault-les-Dames : sur
les sciures de bois anciennes et sur le crottin
de cheval. — Été. Automne. — AC.

274. **PAN. PAPILLONACEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vanault-les-Dames. — Sentiers. — AC. — Été-Automne.

32^e GENRE. — **PSATHYRELLA.** — *Fries.*

275. **PSAT^{lla}. GRACILIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Jardins, prairies, allées des bois. — CCC. — Automne.

276. **PSAT^{lla}. DISSEMINATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — En groupes très nombreux sur les troncs humides ; bois, jardins. — CCC. — Été. Automne.

33^e GENRE. — **COPRINUS.** — *Pers.*

277. **COP. COMATUS.** *Batt.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 38, pl. LI. — Jardins, chemins herbus, detritus des végétaux en tas. — Après les pluies. — CCC. — Été. Automne. — *Comestible* étant jeune.

278. **COP. OVATUS.** *Schæff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 37, pl. LI. — Champs fumés. Sur les terrains crayeux. — St-Amand. — RR. — Automne. — *Comestible.*

279. **COP. STERQUILINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Jardins, autour des couches, pâturages. — St-Amand. Soulanges, La Chaussée. — AC. — Automne. — *Comestible.*

280. **COP. ATRAMENTARIUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Bois humides, fossés herbus, après les pluies d'automne. — CC — Partout. — *Comestible.* peu délicat.

281. **COP. PICACEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides et découverts des bois. — Forêts de Sermaize. — Automne. — RR.
282. **COP. EXTINGTORIUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Près d'un bois de pins, dans la vallée de Soulanges. Trouvé une seule fois. — RR. — Automne.
283. **COP. FIMETARIUS.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Fumiers et couches de jardins, champs. — CCC. — Partout.
- Var. Macrorhizus.** *Pers.* — Mêmes localités. surtout sur les couches. — AR. — Automne.
284. **COP. CINEREUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Considéré par certains auteurs comme variété du précédent. Chapeau gris-cendré. — AC. — Été-Automne.
285. **COP. TOMENTOSUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Bords des bois, prairies ; sur les brindilles recouvertes de terre. — Aulnay-l'Aître, St-Amand. — R. — Automne.
286. **COP. MICACEUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Cespiteux, sur les troncs, pieux, palissades. — CCC. — Automne. Printemps.
287. **COP. TRUNCORUM.** *Schæff.* — Alb. de l'Est. — Troncs de saules, de chênes. — Forêts. — Me paraît être une simple variété du précédent. — CC. — Automne.
288. **COP. ERYTHROCEPHALUS.** *Lév.* — Alb. de l'Est. — Récolté à Châlons ; communiqué par M. Barbat père, lithographe. — RRR.
289. **COP. HENDERZONII.** *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur le fumier de cheval : detritus en tas.

- lieux azotés. — CC. — Été après les pluies. —
Espèce délicate, très éphémère, pourvue d'un
petit anneau en godet, au milieu du stipe. —
St-Amand, La Chaussée, etc. — AR.
290. **COP. LAGOPUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —
Sermaize ; dans les tranchées et les sentiers
herbus de la forêt. — AC. — Automne.
- 291 **COP. DOMESTICUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Intérieur des bâtiments. — Ecuries, sur les
pompes et seaux de bois. — AC. — St-Amand.
— Automne.
292. **COP. EPHEMERUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. —
Fumiers, lieux azotés. — CCC. — Automne.
293. **COP. FRIESII.** *Quélet.* — Alb. de l'Est. —
St-Lumier-en-Champagne, dans les fossés inon-
dés du village ; sur les feuilles de *Phragmites*
communis. — Juillet. — RR.
294. **COP. PLICATILIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Jardins, prairies. — CCC. — Partout et
presque toute l'année.
-

Dans le Département, je n'ai pas encore vu
de représentant du GENRE **BOLBITIUS.**

34^e GENRE. — **CORTINARIUS.** — *Fries.*

295. **CORT. ANFRACTUS.** — *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Sermaize, dans les bois de haute futaie,
entre la *Colotte* et Trois-Fontaines. — RR. —
Automne.

296. **CORT. MULTIFORMIS.** — *Fries.* — Alb. de l'Est, — Forêt de Sermaize ; sous les chênes. — AR. — Été. Automne.
297. **CORT. CALOCHROUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vanault-les-Dames. — AR. — Automne.
298. **CORT. TURBINATUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Charmont, Cheminon. — AC. — Automne. — *Comestible.*
299. **CORT. ORICHALCEUS.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vavray-le-Petit. — AC. — Automne.
300. **CORT. PRASINUS.** *Schæff.* — Alb. de l'Est. — Forêts de Sermaize à Cheminon, Possesse. — AC. — Automne.
301. **CORT. COLLINITUS.** *Sow.* — Alb. de l'Est. — Très commun en Automne et à la fin de l'Été dans toutes les forêts. — Reims. Maurupt, Charmont, etc. Sous les chênes et les charmes. — Automne surtout, après les pluies.
Var. Mucosus à stipe exempt d'anneaux squameux, concentriques.
302. **CORT. MUCIFLUUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Mêmes localités, mais beaucoup plus rare. — Se distingue du précédent par sa marge striée et l'absence des écailles sur le stipe. — Automne.
303. **CORT. ELATIOR.** *Sow.* — Alb. de l'Est. — Bois de Possesse et de Charmont. — AR. — Automne. — Stipe élancé, chapeau plissé, rugueux.

304. **CORT. NITIDUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vanault-les-Dames, de Vavray, etc., dans les taillis, sous les coudriers. — AC. — Automne.
305. **CORT. VIOLACEUS.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 71, pl. XXXIV. — Forêt de Cheminon ; sous les rameaux du houx. Lieux sablonneux. — RR. — Automne. — *Comestible.*
306. **CORT. CINEREO-VIOLACEUS.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. pl. XXXIV. — Très commun dans les forêts de Charmont, de Trois-Fontaines, de St-Remy-en-Bouzemont. — Automne. — *Comestible.*
307. **CORT. ALBO-VIOLACEUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 72, pl. XXXIV. — Bois de Vanault-les-Dames, Possesse. — C. — Automne.
308. **CORT. BULLIARDI.** *Pers.* — Alb. de l'Est. Forêt de Sermaize à Trois-Fontaines, au lieu-dit la *Colotte*. — RR. — Automne.
309. **CORT. BOLARIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de Cheminon, Vanault-les-Dames ; sous les charmes. — AR. — Automne.
310. **CORT. SUBLANATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Sermaize ; sous les charmes et les chênes ; entre la *Colotte* et Trois-Fontaines. — Automne.
311. **CORT. OCHROLEUCUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Trouvé une seule fois dans les sapinières de Soulanges ; son stipe fusiforme me laisse quelques doutes sur son identité. — RR. — Automne.

312. **CORT. CAMURUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Bois-taillis, à St-Amand. — R. — Fin de l'Été.
313. **CORT. ANOMALUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Bois de Vavray-le-Petit. — Automne. — AR.
314. **CORT. CINNAMOMEUS.** *Lin.* — Alb. de l'Est.
— Forêt de Sermaize à Cheminon; dans les tranchées,
et sous bois. — AR. — Automne. — *Comestible.*
315. **CORT. RAPHANOIDES.** *Pers.* — Alb. de
l'Est. — Forêt de Sermaize à Cheminon ; bois
de pins à St-Amand, Possesse. — AC. — Automne.
316. **CORT. BIVELLUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Sermaize, Trois-Fontaines ; lieux humides ;
fin de l'Été. — AR.
317. **CORT. ARMILLATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Récolté dans un taillis de charmes à Ser-
maize, près de la *Colotte*. — Automne. — RR.
318. **CORT. HINNULEUS.** — *Sow.* — Alb. de
l'Est. — Très commun dans les bois de Vavray,
Vanault-les-Dames. Cheminon, etc. — Automne.
319. **CORT. BIFORMIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Plantations de pins sylvestres, entre St-Amand
et la Moivre. — RR. — Été.
320. **CORT. ILIOPODIUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— Sur les feuilles et sur les fruits de hêtre. —
St-Amand, Aulnay-l'Aître, etc. — C. — Automne.
321. **CORT. PALEACEUS.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Bois de Possesse à Vernancourt ; le
long des sentiers. — AR. — Été. Automne.
322. **CORT. SUBFERRUGINEUS.** — Alb. de l'Est
— Bois découverts ; dans une coupe à Vanault-
les-Dames. — AR. — Été. Automne.

323. **CORT. LEUCOPUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— Bois de Possesse, et bois de pins sylvestres
à Aulnay l'Aître. — R. — Automne.

324. **CORT. ACUTUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —
Possesse, Charmont ; en compagnie du *Cort.*
Palaceus, mais plus commun. — Été. Automne.

35^e GENRE. — **GOMPHIDIUS.** — *Fries.*

325. **G. GLUTINOSUS.** *Schœff.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 138, pl. XXIII. — Bois de
pins à Ablancourt, Aulnay l'Aître. — AR. —
Comestible.

326. **G. VISCIDUS.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et
Roze, p. 139, pl. XXIII. — Très commun dans
les sapinières de Bassu, Soulanges, St-Amand,
etc. — Automne. — *Comestible.*

36^e GENRE. — **PAXILLUS.**

327. **PAX. SORDARIUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Les échantillons que j'ai récoltés dans les
bois de Bayarne et de Bassu diffèrent peu de
ceux que j'ai reçus de Paris, sous le nom de
Pax. Sordarius. Je les avais nommés *Tricho-*
loma Sordidum, espèce dont les caractères peu-
vent être confondus avec ceux du *Paxilus sor-*
darius. — AC. — Automne. — *Comestible.*

328. **PAX. INVOLUTUS.** *Batsch.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 140, pl. XLVII. — Bords des
routes et des champs, allées des parcs. St-Amand.
Aulnay, etc. — CC. — Automne. — *Comes-*
tible.

Var. Leptopus. *Fries.* — Plus commun dans les bois que dans la plaine ; de dimensions deux fois plus petites. — Charmont , Sermaize. — AR. — Automne.

229. **PAX. ATROTOMENTOSUS.** *Batsch.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze . p. 141, pl. XLV. — Commun au pied des troncs de pin sylvestre. — Soulanges , La Chaussée , Bassu , etc. — Automne. — *Suspect.*

330. **PAX. PANUOIDES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Trouvé une seule fois sur une paroi de sapin vermoulue, à St-Amand. — Automne. — Récolté depuis en grande quantité à Fontainebleau, au pied des troncs de pins, dans les roches.

37^e GENRE. — **HYGROPHORUS.** — *Fries.*

331. **HYG. EBURNEUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 135, pl. XXXIV. — Commun dans les forêts autour des chênes , après les pluies. — Été. Automne. — *Comestible.*

332 **HYG. MELIZEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Sermaize ; sous les chênes et les hêtres, au lieu dit la *Colotte.* — AR. — Automne. — *Comestible.*

333. **HYG. GLUTINIFER.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Très commun autour des chênes, notamment sur les racines, dans les forêts. — Été. Automne. — *Comestible.*

334. **HYG. LIMACINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les plantations de pins sylvestres, ter-

- rains calcaires. — St-Amand, Soulanges, etc. — CCC. — Automne, jusqu'aux gelées.
335. **HYG. OLIVACEO-ALBUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois dans les bois de Vavray-le-Petit, sous un vieux chêne. — RR. — Automne.
336. **HYG. DISCOIDEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Charmont et bois de Vavray-le-Petit; en compagnie de l'*Inocybe corydalina*. — AC. — Automne.
337. **HYG. VIRGINEUS.** *Wulf.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 137, pl. XL. — Collines herbues, bords des bois, prairies. — AC. — Automne, — *Comestible*.
338. **HYG. NIVEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins, Bayarne, Bassu, La Chaussée, etc. — AC. — Été, Automne. — *Comestible*.
339. **GYG. SUBRADIATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bords des bois de pins et collines herbues. — Soulanges, Francheville, Bassu, etc. — AC. — Automne. — *Comestible*.
340. **HYG. LÆTUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vanault-les-Dames; lieux découverts. — RR. — Automne.
341. **HYG. COCCINEUS.** *Schæff.* — Alb. de l'Est. — Bois de Charmont, Cheminon. — AR. — Automne. — *Comestible*.
342. **HYG. MINIATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Collines crayeuses, presque arides. — Francheville, Soulanges, Gravelines, etc. — AC. — Automne.

343. **HYG. INTERMEDIUS.** *Pass.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins à St-Gibrien près de Châlons. Récolté par M. Morise. — RR. — Automne.

344. **HYG. CONICUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Collines herbues, sapinières, vergers, etc. — CCC. — Automne, après les grandes pluies. — *Suspect.*

38^e GENRE. — **LACTARIUS.** — *Fries.*

345. **LACT. TORMINOSUS.** *Schæff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 113, pl. XXXVII. — MORTON. — Bois-taillis, broussailles, sapinières; St-Amand, Ablancourt, Bassu, etc. — CC. Automne. — *Suspect.*

346. **LACT. CONTROVERSUS.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 113, pl. XXXIX. — Forêt de Trois-Fontaines à Sermaize, Vanault-les-Dames. — LAITRON-ROUSSETTE. — CC. — Automne. — *Comestible.*

347. **LACT. PUBESCENS.** *Kromb.* — Alb. de l'Est. — Collines des terrains crayeux plantés de pins et de saules. St-Amand. — Localité unique. — RR. — Été-Automne.

348. **LACT. INSULSUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 115, pl. XXXVII. — Bois de Charmont, Vanault-les-Dames; dans l'herbe des tranchées. — AC. — Automne. — *Vénéneux.*

349. **LACT. BLENNIUS.** *Kromb.* — Alb. de l'Est. — Forêts de la montagne de Reims, de Trois-

- Fontaines, de St-Remy-en-Bouzemont, etc. — AC. — Automne. — *Suspect*.
350. **LACT. UVIDUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — — Allées des bois de Sermaize à Cheminon, Vanault-les-Dames. — AC. — Été, Automne. — *Suspect*.
351. **LACT. PYROGALUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 116, pl. XXVII. — Dans les taillis de chênes. Sermaize, Charmont. — AC. — Automne. — *Vénéneux*.
352. **LACT. PIPERATUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 112, pl. XL. — AUBURON VACHE BLANCHE. — Très commun en été et automne dans les bois de chênes. — *Comestible* mais peu délicat.
353. **LACT. PARGAMENUS.** *Kromb.* — Alb. de l'Est. — Sous les charmes dans les forêts de Sermaize, Charmont. — AR. — Automne.
354. **LACT. VELLERUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 111, pl. XXXIX. — Bois de Cheminon, Maurupt. — AC. — Récolté plusieurs fois à St-Amand sous les hêtres. — Été. — *Suspect*.
355. **LACT. DELICIOSUS.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 109, pl. XXXVIII. — AGARIC DÉLICIEUX. — Dans les lieux herbus des bois de pins sylvestres; St-Amand, Soulanges, Vanault-le-Châtel; forêt de Vertus. — AC. — Été, Automne. — *Comestible*.
356. **LACT. PALLIDUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vavray-le-Petit. Sermaize, etc. — Été-Automne. — *Comestible* peu délicat.

357. **LACT. THEIOGALUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 109, pl. XXXVII. — Forêt de Cheminon, Possesse, Vanault-les-Dames. — C. — Automne. — *Suspect.* — Lait doré.
358. **LACT. VIETUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Trois-Fontaines. Tranchée de la *Colotte* à Cheminon. — Été-Automne. — AC. — Après les pluies.
359. **LACT. PICINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois dans les bois de Vanault-les-Dames, en été. — RRR. — Chapeau violacé-fulgineux, tomenteux-velouté.
360. **LACT. FULIGINOSUS.** *Fries.* — *L. Azoneites.* *Bull.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides des forêts de St-Remy-en-Bouzemont et de Sermaize. — AC. — Été-Automne. — *Suspect.*
361. **LACT. VOLEMUS.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 118, pl. XXXVIII. — Forêts de l'Est du Département. — On en fait un grand usage à Sermaize, Maurupt, Charmont et dans la Meuse sous le nom de VEAU-VACHE. — CCC — Été.
362. **LACT. SUBDULCIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Croît sur la mousse, au pied des chênes. — Forêt de Cheminon, Vanault-les-Dames, etc. — CCC. — Été, Automne. — *Comestible.*
363. **LACT. CAMPHORATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Ressemble beaucoup au précédent. Odeur légèrement musquée. — AR. — Automne. — Mêmes localités.

39^e GENRE. — **RUSSULA**. — *Fries*

364. **RUS. NIGRICANS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 120, pl. XLI. — Forêts de Charmont, Sermaize, St-Remy-en-Bouzemont, etc. au pied des chênes. — Été, Automne. — CC. — *Suspect.* — Cette espèce en vieillissant donne asile au *Nyctalis asterophora* et au *Nyctalis parasitica*.
365. **RUS. ADUSTA.** *Kromb.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 121, pl. XLI. — Plus petit que le précédent et noircissant à peine en vieillissant. — Sermaize. — AC. — Automne. — *Suspect.*
366. **RUS. DELICA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 121, pl. XL. — Considéré jadis comme suspect. — On le mange sans hésiter dans la Meuse, sous le nom de BLAVET. — Sermaize, Vanault-les-Dames. — AC. — Automne.
367. **RUS. FURCATA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 129, pl. XLIII. — Lieux humides des bois. — Cheminon, Possesse. — AR. — Été-Automne. — *Vénéneux.*
368. **RUS. RUBRA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 129, pl. XLIII. — Lieux humides des bois. — Cheminon, Possesse. — C. — Automne. — *Vénéneux.*
369. **RUS. ROSACEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de pins à Aulnay-l'Aître. — AR. — Automne. — *Suspect.*

370. **RUS. DEPALLENS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 130, pl. XLIV. — Parties découvertes des bois nouvellement exploités. — AR. — Vavray-le-Petit. — Automne. — *Comestible.*
371. **RUS. SEROTINA.** *Quélet.* — Alb. de l'Est. — Récolté plusieurs fois à St-Amand et à St-Lumier, sur les vieux troncs à ras de terre, nourri par les detritus du bois. — AR. — Automne. — *Vénéneux.*
372. **RUS. VIRESCENS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 125, pl. XLII. — CUL-VERT — Forêts de Charmont, de Sermaize. — Parties découvertes des bois. — AC. — *Aliment très estimé.* — Été-Automne.
373. **RUS. CYANOXANTHA.** *Schæff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 127, pl. XLII. — CHARBONNIER. — Très commun en été dans les bois. Recherché par les habitants des campagnes à Maurupt, Sermaize, Charmont, etc.
374. **RUS. HETEROPHYLLA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 124, pl. XLII. — Se rapproche du précédent. — Bois de pins entre La Chaussée et Francheville. — AC. — Été. — *Comestible.*
375. **RUS. FÆTENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Vanault-les-Dames. Cheminon, Vavray, etc. — Près des troncs de chênes après les pluies. — Très visqueux. — Automne. — AC. — *Suspect.*
376. **RUS. PECTINATA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 126, pl. XLI. — Parties

découvertes des bois nouvellement exploités.
Bords des chemins et sentiers des forêts. —
Vavray-le-Petit, Sermaize. — AR. — Automne.
— *Vénéneux*.

377. **RUS. OCHROLEUCA.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Bois et forêts. — Vavray, Sermaize,
Charmont. — Automne. — AC. — *Vénéneux*.

378. **RUS. FRAGILIS.** — *Fries.* -- Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 132, pl. XLIII. — Commun
dans les sentiers herbus des forêts. — Très
fragile et de saveur âcre. — AC. — Charmont,
Cheminon, Vanault-les-Dames, etc. — Automne.
— *Vénéneux*.

379. **RUS. AURATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —
Sermaize. — Bois de la montagne de Reims,
etc. — Croît isolément, en Été. — AR. —
feuilletés dorés sur la tranche. — *Comestible*.

380. **RUS. ALUTACEA.** *Fries.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 113, pl. XLIV. — CUL-ROUGE.
— Très commun en été dans la forêt de Sermaize
à Trois-Fontaines, etc. — Très recherché des
habitants de la campagne. — *Comestible*.

381. **RUS. OCHRACEA.** *Fries.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 126, pl. XLIII. — Bois de
Vanault-les-Dames, Vavray-le-Petit. — AC. —
Automne. — *Suspect*.

382. **RUS. LUTEA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch.
R. et Roze. Alb. de l'Est. — Croît ça et là
isolément dans les lieux découverts des coupes
ou dans les sentiers. — Vanault-les-Dames, Ser-
maize, etc. — Été-Automne. — AC. — *Suspect*.

40^e GENRE. — **CANTHARELLUS.** — *Fries.*

383. **CANTH. CIBARIUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 144, pl. L. — CHANTERELLE, GIROLE, JAUNELET. — Très commun pendant l'été dans toutes les forêts. Aliment très recherché dans les campagnes. Odeur agréable. — Chapeau glabre.
384. **CANTH. AURANTIACUS.** *Wulf.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 142, pl. XLIX. — Plus rare que l'espèce précédente avec laquelle on pourrait la confondre. Chapeau tomenteux, pédicule mince, régulier, noircissant. Croît dans les sapinières. — Bassu, Francheville, Soulanges. — Été-Automne. — *Suspect.*
385. **CANTH. CARBONARIUS.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Dans les forêts ; sur la terre où l'on a fait du charbon. — Vanault-les-Dames, Sermaize. — C. — Automne.
386. **CANTH. MAMMOSUS.** *Quélet.* — Alb. de l'Est. — D'après les indications du Dr Quélet j'ai placé cette espèce dans le genre *Cantharellus*. — Ses feuillets grisâtres et épais, assez nettement accusés lui donnent l'apparence d'un *Clitocybe*. — Collines arides de Soulanges plantées en pins sylvestres. — Été.
387. **CANTH. TUBÆFORMIS.** **Var. Lutescens.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vavray-le-Petit, Sermaize, Cheminon. — CC. — Automne. — *Suspect.*

388. **CANTH. CINEREUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Forêt de Charmont. — AR. — Automne. —
A peine *Comestible*.
389. **CANTH. MUSCIGENUS.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Sur les mousses humides, dans les bois
de pins. — St-Amand. — AC. — Automne.
390. **CANTH. CRISPUS.** *Fries.* — *Trogia.* —
Alb. de l'Est. — Trouvé sur les rameaux secs
de saule formant une haie de jardin à St-Amand.
— RR.

41^e GENRE. — **NYCTALIS.** — *Fries.*

391. **NYCT. ASTEROPHORA.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Dans les forêts, sur les chapeaux en
décomposition du *Russula nigricans.* — Ser-
maize, Vanault-les-Dames. — CC. — Automne.
— Conidies en forme d'étoiles, sur la partie
supérieure du chapeau.
392. **NYCT. PARASITICA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Même station et mêmes localités que le pré-
cédent, mais plus rare. — Sans conidies. —
Automne.

42^e GENRE. — **MARASMIUS.** — *Fries.*

393. **M. URENS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R.
et Roze. p. 164, pl. XLIX. — AGARIC BRULANT.
— Commun sur les feuilles pourries dans les
forêts, en automne. — *Vénéneux.*
- Var. Peronatus.** *Fries.* — Atl. Champ. p. 163,
pl. XLIX. — Stipe garni à la base de poils rai-
des, dressés ; marge du chapeau striée.

394. **M. PORREUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de Vavray-le-Petit : sur les feuilles de chêne. AR. — Automne. — Odeur d'ail.
395. **M. PRASIOSMUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Forêt de Sermaize à Cheminon. Sur les feuilles CC. — Automne. — Odeur d'ail. Condiment.
396. **M. ERYTHROPUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Trois-Fontaines, Vavray. — Sur la terre et sur les brindilles de bois pourri. — Été, Automne. — C.
397. **M. DISPAR.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce diffère peu de la précédente ; on la reconnaît à la marge striée de son chapeau et à son stipe pruneux. Toutes deux passent pour être le *Collybia hariolorum* de Bull. — Bois de Charmont, Vavray-le-Petit. — AR. — Automne.
398. **M. CALOPUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de chênes dans les bois de Charmont. — AR. — Automne.
399. **M. FÆTIDUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Forêt de St-Remy-en-Bouzemont. Lieux humides, sur les brindilles et feuilles pourries. Odeur infecte. — RR. — Automne.
400. **M. RAMEALIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux de bois mort, sur les tiges de ronces desséchées ; vient en groupes disposés par étages. — CCC. — Automne. — Dans les bois de charmes, de chênes, etc.
401. **M. ROTULA.** *Scop.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les vieilles souches et les petites racines de bois cachées sous les feuilles. — CC. — Été-Automne.

402. **M. GRAMINUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges de *Poa* encore vertes. — Le long d'un terme. — Rues de St-Amand. — R. — Été.
403. **M. FESTUCÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette nouvelle espèce sur des chaumes de *Festuca ovina*, dans un bois de pins sylvestres à Bayarne, près de St-Amand. — Été. — RR.
404. **M. ANDROSACEUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les aiguilles de pin à La Chaussée, Francheville. — AR. — Été. — Par les pluies.
405. **M. HUDSONI.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Forêt de Trois-Fontaines à Cheminon. — Sur les feuilles de houx tombées à terre. — R. — Automne.
406. **M. EPIPHYLLUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Fréquent sur les feuilles de lierre et autres. — Dans tous les bois. — Printemps-Automne.
407. **M. SACCHARINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides des bois ; sur les feuilles de peuplier à St-Amand, St-Lumier. — AC. — Automne.

43^e GENRE. — **LENTINUS.** — *Fries.*

408. **LENT. TIGRINUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 170, pl. XLVIII. — Troncs et souches de saule ; dans les prairies humides. — La Chaussée, Vavray-le-Petit, etc. — CC. — Été-Automne. — *Comestible.*
409. **LENT. COCHLEATUS.** *Sow.* — Alb. de l'Est. — Croît en groupes fasciculés sur les souches

de hêtres à Sermaize, Vanault-les-Dames. —
AC. — Automne.

44^e GENRE. — **PANUS**. — *Fries*.

410. **PAN. CONCHATUS**. *Fries*. — Alb. de l'Est.
— Sur les troncs de saules et de frênes. —
Plus grand que *Pan. Torulosus* ; surface du
chapeau couverte de légères squames. — St-
Amand, St-Lumier. — Été. — *Comestible* étant
jeune.
411. **PAN. RUDIS**. *Fries*. — Alb. de l'Est. —
Cespiteux sur les troncs coupés à ras de terre,
— St-Amand, Aulnay. — CC. — Été-Automne.
— *Comestible*.
412. **PAN. VIOLACEO-FULVUS**. *Fries*. — Alb.
de l'Est. — Récolté une seule fois sur les
branches de saules Marceau bordant un bois de
pins sur la route de Lisse à Bassu. — RRR.
— Automne.
413. **PAN. STYPTICUS**. *Bull*. — Atl. Champ. Ch.
R. et Roze, p. 157, pl. XLV. — Croît en grou-
pes étagés, sur les vieux troncs d'*Alnus glutinosa*
et de chêne. — CC. — *Vénéneux*.

45^e GENRE. — **TROGIA**. — *Fries*.

414. **TROG. CRISPA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. —
Trouvé une seule fois sur une branche de
saule morte clôturant une haie à St-Amand. —
Été. — RRR.

46^e GENRE. — **SCHIZOPHYLLUM**. — *Fries*.

415. **SCH. COMMUNE**. *Fries*. — Alb. de l'Est.
— Sur les troncs abattus de noyer, de pin
sylvestre, de peuplier. — St-Amand, La Chaussée,
etc. — CC. — Automne-Hiver.

47^e GENRE. — **LENZITES**. — *Fries*.

416. **LENZ. VARIEGATA**. *Fries*. — Alb. de
l'Est. — Palissades, souches de hêtres; St-
Amand, Vanault-les-Dames, etc. — CC. —
Automne-Hiver.

417. **LENZ. ABIETINA**. *Bull*. — Alb. de l'Est.
— Sur les poutres de sapin. — Bois de char-
pente vieillis dans les chantiers. — St-Amand,
Aulnay-l'Aître, etc. — AC. — Automne.

2^e FAM. — **Polyporées.** — *Fries.*

Hymenium tubuleux ou poreux.

1^{er} GENRE. — **BOLETUS.** — *Fries.*

1. — **Ochrospori.** — Tubes jaunes; spores subocracées.

A. — **Viscipelles.**

418. **B. LUTEUS.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 177, pl. LVI. — Dans tous les bois de pins sylvestres du Département. — CCC. — Été-Automne. — Espèce munie d'un anneau brun, entourant le stipe. — *Comestible* peu délicat.

419. **B. GRANULATUS.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 179, pl. LVI. — Très commun dans les bois de pins. — Mêmes localités que l'espèce précédente. Forme de grands cercles sur la terre autour des arbres. — Automne. — *Comestible.*

420. **B. BOVINUS** *Lin.* — Alb de l'Est. — Très rare dans les bois des terrains crétacés; St-Amand, St-Lumier; mais en abondance dans les taillis de Vanault-les-Dames. — Terrains tertiaires. — *Comestible.*

421. **B. MITIS.** *Kromb.* — Alb. de l'Est. — Bois de Cheminon. — RR. — Automne.
422. **B. SANGUINEUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 181, pl. LIX. — Bois-taillis à Vavray-le-Petit. — RR. — Automne. — *Vénéneux.*
423. **B. PIPERATUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 181, pl. XV. — Forêt de la montagne de Reims et de Trois-Fontaines. — AC. — Automne. — *Suspect.*

B. — Subtomentosi.

424. **B. VARIEGATUS.** *Sow.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 178, pl. LV. — Bois de pins sylvestres ; Soulanges, Francheville. — AC. — Automne. — *Comestible*, peu estimé.
425. **B. CHRYSENTERON.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 192, pl. LV. — Bois de Cheminon, Vavray-le-Petit, etc. — Sur les vieilles souches de chênes moussues. — AC. — Automne. — *Comestible.*
426. **B. SUBTOMENTOSUS.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 192, pl. LIX. — Forêts de Charmont, Sermaize, Vanault-les-Dames, etc. — Été-Automne. — *Douteux.*
Var. Sistotremoides. *Kickx.* — Vanault-les-Dames. — AR.
- Var. Radicatus.** *Kromb.* — Possesse, Vavray-le-Petit. — AC. — Près des troncs pourris.
427. **B. VERSICOLOR.** *Rost.* — Alb. de l'Est. — Bois de Charmont ; dans l'herbe des grandes tranchées. — Automne. — AR.

428. **B. PRUINATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois-taillis près de Reims, Sermaize. — Été-Automne. — AC.

429. **B. BARLÆ.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les bois de Charmont. — R. — Automne.

C. — **Calopodes.**

430. **B. CALOPUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 194, pl. LX. — Bois de Charmont, Vanault-les-Dames. — AR. — Automne. — *Suspect.*

431. **B. PACHYPUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 193, pl. LIX. — Bois humides de St-Remy-en-Bouzemont. — R. — Automne. — *Vénéneux.*

D. — **Edules.**

432. **B. EDULIS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 196, pl. LXI. — POLONAIIS — GROSSE QUEUE. — CCC. — Dans les forêts, en été et en automne. — Il acquiert un volume considérable. — *Comestible.*

Var. Bulbosa. — Mêmes localités.

Var. Alba. — Anomalie dépendant des influences atmosphériques. — Après les pluies prolongées.

433. **B. RETICULATUS.** *Boud.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 195, pl. LVIII. — Forêts de Charmont, Cheminon, etc. — Moins fréquent que *B. Edulis.* — Stipe entièrement réticulé, à côtes saillantes. — Automne. — *Comestible.*

434. **B. CEREUS.** *Bull.* Atl. — Champ. Ch. R. et Roze, p. 194, pl. LXI. — Bois de la montagne de Reims ; région des blocs erratiques. Été-Automne. — AR. — *Comestible.*

E. — **Luridi.**

435. **B. SATANAS.** *Lenz.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 187, LVIII. — Bois de la montagne de Reims, au dessus d'Ay ; bois de Vavray-le-Petit. — AR. — Automne. — *Vénéneux.*
436. **B. LURIDUS.** *Schæff.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 169, LVII. — Lieux humides des forêts. — Vanault-les-Dames, St-Remy-en-Bouzemont, etc. — AC. — Été, Automne. — *Vénéneux.*

Var. Erythropus. *Pers.* — Avec le type.

437. **B. PURPUREUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 187, pl. LIV. — Bois de Vavray-le-Petit, Vanault-les-Dames, etc. — RR. — Automne. — *Suspect.*
438. **B. OBSONIUM. ?** *Fries.*—Alb. del'Est. — Cette espèce, récoltée en automne dans un bois découvert à Vavray-le-Petit, ne présentait que des échantillons jeunes, avec les caractères qui la distinguent ordinairement ; mais les sujets adultes faisant défaut j'ai mis un point d'interrogation en attendant d'autres récoltes.

F. — **Versipelles.**

439. **B. VERSIPELLIS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 183, pl. LIV. — Bois de

Vanault-les-Dames, Sermaize, etc. — AC. Été-Automne. — *Comestible*.

440. **B. SCABER.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 182, pl. LIV. — Très commun en été et automne dans les forêts. Le type à chapeau gris-cendré et la variété orangée dans les mêmes localités.

G. — **Hyporhodii**, à spores roses.

441. **B. FELLEUS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 186, pl. LVII. — Forêt de Trois-Fontaines, Vavray-le-Petit. — Croît isolément. — R. — Été-Automne. — *Vénéneux*.
442. **B. ALBUS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Récolté plusieurs échantillons dans un bois-taillis mêlé de pins sylvestres, entre La Chaussée et Francheville. — Chapeau blanc, glabre; tubes très décurrents à orifice à peine teinté. — Spores roses. — *Suspect*.

H. — **Cariosi**.

443. **B. CYANESCENS.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 184, pl. LIX. — Forêt de la montagne de Reims près d'Epernay. — Région des blocs erratiques. — R. — Été-Automne. — *Vénéneux*.

I. — **Gyrodon**.

444. **B. RUBESCENS.** *Trog.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois dans les taillis d'aulnes à Vanault-le-Châtel. — RR. — Automne.

445. **B. SISTOTREMA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Bois de Vanault-les-Dames bordant les prairies près de la route d'Heillz-le-Maurupt. — R. — Automne.

2^e GENRE. — **STROBILOMYCES.** — *Berk.*

446. **STR. STROBILACEUS.** *Scop.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 175, pl. LIII. — Bois de Maurupt, Cheminon. — Lieux humides. — Croît isolément. — R. — Été. — Spores brunes, échinulées, sphériques. — *Suspect.*

3^e GENRE. -- **FISTULINA.** — *Bull.*

447. **FIST. HEPATICA.** *Fries.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 172, pl. LII. — Forêt de la montagne de Reims, Trois-Fontaines. Cheminon; dans les fissures des vieux troncs de chênes. — AR. — Automne. — *Comestible.* Se mange cru, en salade.

4^e GENRE. — **POLYPORUS.** — *Fries.*

A. — **Mesopus.**

448. **POLYP. BRUMALIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Sur les branches et les racines d'aulne et de pommier. — St-Lumier-en-Champagne, Soulanges, etc. — AC. — Printemps.

449. **POLYP. ARCULARIUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de hêtres et de chênes. — Cheminon, Aulnay-l'Aître, etc. — AC. — Été-Automne.

450. **POLYP. VERNALIS.** *Var. Cyathoides.*
Quélet. — Alb. de l'Est. — Sur les racines et
rameaux d'arbres morts recouverts de terre.
— Sermaize, St-Amand. — AR. — Été.
451. **POLYP. BIENNIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —
Dans les bois de chênes. — Sur les souches et
troncs coupés à ras de terre. — Vanault-les-
Dames, Cheminon, etc. — Automne. — CC.
452. **POLYP. PERENNIS.** *Lin.* — Alb. de l'Est.
— Lieux où l'on a fait du charbon ; dans les
forêts de Sermaize, Vavray-le-Petit. — AC. —
Été.

B. — **Pleuropus.**

453. **POLYP. SQUAMOSUS.** *Fries.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 201, pl. LXII. — Croît sur
les noyers, les pommiers. — St-Amand, Sou-
langes, etc. — CC. — Été-Automne. — *Comes-
tible dur.*
454. **POLYP. MELANOPUS.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Bois de pins de la montagne de
Reims ; sur la terre et sur les racines. — R.
— Automne.
455. **POLYP. PICIPES.** *Schultz.* — Alb. de l'Est.
Sur les troncs et racines de saule. — St-Amand.
La Chaussée. — Été-Automne. — AC.
456. **POLYP. VARIUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Sur les troncs pourris de saule. — Sou-
langes, Lisse. — Polymorphe. — CC. — Été-
Automne.
457. **POLYP. ELEGANS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.

Var. Nummularius. — Sur les brindilles de bois mort et les rameaux secs de chênes, dans les forêts. — CC. — Automne-Été.

458. **POLYP. LUCIDUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et souches de chênes ; dans les lieux humides des forêts. — Sermaize, Vanault-les-Dames. — C. — Automne.

C. — **Merisma.**

459. **POLYP. UMBELLATUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 203, pl. LXIII. — *Eichase.* — *Quélet.* — Forêt de Sermaize, au lieudit la *Colotte* ; à la base des chênes, après les pluies. — R. — Automne. — *Comestible.*

460. **POLYP. INTYBACEUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 204, pl. LXIII. — Bois de St-Remy-en-Bouzemont ; sous les vieux chênes languissants. — Croît en bouquets énormes. — Automne. — AR. — *Comestible,*

461. **POLYP. SULFUREUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Vient sur les troncs de saules, de pommiers, etc. — Aulnay-l'Aître, Vitry-le-François, etc. — C. — Été-Automne. — *Comestible.*

D. — **Apus.**

462. **POLYP. LACTEUS.** — *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté sur le tronc vermoulu d'un vieux poirier et sur le tronc d'un pommier à St-Amand. — Automne. — R.

463. **POLYP. FRAGILIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Sur les troncs pourris de pins sylvestres
abattus, tapissant les surfaces tournées vers le
sol. — Soulanges, St-Amand. — AC. — Automne.
— J'ai tout lieu de croire que le *Ptychogaster*
albus est l'état conidien de cette espèce.
464. **POLYP. NIDULANS.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Sur les branches de chênes et de
pins pourris. — Vanault-les-Dames, Trois-Fon-
taines, etc. — CC. — Été-Automne.
465. **POLYP. FUMOSUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Imbriqué sur les troncs mourants de saules.
— St-Amand, Lisse, etc. — CC. — Été, Automne.
466. **POLYP. ADUSTUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Sur les souches et troncs d'arbres coupés à
fleur de terre. — Toute l'année. — CCC.
467. **POLYP. HISPIDUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Troncs de noyers, pommiers et quelquefois
de frênes. — Soulanges, St-Amand, etc. — CC.
— Automne. — Il noircit en vieillissant et dans
cet état, il est utilisé (sous le nom de SELLE
DE COUCOU) par les habitants des campagnes
pour la teinture des parquets et des meubles.
468. **POLYP. DICHROUS.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Sur les branches de chênes et de
charmes tombées à terre. — Forêt de Sermaize.
— CC. — Automne.
469. **POLYP. CUTICULARIS.** *Bull.* — Alb. de
l'Est. — Sur les souches d'*Alnus glutinosa* cou-
pées à la surface du sol. — Aulnay-l'Aître. —
RR. — Automne.

470. **POLYP. APPLANATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois à la base d'un tronc de pommier à St-Amand. — RR. — Été.
471. **POLYP. FOMENTARIUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois sur un tronc de noyer près de l'Eglise de St-Lumier-en-Champagne. — Automne. — RRR.
472. **POLYP. IGNIARIUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Très rare. — Rencontré une seule fois sur un énorme peuplier. — Automne 1887. — Confondu ordinairement avec *Polyp. salicinus*. — persistant.
473. **POLYP. FULVUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et branches d'arbres fruitiers. — CCC. — Toute l'année. — Persistant.
474. **POLYP. RIBIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — A la base des tiges et sur les racines du groseillier noir. — Soulanges, St-Amand. — AC. — Automne.
475. **POLYP. CONCHATUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de vieux saules coupés en tête ; disposé par étages. — AC. — St-Amand. Soulanges, etc.
476. **POLYP. PINICOLA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur le pied et les racines de *Pinus picea*, dans un bois du parc d'Ablancourt. — RR. — Automne.
477. **POLYP. SALICINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les troncs de saules coupés en tête. — La surface fructifère se renouvelle chaque année pendant 10 ou 15 ans.

478. **POLYP. POPULINUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs abattus et sur les souches de peuplier; palissades; bois de charpente. — CCC. — Été-Automne.
479. **POLYP. CRYPTARUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les parois et poutres de chêne dans les caves et dans les carrières. — AC.
480. **POLYP. FIBULA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Barrières, palissades, pieux autour des jardins. — Aulnay-l'Aître. — AC. — Automne.
481. **POLYP. ZONATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Commun dans les bois et dans les jardins; sur les vieux troncs languissants, tombés à terre ou coupés près du sol. — Base des chapeaux imbriqués tuberculeuse. — Été-Automne. — CCC.
482. **POLYP. VERSICOLOR.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux et les troncs languissants. — Partout et toute l'année.

E. — **Resupinati.**

483. **POLYP. FERRUGINOSUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et grosses branches d'*Alnus glutinosa* coupés et mis en tas pendant plusieurs années, à l'air libre. — St-Lumier-en-Champagne. — R. — Automne.
484. **POLYP. CERASI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce résupinée croît sur les branches de cerisier sous forme de coussinets elliptiques d'un à 3 centimètres, bruns-rougeâtres, saillants à marge glabre, stérile; tubes assez

grands, à orifice canelle-rougeâtres, puis plus foncés ; spores incolores. — Récolté près de St-Amand, dans les bois du *Rut.* — R. — Automne.

485. **POLYP. PURPUREUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Plaques minces, étalées, interrompues, pourpre-violacées, à contour étroit, byssoïde. — Sur planches de sapin pourries. — St-Amand. — R.

486. **POLYP. INCARNATUS.** — *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs de cytise. — Dans le parc d'Abblancourt. — Automne.

487. **POLYP. CRUSTACEUS.** *Lév.* — Alb. de l'Est. — Sur bois de chêne travaillé. — A St-Amand. — AR. — Automne.

488. **POLYP. RHODELLUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Ressemble au précédent, mêmes localités. — Pores plus courts ; marge non byssoïde. R. — Automne.

489. **POLYP. MEDULLAPANIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur vieux troncs pourris et branches mortes dans les lieux humides des bois. — Surtout sur le pin sylvestre. — AC. — Automne.

490. **POLYP. VULGARIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Souches pourries et vieilles planches de palissades. — Etalé, blanc, puis jaunâtre. — Automne, Hiver. — CC.

491. **POLYP. VAILLANTII.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Mycelium filamenteux, entrecroisé. interrompu çà et là par des plaques de tissu

blanc, mince, muni de pores très courts. — Dans les celliers, sur les poutres vermoulues. — St-Amand.

5^e GENRE. — **TRAMETES.** — *Fries.*

492. **TRAM. GIBBOSA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur les souches et troncs de peuplier, de frêne, de saule. — St-Amand, Ablancourt, etc. — Automne-Hiver. — CC.
493. **TRAM. RUFESCENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs vivants de saules coupés en tête ; prairie de Vavray-le-Petit. — R. — Automne.
494. **TRAM. BULLIARDI.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Vieux troncs de saule Marceau. — Chapeau glabre. — St-Amand, La Chaussée, Lisse. — CC. — Automne.
495. **TRAM. SUAVEOLENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les saules dans les prairies. — Soulanges, La Chaussée, etc. — Automne. — Odeur d'anis.

6^e GENRE. — **DEDALEA.** — *Fries.*

496. **DÆD. QUERCINA.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les troncs de chênes coupés, dans les forêts et dans les chantiers. — Été-Automne. — Persistant.
497. **DÆD. UNICOLOR.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Imbriqué sur les troncs d'arbres languissants ; dans les bois et dans les jardins. — CCC. — Automne.

7^e GENRE. — **MERULIUS**. — *Fries*.

498. **MER. TREMELLOSUS**. *Schrad.* — Alb. de l'Est. — Sur les vieux troncs d'arbres pourris, dans les lieux marécageux et sur les pins sylvestres vermoulus. — CC. — Automne.
499. **MER. CORIUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les bois de clôture, branches mortes. — St-Amand, Aulnay-l'Aître, etc. — AC. — Automne.
500. **MER. RUFUS**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois sur un tronc de lilas, à St-Lumier-en-Champagne. — Hymenium rouge incarnat, brunissant.
501. **MER. SERPENS**. *Tode.* — Alb. de l'Est. — Sur une palissade de sapin pourrie; à Aulnay-l'Aître. — Automne. — AR.
502. **MER. CRISPATUS**. *Fl. Dan.* — Alb. de l'Est. — Sur racines d'*Alnus glutinosa*. Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — Automne, hiver. — AR.
503. **MER. LACRYMANS**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Grandes plaques orangées à contour cotonneux, blanc; sur les murs et les poutres des caves, celliers. — CC. — Printemps-Automne.
- Var. Pulverulentus**. — Dans les caves avec le précédent.
504. **MER. UMBRINUS**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de sapins cariés; surface

pulvérulente , brune , plissée , contournée. —
St-Amand.

8^e GENRE. — **SOLENIA.** — *Fries.* —

505. **SOL. ANOMALA.** *Pers.* — **Sol. Ochracea.**
— *Hoffm.* — Alb. de l'Est. — *Peziza anomala*
des auteurs. — Sur les rameaux de saule , de
hêtre, de cerisier. — CC. — Toute l'année. —
Partout.

3^e FAM. — **Hydnées.** — *Lin.*

Hymenium aiguillé ou denté.

1^{er} GENRE. — **HYDNUM.** — *Lin.*

506. **HYD. SUBSQUAMOSUM.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Bois humides, forêt de Trois-Fontaines. — AC. — Automne.
507. **HYD. REPANDUM.** *Lin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 206, pl. LXV. — Au pied des chênes, des charmes et des hêtres, dans la plupart des forêts. — Charmont, Vanault-les-Dames, etc. — CCC. — Automne. — *Comestible.*
Var. Rufescens. *Pers.* — Mêmes localités. — Plus rare. — Atl. p. 208, pl. LXV.
508. **HYD. ZONATUM.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Commun dans les forêts de Cheminon, Possesse, etc. — Sous les chênes. — Automne.
509. **HYD. NIGRUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Mêmes localités que le précédent, ainsi que la Var. *Olivaceo-cinereum.* — Aiguillons blancs. — Automne.
510. **HYD. AURISCALPIUM.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Très commun dans les bois de pins ; sur les cônes enfouis sous la mousse. — Automne, hivers doux. — Bassu. St-Amand, etc. — *Comestible.*

511. **HYD. CORALLOIDES.** *Scop.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 211, pl. LXIV. — Récolté une seule fois, en abondance sur un tronc de noyer pourri ; dans un fossé près de St-Quentin-les-Marais. — Automne. — *Comestible.*
512. **HYD. ERINACEUM.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 210, pl. LXIV. — Récolté plusieurs fois sur de vieux troncs de noyer encore vivants. — Bassu, Bassuet, St-Amand. — *Comestible.* — Cette espèce, outre les basides et les spores qui tapissent la surface des aiguillons, possède dans l'épaisseur du tissu du chapeau, un autre mode de reproduction qui consiste en conidies intracellulaires, (voir la notice et le dessin que j'ai communiqués à la Société botanique de France. *Bullet.* T. XXVIII; 10 juin 1881).
513. **HYD. MEMBRANACEUM.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Cet hydnum commence la série des espèces résupinées ; elle croît sur les branches de chêne tombées à terre ; forêt de Trois-Fontaines, Charmont, etc. — CC. — Automne.
514. **HYD. FERRUGINOSUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Assez commun sur les souches déracinées de peuplier et d'*Alnus glutinosa*, dans les lieux humides des bois. — St-Amand, St-Lumier. — Automne.
515. **HYD. ALUTACEUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur vieilles tiges de *Rosa canina* couvertes de mousse, dans les bois de pins. — Soulanges. — AC. — Automne.

516. **HYD. SULFUREUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est — J'ai récolté plusieurs fois cet hydnum, au mois de septembre, sur des brindilles de peuplier, d'érable et de chêne tombées dans un fossé humide près de St-Lumier-en-Champagne. La partie exposée à l'air libre est d'un beau jaune-soufre ; celle qui est tournée vers la terre ou enfouie sous les débris végétaux est de couleur gris-brun avec des aiguillons blancs. — l'*Hydnum limonicolor* de Berk, me semble voisin de notre espèce.
517. **HYD. DENTICULATUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les souches d'*Alnus glutinosa* coupées près du sol. — St-Amand, St-Lumier. — AC. — Automne.
518. **HYD. NIVEUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur les vieilles souches et racines à demi enterrées dans les lieux humides des bois et des jardins. — CC. — Automne, hiver. — St-Amand, Lisse, etc.

2^e GENRE. — **SISTOTREMA.** — *Fries.*

519. **SIST. CONFLUENS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Dans les bois de Vavray-le-Petit, Cheminon, Sermaize; dans la mousse. — AC. — Automne.
520. **SIST. PACHYODOM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté pendant plusieurs années cette espèce sur un vieux tronc de noyer languissant, entre St-Amand et Aulnay-l'Aître, — Elle est sessile, à chapeaux imbriqués, épais, gla-

bres, de couleur ocracée ; les lamelles planes sont mélangées de quelques aiguillons. — Automne. — RR.

3^e GENRE. — **IRPEX**. — *Fries*.

521. **IRP. FUSCO-VIOLACEUS**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de pins sylvestres abattus. — St-Amand, Lisse, etc. — AC. — Automne.

522. **IRP. OBLIQUUS**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les branches de chêne pourries, tombées à terre, pendant les temps pluvieux ; dans les forêts. — Sermaize, etc. — Automne.

523. **IRP. CANDITUS**. *Weinm.* — Alb. de l'Est. — Récolté à Aulnay-l'Aître, sur une branche de saule Marceau. — Automne. — RR.

4^e GENRE. — **PHLEBIA**. — *Fries*.

524. **PHL. RADIATA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de noyers, sur le bois dénudé et entre les fentes de l'écorce. — Lisse, Bassu, Ablancourt, etc. — AC. — Hiver, automne.

5^e GENRE. — **GRANDINIA**. — *Fries*.

525. **GRAND. CRUSTOSA**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et rameaux desséchés gisant dans la mousse, en automne. — Bois de pins à Soulanges, Lisse. — AC.

4^e FAM. — **Auricularinées.**

Hymenium uni et horizontal.

1^{er} GENRE. — **CRATERELLUS.** — *Fries.*

526. **CRAT. CORNUCOPIOIDES.** *Lin.* — Atl.
Champ. Ch. R. et Roze, p. 147, pl. LII. —
Sur la terre dans les taillis de charmes et
de chênes, dans les forêts de Cheminon,
Charmont, Reims. — CC. — Automne. — TROM-
PETTE DES MORTS. — *Comestible* étant jeune.
527. **CRAT. SINUOSUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Broussailles et taillis des bois de Possesse,
Sermaize, Vanault-les-Dames, etc. — CC. —
Automne-Été. — *Comestible.*

2^e GENRE. — **THELEPHORA.** — *Fries.*

528. **THEL. PALLIDA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Sous les chênes et dans les sentiers de la
forêt de Trois-Fontaines à St-Dizier. — R. —
Automne.
529. **THEL. CARYOPHYLLEA.** *Fries.* — Alb.
de l'Est. — Terrains humides, dans les forêts de
Sermaize, St-Remy-en-Bouzemont, Vanault-les-
Dames, etc. — CC. — Automne.
530. **THEL. TERRESTRIS.** *Ehrh.* — Alb. de
l'Est. — Bois découverts; terrains sablonneux.
— Sermaize. — AR. — Automne.

531. **THEL. BIENNIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Assez commun dans les bois-taillis et broussailles, au pied des jeunes chênes. — St-Amand, Aulnay-l'Aître, etc. — CC. — Automne.

532. **THEL. CRISTATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Cette plante blanche, sébacée incruste les graminées et les mousses, dans les lieux humides des bois et des forêts. — CC. —

3^e GENRE. — **STEREUM.** — *Fries.*

533. **STER. PURPUREUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Sur les troncs et branches de peuplier, de bouleau, etc. — CCC. — Été-Automne.

534. **STER. HIRSUTUM.** *Wild.* — Alb. de l'Est.
— Très commun en automne et en hiver sur les troncs de chênes abattus et sur les palissades ou planches de clôture. Dans les bois et autour des habitations. — Été-Automne.

535. **STER. FERRUGINOSUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Coriace, brun-foncé. Imbriqué sur les vieilles palissades en chêne. — St-Lumier, St-Amand, etc. — Persistant. — CC.

536. **STER. AVELLANUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — A la base des troncs et sur les racines déterrées des noisetiers. — St-Amand, La Chaussée. — CC. — Automne.

536 bis. **STER. SANGUINOLENTUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur *Pinus sylvestris*, branche à demi pourrie. — Aulnay-l'Aître. — Printemps. — R. — Devient rouge-incarnat par le frottement.

4^e GENRE. — **AURICULARIA**. — *Fries*.

537. **AUR. MESEMTERICA**. *Bolt*. — Alb. de l'Est. — Imbriqué en amphithéâtre sur les vieux troncs de noyer. — Très commun surtout dans l'arrondissement de Vitry-le-François; Soulanges, St-Lumier, etc. — Automne et hivers doux. — Se dessèche par les temps secs comme une membrane papyracée, se gonfle et reprend sa forme première par les temps pluvieux.

5^e GENRE. — **CORTICIUM**. — *Fries*.

538. **CORT. GIGANTEUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Commun sur les troncs de pins abattus. — Blanc, très étendu. — St-Amand, Soulanges, etc. — Automne-Hiver.

539. **CORT. LÆVE**. *Pers*. — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et branches de peuplier, d'érable, etc. — CC. — Automne, hivers doux.

540. **CORT. FUSCUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Récolté sur une tige desséchée de *Rosa canina*. — RR. — Bois de St-Amand. — Été.

541. **CORT. QUERCINUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Dans les bois; sur les branches de chêne et de hêtre tombées à terre. — CCC. — Automne. — Brun-pourpre puis noirâtre et retourné.

542. **CORT. CALCEUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Troncs et branches de peuplier et d'érable,

couverts de mousse ; dans les lieux humides des bois. — Automne, hiver.

543. **CORT. CÆRULEUM.** *Fries* — Alb. de l'Est.

— Commun sur les bâtons de vigne en chêne, mis en tas et reposant sur la terre humide. — Automne, hiver. — Après les pluies. — Partout.

544. **CORT. OCHRACEUM.** *Fries.* — Alb. de

l'Est. — Tiges mortes et couvertes de mousse de *Rosa canina*. — Branches de pin sylvestre.

— Soulanges, Bayarne, etc. — Automne. — AC.

545. **CORT. CINEREUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est.

— Sur les rameaux des hêtres, des cerisiers, etc., jonchant la terre. — St-Amand, Bassu. — CCC. — Automne.

546. **CORT. COMEDENS.** *Nées.* — Alb. de

l'Est. — Croît sous l'épiderme soulevé du coudrier, du noyer, etc. — Aulnay-l'Aître, St-Amand, etc. — Printemps, automne. — CC.

547. **CORT. SAMBUCI.** *Fries.* — Alb. de l'Est.

— Sur les rameaux et tiges de *Sambucus nigra* ; dans les vieilles haies clôturant les jardins. — CC. — St-Amand. — Automne.

548. **CORT. TYPHÆ.** *Fuckl.* — Alb. de l'Est. —

Enveloppe la base des faisceaux de feuilles de *Carex paludosa* et des *Typha*. — Bois marécageux de St-Amand. — Automne, hivers doux. — CCC.

Var. Foliicolum. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. —

Croît sur les feuilles tombées à terre, dans le voisinage des *Carex* déjà envahis. — AR. — St-Amand.

549. **CORT. PUTANEUM.** *Var. areolatum.* *Fries.*
— Alb. de l'Est. — Sur les vieilles poutres
des bâtiments abandonnés et humides. — CC.
— Automne.

6^e GENRE. — **HYPOCHNUS.** *Fries.*

550. **HYP. FERRUGINEUS.** *Pers.* — Alb. de
l'Est. — Lacis filamenteux de couleur ferrugi-
neuse, très dense. adhérent aux racines de
pins sylvestres et aux plantes herbacées qui
les avoisinent. — AC. — Automne. — St-
Amand, Francheville, etc. — Les filaments se
terminent chacun par un faible renflement qui
émet quatre spores rondes, échinulées, rousses.

7^e GENRE. — **CYPHELLA.** *Fries.*

551. **CYPH. AMPLA.** *Lév.* — Alb. de l'Est. —
Cette espèce peu connue est extrêmement fré-
quente en automne et en hiver sur les bran-
ches et rameaux morts de peuplier d'Italie. —
La cupule varie entre la largeur d'un pois et
celle d'une noix. — Son hymenium se rappro-
che de celui des *Hirneola*. — St-Amand, La
Chaussée, etc.

552. **CYPH. ALBO-VIOLASCENS.** *Alb. et Schw.*
— Alb. de l'Est. — Je pense que cette espèce
est la même que *Peziza albo-violascens* d'Alber-
tini, *Cyphella curreyi* de Berk. et *Cyphella*
dubia de Quélet. — Elle est commune sur les
rameaux secs de la vigne, les brindilles de prunier
de *Pyrus oxyacantha*, etc. — Automne. — CCC.

553. **CYPH. MUSCIGENA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Croît en groupes sur les mousses au pied des pins sylvestres. — St-Amand, Bassu. — C. — Automne.

554. **CYPH. MUSCICOLA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les lieux humides, sur les troncs coupés près du sol, couverts de mousse et de lichens. — St-Lumier, Ablancourt. — C. — Automne.

555. **CYPH. NECKERÆ.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Dans les bois de pins sylvestres à St-Amand, sur *Neckera curlipendula*. — CC. — Automne.

556. **CYPH. LACERA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté sur une tige de *Dipsacus* à Aulnay-l'Aître. — Extérieur villeux-noirâtre. — AR. — Automne.

557. **CYPH. LÆTA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Cupule glabre. — Croît sur les tiges herbacées, *Geranium robertianum*, *Galeopsis*, etc. — St-Lumier, St-Amand. — CC. — Automne.

558. **CYPH. RUBI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les sarments de *Rubis fruticosus*. — Espèce blanche, velue, extrêmement petite; se rapproche de *Cyph. Villosa*; elle est munie de poils plus courts et d'un disque plus aplati par l'humide. — Automne. St-Amand, le long du ruisseau. — AC.

559. **CYPH. VILLOSA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les tiges herbacées; *Barbade*, *Cirsium Arvense*, *Achillea millefolia*, etc. — Toute l'année.

560. **CYPH. CULMICOLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les chaumes de seigle humides et pourrissants. Récolté sur un tas de paille exposé depuis plusieurs années à l'air libre. — St-Amand. — AR.
561. **CYPH. TUBA.** *Wein.* — Alb. de l'Est. — En forme d'entonnoir ou de conque, blanc-vil-leux, marge incisée. — Sur les tiges d'ortie dioïque. — St-Amand. — Été-Automne. — C.
562. **CYPH. CAPULA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les souches de *phragmites* sorties du limon ou de la surface de l'eau. — Fossés du château à Aulnay-l'Aître. — AR.
-

5^e FAM. — **Clavariées.** — *Fries.*

hymenium uni et vertical, simple ou rameux.

1^{er} GENRE. — **CLAVARIA.** — *Fries.*

563. **CLAV. FLAVA.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 218, pl. LXVII. — Forêt de Trois-Fontaines à Sermaize. — RR. — Espèce à spores blanches souvent confondue avec *Clav. aurea*, à spores ochracées. — Automne. — *Comestible.*
564. **CLAV. BOTRYTIS.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 217, pl. LXVII. — Forêts de Charmont, Sermaize, St-Remy-en-Bouzemont, etc. — CC. — Automne. — *Comestible.*
565. **CLAV. AMETHYSTEA** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Lieux humides des forêts de Charmont, Sermaize. — RR. — Automne. — *Comestible.*
566. **CLAV. CORALLOIDES.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Bois et forêts; Lisse, St-Amand, Sermaize; sous les chênes et les hêtres. — CC. — Automne. — *Comestible.*
567. **CLAV. MUSCOIDES.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre, dans les bois de pins sylvestres. — St-Amand, Bassu, Soulanges. — AC. — Automne.

568. **CLAV. CINEREA.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— Forêts de Sermaize, Vanault-les-Dames, etc.
CC. — Automne. — *Comestible.*
569. **CLAV. CRISTATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Lieux humides des bois et forêts ombragés.
— CC. — Automne. — St-Amand, Vavray-le-Petit,
etc. — Clavaire ordinairement envahie et noircie
par *Helminthosphœria clavariarum.*
570. **CLAV. RUGOSA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. —
Lieux humides des bois. — St-Amand, Possesse, La
Chaussée, etc. — CC. — Automne. — *Comestible.*
571. **CLAV. EPICHRNOA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Récolté à Sermaize sur le tan répandu dans
les allées d'un jardin. — RR. — Automne.
572. **CLAV. AUREA.** *Schœff.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 217, pl. LXVI. — Croît
sur terre en touffes considérables dans les
forêts ; sous les chênes, les coudriers. — Ser-
maize, Charmont, Epernay, etc. — CC. —
Automne. — *Comestible ?* — Spores ochracées.
573. **CLAV. FORMOSA.** *Pers.* — Atl. Champ.
Ch. R. et Roze, p. 216, pl. LXVI. — Mêmes
localités que le précédent. — Rameaux plus
épais et de couleur orangée-rose. — AR. —
Automne. — *Suspect.*
574. **CLAV. FLACCIDA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Bois de pins sylvestres. — St-Lumier, Bassu.
— AR. — Automne.
575. **CLAV. FUSIFORMIS.** *Sow.* — Alb. de l'Est.
— Bois de Cheminon, Trois-Fontaines ; lieux
humides, sur terre. — CC. — Automne.

576. **CLAV. INÆQUALIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— Dans les bois, Charmont, montagne de
Reims, Sermaize. — Lieux découverts, ornières
des sentiers. — CC. — Automne.
577. **CLAV. VERMICULARIS.** *Scop.* — Alb. de
l'Est. — Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. —
Endroits humides et herbus. — CC. — Automne.
578. **CLAV. FRAGILIS.** *Holmsk.* — Alb. de l'Est. —
mêmes localités. — CC. Automne.
579. **CLAV. PISTILLARIS.** *Lin.* — Alb. de l'Est.
— Forêts de Cheminon, Possesse, Reims. Dans
les taillis des collines boisées. C. — Été. —
Comestible.
580. **CLAV. JUNCEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. —
sur les feuilles de peuplier, d'érable, pourries
sur terre. — Été, Automne. — St-Amand. — CC.
581. **CLAV. CANALICULATA.** *Fries.* — Alb. de
l'Est. — Bois de St-Lumier. — Echantillon
isolé. — AR. — Été-Automne.
582. **CLAV. INCARNATA.** *Wein.* — Alb. de
l'Est. — Récolté une seule fois dans les bois
de St-Lumier-en-Champagne, près d'un ruisseau.
— RR. — Automne.
583. **CLAV. TRICHOMORPHA.** *Fries.* — Alb.
de l'Est. — Sur tiges des *Zéa maydis* mises en
tas et entrant en décomposition. — Aulnay-
l'Aître, près du château. — RR. — Automne.
584. **CLAV. MUCIDA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. —
J'ai trouvé cette rare espèce près de Bassu, sur
peuplier. — Automne. — Voir la notice sur
Calocera corticalis.

2^e GENRE. — **CALOCERA**. — *Fries*.

- 584 bis. **CAL. VISCOSA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. —
Terrains siliceux de la montagne de Reims et
de Cheminon ; sur les vieux troncs et racines
de pin. — Automne. — AR.
585. **CAL. CORNEA**. *Batsch*. — Alb. de l'Est.
— Sur le bois de chêne pourri, branches.
pieux, palissade. — Automne. hiver. — CCC. —
Partout.
586. **CAL. CORTICALIS**. *Fries*. — Alb. de l'Est
— Sur les rameaux tombés et pourris de pin
sylvestre, de *Rosa canina*, sur tiges sarmen-
teuses de houblon, etc. — C. — Été, automne ;
après les pluies — Partout. — Cette espèce me
paraît être plutôt un *Cératium* qu'une *Clavaire*
— J'ai comparé les échantillons qui m'ont été
adressés par M. Boudier de Montmorency et
par le Dr Quélet, sous le nom de *Cl. mucida*
avec ceux que j'ai récoltés à St-Amand, Lisse,
Soulanges. — Ils présentent tous les mêmes
caractères ; substance malacoïde à l'origine et
filamenteuse dans l'âge adulte. Les filaments se
terminent à la surface du champignon par
des basides munies de 1 à 3 spicules iné-
gales, courtes, surmontées chacune d'une spore
ovale, uniséptée, semblable à celle du *Tricho-*
thecium roseum. — Il résulte, selon moi, de

l'observation ci-dessus, que les espèces nommées par les auteurs *Cl. mucida*, *Calocera corticalis*, Fries, appartiennent probablement au *Cératium pyxidatum* d'Alb. et Schw. Le véritable *Cl. mucida* est différent, à spore sans cloison. La note que je viens de donner sur *Cal. Corticalis* a été faite en 1885; en Février 1886, j'ai récolté près de Bassu, sur des écaïlles de peuplier le véritable *Clavaria mucida*, pourvu de basides tétraspores, de spores ovales, non septées — l'espèce était une fois plus grande que *Calocera corticalis*, les clavules étaient simples et non bi ou trifurquées. de plus en forme de massue — caractères qui n'existaient pas dans les différents échantillons qui m'avaient été communiqués précédemment.

3^e GENRE. — **TYPHULA.** — *Fries.*

587. **TYPH. ERYTHROPUS.** *Bolt.* — Alb. de l'Est. — Sur les pétioles des feuilles de peuplier, d'érable, etc. inséré sur un sclérote rougeâtre. — Automne et hivers doux. — CC.
588. **TYPH. PHACORRHIZA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Filiforme, très allongé, inséré sur *Sclerotium scutellatum*, parasite des pétioles des feuilles de frêne; dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — RR. — Automne.
589. **TYPH. VARIABILIS.** *Ries.* — Alb. de l'Est. — Clavules simples, munies d'un pédicule court, velu, inséré sur un sclérote multilobé. — Cha-

- que mamelon porte une clavule ; sur écailles de peuplier. — RR. — St-Amand. — Automne.
590. **TYPH. GRAMINUM** *Karlt.* — Alb. de l'Est. — Espèce blanche, presque filiforme, à pédicelle distinct, court, prenant naissance sous l'épiderme des chaumes de blé. Tas de paille depuis longtemps exposé à l'air libre. — St-Amand — Printemps — AR.
591. **THYPH. GREVILLEI.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les feuilles de peuplier amoncelées en tas, — à la fin de l'automne — St-Amand. — CC.

4^e GENRE. — **PISTILLARIA.** — *Fries.*

592. **PIST. SCLEROTIODES ?** *Fries.* — Alb. de l'Est — Espèce haute d'un à 2 cent. insérée sur un sclérote sphérique, caché sous l'épiderme des tiges de pommes de terre desséchées en plein air. La clavule est seule apparente au dehors. — Champs de Lisse — RR. — Automne.
593. **PIST. MICANS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges herbacées, notamment sur *Eryngium campestre.* — CC. — en Automne. — St-Amand, Soulanges, etc. — D'une belle couleur vermillon ou rose.
594. **PIST. CULMIGENA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes des graminées pourris sur terre, — pendant l'automne, après les pluies. — AC. — St-Amand.

5^e GENRE. — **TREMELLA.** — *Fries.*

595. **TREM. FIMBRIATA.** *Pers* -- Alb. de l'Est.
— Expansions membraneuses, brunes, hautes de 3 à 6 centimètres, sur le bois de chêne dénudé exposé à la pluie. — St-Amand. — Automne.
— R. — dans les chantiers de bois.
596. **TREM. MESENERICA.** *Retz.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les branches des arbres languissants, couverts de lichens ; Peupliers, Erables, etc. — St-Amand. — Eté-Automne.
597. **TREM. ALBIDA.** *Huds.* — Alb. de l'Est. — Sur les branches de saule destinées à servir de rames et placées dans les lieux humides des jardins. — CC. — Printemps-Automne — St-Amand, Lisse, etc.
598. **TREM. VIOLACEA.** *Relh.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de cerisiers languissants, à Lisse. — Printemps. — RR. — En février j'ai observé sur les mêmes sujets les spores et les spermaties.
599. **TREM. INDECORATA.** *Somm.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les tiges et branches de saules enlacés pour faire des haies de clôture. — St-Amand, Bayarne, etc. — CC. — Printemps, Automne.

599 bis. **TREM. INTUMESCENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur branche d'orme à demi pourrie ; plaques brunes ressemblant à un *Collema*, assez larges, gaufrées comme les morilles — Bois d'Aulnay — R. — Janvier.

6^e GENRE. -- **EPIDOCHIUM.** — *Fries.*

600. **EPID. NIGRICANS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Petits tubercules trémelloïdes, noirâtres, se gonflant par l'humidité, possédant des basides globuleuses et des spores pyriformes — sortant de dessous l'épiderme de différents arbustes, lilas, *Colutea arborescens*, coudrier, etc. — Dans les jardins. — Automne-Hiver. — AC. — St-Amand.

601. **EPID. MELANOCHLORUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Espèce encore plus petite que la précédente, à peine d'un millimètre, noirâtre étant sèche, et verte par l'humide. — Spores en chapelet. — Sur les pédoncules des gousses de *Cytisus laburnum*. — AR. — Automne. — Jardins. — St-Amand.

602. **EPID. ATROVIRENS.** *West.* — Alb. de l'Est. — Récolté au mois d'avril dans les bois de Lisse sur un rameau de Frêne. — R. — Très petits tubercules vert-foncé, passant au noir. Spores ou plutôt conidies assez grandes, légèrement courbées, portées par des basides cylindriques. C'est probablement l'appareil conidien de *Calloria-atrovirens*. *Fries.*

7^e GENRE. — **DACRYMYCES.** — *Fries.*

603. **DACR. FRAGIFORMIS.** *Nées.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux de chêne et de pins sylvestres. — AC. — Soulanges, Bassu, etc. — Automne.
604. **DACR. DELIQUESCENS.** *Duby.* — Alb. de l'Est. — Très commun, partout au printemps et à l'automne, sur les branches pourries de sapin, de chêne, les vieilles palissades.
605. **DACR. STILLATUS.** *Nées.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce est plus ferme, arrondie et convexe que l'espèce précédente ; sa couleur orangée presque vermillon est aussi différente. Elle croît communément sur les bois de sapin qui servent de clôture aux jardins. — CCC. — Automne, printemps.
606. **DACR. CHRYSOCOMUS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — (*Calloria* Fries). Sphérique, puis en forme de pèzize ou d'*Helotium*, sessile, orangé-pâle ; sur les branches de pins sylvestres. — AR. — Automne. — St-Amand, Soulanges.
607. **DACR. PHRAGMITIDIS.** *Kickx.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce, décrite dans la Flore des Flandres, ressemble à un *Tubercularia* jaune-orangé dans sa jeunesse ; en vieillissant elle prend la forme d'une cupule pèzizoïde. — Elle croît sur les chaumes de *Phalaris arundinacea* et sur les chaumes et rhizômes de

Phragmites communis. — Bords du Fion à St-Lumier, et à Aulnay-l'Aître dans les fossés du château. — Automne — AR.

608. **DACR. URTICÆ**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Etat conidien de *Calloria fusaroides* très commun sur les tiges mortes d'ortie. — Automne. — Partout.

8^e GENRE. — **EXIDIA**. — *Fries*.

609. **EXID. RECISA**. *Dithm.* — Alb. de l'Est. — Sur les branches mortes du saule Marceau. — Automne, Printemps. — St-Amand, Aulnay. — CC.

610. **EXID. GLANDULOSA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les branches mortes de charme, de chêne, de hêtre, dans les forêts et dans un bois sur les bords du Fion à St-Amand — Pargny, Sermaize. — AC. — Automne.

9^e GENRE. — **HIRNEOLA**. — *Fries*.

611. **HIRN. AURICULA JUDÆ**. *Lin.* — Alb. de l'Est. — OREILLE DE JUDAS. — Commun sur les troncs et rameaux languissants de *Sambucus nigra*, dans les haies des clôtures de jardins; elle croît aussi, mais plus rarement sur *Robinia pseudo-acacia* et sur le noyer. — Automne et hivers doux. — St-Amand, St-Lumier. — Suivant Quélet, *purgatif*.
-

2^e ORDRE. — **PÉRIDIÉES.** — *Quélet.*

1^{re} FAM. — **Nidulariées.** — *Tul.*

Hymenium charnu, ni pulvérulent ni déliquescent.

1^{er} GENRE. — **CYATHUS.** — *Hall.*

612. **CYATH. STRIATUS.** *Hoff.* — Alb. de l'Est.

— Sur les rameaux et racines de bois pourri.

— Bois découverts de Sermaize, Vanault-les-Dames, Soulanges. — AC. — Automne. — Intérieur du peridium strié.

613. **CYATH. VERNICOSUS.** *Bull.* — Alb. de

l'Est. — Sur les écailles et rameaux de chêne pourrissant sur terre. — Cheminon, Sermaize. — Automne. — AR. — Intérieur du péricidium lisse.

614. **CYATH. CRUCIBULUM.** *Hoff.* — Alb. de

l'Est. — Dans les lieux humides des forêts de Cheminon, Maurupt. — AR. — Automne. — Sur les brindilles de chêne. — Couleur ochracée.

2^e GENRE. — **SPHEROBOLUS.** — *Tode.*

615. **SPH. STELLATUS.** *Tode.* — Alb. de l'Est.

— Sur les sciures et petites écailles de chêne.

— Sermaize, près de la fontaine. — AR. — Automne.

2^e FAM. — **Phalloidées.** — *Fries.*

Péridium double renfermant une couche de gélatine.
Hymenium déliquescent.

1^{er} GENRE. — **PHALLUS.** — *Lin.*

616. **PH. IMPUDICUS.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Sous les chênes, pendant les pluies d'été et d'automne. — Forêts de Charmont, Sermaize. etc. — AC. — *Vénéneux.* — Odeur fétide.

2^e GENRE. — **CYNOPHALLUS.** — *Fries.*

617. **CYN. CANINUS.** *Huds.* — Alb. de l'Est. — Bois de Cheminon ; sous les chênes. les charmes et les buissons de houx. — AR. — Automne. — *Vénéneux.*

3^e FAM. — **Lycoperdinées.** — *Fries.*

Hymenium charnu puis pulvérulent.

1^{er} GENRE. — **PTYCHOGASTER.** — *Corda.*

618. — **PTYCH. ALBUS.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Cette fongosité est considérée par certains auteurs, comme une Lycoperdinée à cause de son péridium et de sa consistance charnue, pulvérulente. — Selon moi, elle n'est

pas autonome, mais seulement un état conidien d'un Hydne ou d'un Polypore. (Fragilis ou boréalis). Elle croît sur les troncs de pins et de Thuya coupés près du sol et sur leurs racines. — Soulanges, St-Amand. — AR. — Automne.

2^e GENRE. — **ECCHYNA**. — *Fries*.

619. **ECCH. FAGINEA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Ce petit champignon nommé jadis *Pilacre* ou *Onigena* et en dernier lieu *Ecchyna* par Fries et Boudier est, comme l'espèce précédente, un état conidien d'un type parfait non encore déterminé. — Il croît sur les troncs et les branches de hêtres abattus. — Charmont, Trois-Fontaines, etc. — AC. — Automne.

620. **ECCH. PORICOLA**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette espèce une seule fois, mais en assez grande quantité sur les tubes d'un *Polyporus salicinus* parasite sur saule Marceau; elle diffère d'*Ecchyna faginea* par sa station, par la coloration plus foncée de son peridium et par l'épaisseur de son stipe. Elle est à n'en pas douter, comme la précédente un état conidien particulier. — St-Amand, dans les bois du Rupt. — Automne.

3^e GENRE. — **SCLERODERMA**. — *Pers*.

651. **SCLER. VULGARE**. *Fries*. — Atl. Champ. *Ch. R.* et Roze, p. 223, pl. LXVI. — CC. — En automne dans les allées et sous les chênes des forêts de Sermaize, Vavray-le-Petit. — *Vénéneux*.

622. **SCLER. VERRUCOSUM.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 223, pl. LXVI. — Bois de St-Amand à Aulnay ; forêts de Reims, Trois-Fontaines, etc. — CC. — Automne. — *Vénéneux.*

4^e GENRE. — **UTRARIA.** — *Tourn.*

623. **UTR. HIRTA.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — Dans les forêts de Charmont, Trois-Fontaines, etc. Sous les charmes et sous les chênes. — AC. — Automne.
624. **UTR. ECHINATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois en automne entre Sermaize et Trois-Fontaines, au lieu dit la *Colotte*. Péridium pourvu de longs aiguillons. — RRR.
625. **UTR. PRATENSIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Prairies près des bois de Charmont, St-Eulien, etc. — AC. — Printemps, Automne.
626. **UTR. EXCIPULIFORMIS.** *Pers.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 220, pl. LXVII. — Commun en été dans les forêts de Cheminon, Vanault-les-Dames, etc.
627. **UTR. PYRIFORMIS.** *Linn* — Alb. de l'Est. — Sur la terre des bois nouvellement défrichés. Croît en groupes compacts sous les chênes. — St-Remy-en-Bouzemont, Vavray, etc. — Automne.

5^e GENRE. — **GLOBARIA.** — *Pers.*

628. **GLOB. GIGANTEA.** *Rotsk.* — Alb. de l'Est. — AR. — Jardins, champs par les temps humides — Péridium globuleux, couleur de gant de

peau blanche ; muni à la base d'un pédicule radiciforme mince et court, de grosseur variable. Un remarquable spécimen trouvé à Soulanges au mois de Juillet, sur la craie, mesurait un mètre 15 centimètres de circonférence ; tout en attribuant à la glébe les deux tiers de la substance du champignon, on peut affirmer qu'il ne renfermait pas moins de vingt millions de sporules ou graines. J'ai reçu aussi de St-Remy-en-Bouzemont la Var. *Glob. Craniolare* de Paulet, de 65 centimètres de circonférence, affectant la forme d'un crâne humain. — *Comestible* étant jeune.

6^e GENRE. — **GEASTER.** — *Mich.*

629. **GEAST. HYGROMETRICUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Terrains silicieux de la montagne de Reims. — AR. — Été.

7^e GENRE. — **TULASNODEA.** — *Fries.*

630. **TUL. MAMMOSA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur les collines herbues des terrains calcaires à St-Amand, Soulanges. etc. — dans le voisinage des sapinières. — Automne. — AC.

4^e FAM. — **Hypogées.** — *Berk.*

Peridium membraneux, indéhiscant ; glèbe lacuneuse, déliquescente, privée de capillitium.

1^{er} GENRE. — **RHIZOPOGON.** — *Fries.*

631. **RHIZ. LUTEOLUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est.

— A demi enfoui ou superficiel sur la terre dénudée et crayeuse des bois de pins sylvestres.

— Soulanges, Lisse, Bassu, etc. — CC. — Automne, Été.

2^e GENRE. — **HYMENOGASTER.** — *Witt.*

632. **HYM. LEPTONIASPORUS.** *Ch. R.* — Alb.

de l'Est. — *Nov. spec.* — Cette espèce a été récoltée par M. Jannet Sophrone de St-Lumier-en-Champagne, en Septembre, dans les champs de la plaine située entre Bassuet et St-Lumier.

Elle croît dans la terre comme les truffes, et c'est en culbutant le sol crayeux avec la charrue que les échantillons ont été découverts en abondance dans plusieurs champs de luzerne.

C'est la seule espèce de la famille qui possède des spores roses, anguleuses, semblables à celles de *Leptonia*. — Se retrouve tous les ans dans la même contrée. — RR.

3^e ORDRE. — **PLASMODIOPHORES.** — *Fuckel.*

1^{re} FAM. — **Myxomycètes.** — *De By.*

Mycelium absent, d'abord substance mucilagineuse, informe, fluxile. puis prenant une consistance déterminée suivant les Genres.

1^{er} GENRE. — **LYCOGALA.** — *Mich.*

633. **LYC. EPIDENDRON.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Périidium rouge - minium, enfin brun - grisâtre, ponctué. Spores jaunâtres, tuberculeuses. — Sur les vieux troncs et souches d'arbres déracinés. — CC. — Automne, printemps.

634. **LYC. LENTICULARE.** *Dur.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et branches de frênes abattus depuis deux ou trois ans — Périidium lenticulaire, rouge - clair puis brun, inséré sur une membrane blanche; filaments du capillitium moins rugueux que dans l'espèce précédente — Bois et chantiers — AC. — St-Amand, Ablancourt. — Automne.

2^e GENRE. — **RETICULARIA.** — *Bull.*

635. **RET. UMBRINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et pieux de pins sylvestres; d'abord argenté puis brunâtre — quelquefois

de la grosseur d'un œuf — AC. — Automne.
— Soulanges, St-Amand, etc.

636. **RET. CARNEA.** *Schum.* — Alb. de l'Est. —
Mêmes localités et station — Périidium rosé,
marqué de veines anastomosées, blanches puis
brunes. — AR. — St-Amand. — Automne.

637. **RET. ATRA.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est.
— Sur le bois dénudé de pin sylvestre. —
Automne, printemps. — CC. — Soulanges, La
Chaussée. — D'abord blanc de lait puis noir ;
capillitium noir-brun.

3^e GENRE. — **ÆTHALIUM.** — *Link.*

638. **ÆTH. SEPTICUM.** *Lin.* — Alb. de l'Est. —
Sur le tan dans les serres et les jardins. —
CC. — Été, automne. — Sermaize, Soulanges,
etc.

639. **ÆTH. FLAVUM.** *Link.* — Alb. de l'Est. —
Sur les troncs de pins et de peupliers coupés
près du sol ; sur les tiges et les feuilles de
graminées dans les bois. — AC. — Été, automne.

4^e GENRE. — **TRICHIA.** — *Hllr.*

640. **TRICH. FALLAX** *Pers.* — Alb. de l'Est. —
Sur les rameaux de chêne pourris ; bois de
Sermaize. — Passant, selon l'âge, du blanc au
rouge-vermillon puis au jaune, au brun et au
noir. — Été. — AC.

641. **TRICH. RUBIFORMIS.** *Pers.* — Alb. de
l'Est. — J'ai récolté cette espèce sur une souche
de peuplier, dans les bois de St-Amand, au

mois d'Août. Elle se compose de faisceaux épars, chacun de 6 à 8 peridium noir-bleu, avec des opercules brillants comme du jais. Les filaments et les spores sont rouges. — RR.

642. **TRICH. PYRIFORMIS.** *Hoff.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois pourri au niveau du sol. — Peridium en forme de poire jaune-orangé, à pédicule brun. — CC. — Printemps, Automne.

643. **TRICH. BOTRYTIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs cariés, dans les lieux humides. — Automne. — St-Amand. Lisse, etc. — Le même pédicule porte deux ou trois peridium rouges. — CC.

644. **TRICH. CHRYSOSPERMA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur les souches, écailles, rameaux pourris. — CC. — Dans les bois, les jardins. — Automne, printemps.

645. **TRICH. SERPULA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Peridium flexueux, réticulés, jaunes. — Naissant sur le bois de peuplier, d'aulne, etc. — CC. — Automne.

5^e GENRE. — **ARCYRIA.** — *Hill.*

646. **ARC. CINEREA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux dépouillés d'écorce et branches pourries. — Peridium blanc-grisâtre ainsi que les spores. — Bois de Sermaize, Vanault-les-Dames, etc. — Automne. — C.

647. **ARC. PUNICEA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur vieilles branches de chêne humides, dans les forêts — Cheminon, Charmont, etc. — Couleur de chair ou rose. — AC. — Automne.

648. **ARC. NUTANS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Peridium très longs, groupés, fasciculés, jaune-pâle ; — AR. — Sur troncs cariés et humides. — Sermaize. — Automne.

6^e GENRE. — **DICTYDIUM.** — *Schrad.*

649. **DICT. UMBILICATUM.** *Schrad.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs pourris de pins sylvestres. — CC. — Automne. — Soulanges, Bassu, etc.

7^e GENRE. — **CRIBARIA.** — *Schrad.*

650. **CRIB. VULGARIS.** *Schrad.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois pourri à St-Amand. — RR. — Peridium enveloppé supérieurement d'un réseau et muni inférieurement d'une membrane cupulaire crénelée, striée ; pédicelle noir.

8^e GENRE. — **PERICHENA.** — *Fries.*

651. **PER. POPULINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur l'écorce et les écailles humides du peuplier abattu. Dans les bois de Soulanges, St-Amand, etc. — Automne. — CC. — Capillitium rare ou nul.

652. **PER. STROBILINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur et entre les bractées des cônes de Pinus abies à Ablancourt. — Automne. — RR. — Spores rondes, ovales, granuleuses, incolores. — Selon Oersted, ce champignon appartient aux *Uredinées* et sa place serait près du *Peridermium pini*.

9^e GENRE. — **TUBULINA.** — *Pers.*

653. **TUB. FRAGIFORMIS.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— Cette espèce peu commune croît sur le bois pourri et sur les mousses qui le recouvrent. Je l'ai trouvée plusieurs fois dans les bois humides à St-Amand et à St-Lumier ; elle ressemble à une fraise mûre.

10^e GENRE. — **SPUMARIA.** — *Pers.*

654. **SPUM. ALBA.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Croît en Automne, par les temps humides, sur les rameaux tombés, sur les plantes et les feuilles de graminées ; d'abord sous forme d'une goutte de crème blanche, puis d'une substance grise, sèche, friable, remplie de spores brunes ou noirâtres. — CCC. — Surtout dans les sapinières.

11^e GENRE. — **STEMONITIS.** — *Fries.*

655. **STEM. TYPHOIDES.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Peridium à l'état de maturité rassemblés en faisceaux sur les vieux troncs cariés. Lieux humides des bois. — CC. — Automne. — Ressemble en miniature à des groupes de têtes de Typha. — St-Amand.
656. **STEM. OVATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois pourri de pin sylvestre. — groupé mais chaque individu distinct. — Peridium ovale, brun. — AC. — Automne.

657. **STEM. PHYSAROIDES.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois à Ablancourt. — Automne. — RR. — Péridium sphériques.

12^e GENRE. — **CARCERINA.** — *Fries.*

658. **CARC. SPUMAROIDES.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce, dans sa jeunesse ressemble à *Spumaria alba* ; en vieillissant, la membrane extérieure blanche devient rose et les peridium sessiles, serrés l'un contre l'autre s'accusent nettement : leur sommet est alors couvert de la première enveloppe blanchâtre, fugace, et dessous se trouve une seconde enveloppe brune plus résistante. Quand les peridium sont vides de leurs spores brunes, ils ressemblent à des alvéoles d'abeilles. — Automne-Hiver. — Dans les sapinières. — St-Amand. — AC.

13^e GENRE. — **BADHAMIA.** — *Berk.*

659. **BADH. UTRICULARE.** *Berk.* — Alb. de l'Est. — Très belle espèce sur l'écorce du bois de tremble et de bouleau ; dans les chantiers à St-Amand. — Peridium en grappes, couleur d'or, puis d'un beau bleu-violacé. — AR. — Automne.

14^e GENRE. — **ANGIORIDIUM.** — *Grev.*

660. **ANGIOR. SINUOSUM.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les feuilles mortes et les détritux de végétaux dans les bois, les jardins. — Automne, Printemps. — CCC.

15^e GENRE. — **DIDERMA**. — *Pers.*

661. **DID. DIFFORME**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — On rencontre cette espèce toute l'année pendant les temps humides sur les feuilles pourries et sur les végétaux mis en tas dans les jardins, les bois. — Partout.
662. **DID. GLOBOSUM**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce enveloppe les feuilles et les brindilles tombées à terre, dans les lieux herbus des plantations de pins et dans les bois ombragés. Elle ressemble à une masse d'œufs d'insectes placés sur une membrane blanche. — CCC.
663. **DID. CONTEXTUM**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois sur un tronc de Sabine à Ablancourt. — Peridium irréguliers, sinueux, jaune-soufre pâle ; spores granuleuses brunes. — R. — Automne.
664. **DID. TREVELYANI**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois de St-Lumier. — Sur rameaux de peuplier. — Peridium jaune-nankin, sessiles, divisés en 4 ou 5 segments rabattus en rosette. — Automne. — R.
665. **DID. FLORIFORME**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Bois d'Aulnay, St-Amand. — Automne. — Sur les troncs coupés de peuplier. — Le péricarpium est disposé comme celui de *Did. Trevelyani*, mais porté par un pédicule flexueux, élégant, inséré sur une membrane blanche très visible. — R.

16^e GENRE. — **DIDYMIUM.**

666. **DIDYM. HEMISPHERICUM.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles et sur les tiges pourries mises en tas dans les jardins, etc. — Printemps, Automne. — Peridium blanc, aplati, pédiculé. — Partout.
667. **DIDYM. MELANOPUS.** *Schrad.* — Alb. de l'Est. — Bois couverts de St-Lumier, St-Amand, La Chaussée, etc. — En Automne. — Sur écailles de peuplier. — Peridium blanc, squameux-farineux ; pédicelle noir. — AR.
668. **DIDYM. MARGINATUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette espèce sur les chaumes de blé mis en tas. — Elle est remarquable par son peridium sphérique, blanc-verdâtre, porté par un pédicule couleur de chair ou jaune, strié longitudinalement, terminé au sommet par un bourrelet ou marge crénelée. Spores rondes, chagrinées, brunes. — Automne. — Bois de St-Amand. — RR.

17^e GENRE. — **LEOCARPUS.** — *Pers.*

669. **LEOC. VERNICOSUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Commun en automne dans les sapinières, sur les brins d'herbe et sur la mousse. — Soulanges, Lisse, etc. — Peridium jaune d'or, brunissant, à surface lisse et luisante. — Automne.

18^e GENRE. — **CRATERIUM**. — *Fries.*

670. **CRATER. PEDUNCULATUM**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — AC. — Sur brindilles de bois, racines et tiges rampantes encore vertes. Lieux humides des bois et jardins. — St-Amand, St-Lumier.
671. **CRATER. MINUTUM**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Plus petit que le précédent; pédicule plus court, lacuneux. — AR. — Mêmes localités. — Automne.
672. **CRATER. LEUCOCEPHALUM**. *Hoff.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et tiges encore vertes. Bois de St-Lumier. — Automne. — AR. — Pédicule violacé-strié.

19^e GENRE. — **PHYSARUM**. — *Pers.*

673. **PHYS. ALBIPES**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Fréquent sur le bois et les feuilles pourries. Peridium et pédicule blancs, rugueux, striés. — AC. — Dans les bois humides, les jardins. — Automne.
674. **PHYS. COLUMBINUM**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de peuplier, inséré sur une membrane blanche. — Espèce élégante et très petite. Pédicelle noir, filiforme; peridium sphérique, violacé-noir ou bleuâtre. — AR. — Automne. — Soulanges.

675. **PHYS. STRIATUM. Var. Cœsium. Schum.**

— Alb. de l'Est. — Sur souches et troncs cariés, à fleur de terre. — AC. — St-Amand, Soulanges, etc. — Automne.

Var. Aurantium. Fries. — Sur le bois de chêne pourri ; Forêts de Sermaize, Vanault-les-Dames. — AR. — Capillitium blanc, spores brunes.

4^e ORDRE. — **HYPODERMÉS.** — *De By.*

1^{re} FAM. — **Ustilaginées.** — *Tul.*

Petites plantes parasites, sous-épidermiques, pulvérulentes, détruisant les tissus.

1^{er} GENRE. — **USTILAGO.** — *Tul.*

676. **UST. ANTHERARUM. Tul.** — Alb. de l'Est.

— Sur les pelouses et bords des bois de Verzy ; les capsules fructifères de *Silene otites* sont envahies par cette espèce à spores brun-pourpre, échinulées. — RR. — Automne.

677. **UST. URCEOLORUM. Tul.** — Alb. de l'Est.

— Envahit les épillets du *Carex glauca*. Ces épillets sont couverts de tubercules formés par le développement anormal des ovaires noircis et agglomérés. d'où s'échappent des amas sphériques de spores noires ; les épillets sains

restent verts et fertiles. — En Été, sur les pelouses sèches des sapinières de Soulanges. — AC. — Automne.

678. **UST. OLIVACEA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les épillets de *Carex maxima*. — Il détruit les ovaires sans déformer sensiblement l'épillet et produit des masses de spores ovoïdes, brun-verdâtre, très petites (0^m 006) — Bords des fossés et des ruisseaux — St-Lumier. — AR. — Automne.

679. **UST. RECEPTACULORUM.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce attaque les réceptacles du *Tragopogon pratense*, dont il arrête le développement et détruit la substance. Les spores sont violettes-noirâtres, tuberculeuses et semblent munies de cloisons comme dans celles des *Thecaphora*. — CC. — Automne. — Dans les prairies ; Soulanges, La Chaussée, etc.

680. **UST. VAILLANTII.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cet Ustilago envahit l'intérieur de la corolle du *Muscari comosum*, et bien que cette dernière reste intacte en apparence ainsi que l'ovaire, la plante devient stérile. Les spores d'un brun-noirâtre sont elliptiques ou rondes. — AR. — Côte de Gravelines. — Automne.

681. **UST. SEGETUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les glumes, les ovaires et les épillets de l'orge et de l'avoine. — Il détruit complètement ces organes, de sorte qu'il ne reste plus que le rachis couvert de spores noires, rondes ou ovales. — CCC dans les moissons.

682. **UST. LONGISSIMA.** *Sow.* — Alb. de l'Est. Croît sur les feuilles de *Poa aquatica* en formant de longues lignes brunes ; l'épiderme blanc d'abord, brunit, se rompt et laisse échapper des spores rondes très petites (0^m 003) — Automne. — Le long des ruisseaux. — CCC.
683. **UST. DESTRUENS.** *Duby.* — Alb. de l'Est. — Envahit les épillets de Millet qu'il convertit en une poussière noire, masse de spores brunes, rondes ou ovales. — AC. dans les jardins. — Temps humides d'Automne. — St-Amand, près du moulin Husson.
684. **UST. MAYDIS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cet Ustilago attaque les tiges et les épis de Maïs. — Il forme de gros tubercules blancs-rosés qui égalent la grosseur d'une noix ou d'un œuf de pigeon. L'enveloppe se crève et laisse échapper des myriades de spores brunes échinulées, entremêlées de lambeaux filamenteux — Champs de maïs. — Automne. — St-Amand. — RR.

2^e GENRE. — **TILLETIA.** — *Tul.*

685. **TILL. CRIES.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Le Tilletia, carie du blé, attaque les ovaires du blé sans en changer la forme. — Le grain noircit et en le triturant on fait sortir des spores rondes, brunes, tuberculeuses mêlées à quelques filaments, répandant une odeur de marée. — CC. dans certaines années, moissons. — Partout.

3^e GENRE. — **UROCYSTIS**. — *Lév.*

686. **UROCYST. POMPHOLIGODES**. *Lev.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les feuilles des Renonculacées, notamment de la Ficaire — Elle forme des bulles bleuâtres recouvertes par l'épiderme qui se déchire et met à nu des groupes distincts de spores agglutinées (15 à 20), mêlés à quelques filaments fugaces. Spores ovales, brunes. — AR. — Printemps. — Bords des ruisseaux — St-Amand.
687. **UROCYST. COLCHICI**. *Str.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les feuilles languissantes d'*Ornithogalum umbellatum* et forme des phlyctènes bleuâtres, elliptiques qui renferment des spores semblables à celles de l'espèce précédente et affectant la même disposition en glomérules. — Bois de St-Amand à St-Lumier. Au mois de mai. — AR.
688. **UROCYST. VIOLÆ**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette espèce sur *Viola odorata* ; elle croît sur les tiges, les stolons et les pédoncules fructifères ; le renflement des phlyctènes est relativement plus considérable que dans les autres espèces, mais les spores et les globules sont absolument semblables.

4^e GENRE. — **THECAPHORA**. — *Tul.*

689. **THEC. DELASTRINA**. *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce envahit au printemps les capsules de *Véronica agrestis*. La capsule

prend une teinte bleuâtre due à la présence des spores bleues , verruqueuses du Thecaphora. — Champs de blé ; St-Amand , Lisse. — AC.

690. **THEC. VERONICÆ HEDERÆFOLIÆ.** *Tul.*
Alb. de l'Est. — Ce Thecaphora attaque les capsules de *Ver. hederæfolia*. — Il se comporte comme le précédent, seulement ses spores sont lisses et non verruqueuses. — Printemps. — mêmes localités. — AC.
-

2^e FAM. — **Urédinées.** — *Tul.*

Plantes parasites, sous-épidermiques, ne détruisant pas les tissus.

1^{er} GENRE. — **PERIDERMUM.** — *Tul.*

- 691 **PER. PINI.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Renflements vésiculeux d'un beau jaune-d'or, disséminés sur les troncs et les branches de jeunes Pins sylvestres , remplis de spores rondes de couleur jaune - orangée, superposées en manière de chapelet . On appelle vulgairement cette espèce BALAI DES SORCIÈRES. Sa présence est un fléau qui détruit des plantations entières. — Automne. — Soulanges, Bassu, etc. — AC.

2^e GENRE, -- **ENDOPHYLLUM**. — Lév.

692. **ENDOPH. PERSONII**. Lév. — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les feuilles de *Sedum sempervivens*. Le tissu du Sedum forme un pseudo-péridium qui contient les stylospores placées en chapelet comme celles des *Æcidium*. L'épiderme qui recouvre la pustule se rompt rarement. Sur la Joubarbe des toits à Soulanges. Mars. — RR.

3^e GENRE. — **COLEOSPORIUM**. — Lév.

693. **COLEOSP. MINIATUM**. Pers. — Alb. de l'Est. — Croît sur les tiges, pédoncules et feuilles encore verts de *Rosa canina* et forme des pustules d'un beau rouge vif, pulvérulentes, oblongues. Les spores en massues allongées, bi-triloculaires, jaune-d'or, sont entremêlées de stylospores rondes, échinulées. — AC. — Dans les haies et les jardins. — Été-Automne.

694. **COLEOSP. SONCHI**. Tul. — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Sonchus arvensis*. Spores jaunes. Stylospores rondes, échinulées, de même couleur. — CC. — Champs. — Été-Automne. — Partout.

695. **COLEOSP. TUSSILAGINIS**. Lév. — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Tussilago farfara*. — Été, Automne. — Champs, bords des routes. — CCC.

696. **COLEOSP. CAMPANULACEARUM.** *Fries.*
— Alb. de l'Est. — Envahit entièrement la face inférieure de diverses campanules, notamment de *Campanula rapunculoïdes*. — Été-Automne. — CCC.
697. **COLEOSP. SENECTIONIS.** *Schlecht.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Senecio vulgaris*. — CCC. — Jardins, champs. — Automne. — Partout.
698. **COLEOSP. RHINANTHACEARUM** *D. C.* — — Alb. de l'Est. — Commun sur les feuilles et les tiges de *Melampyrum*, *Euphrasia*, *Rhinanthus*. — Automne. — Champs, bords des routes. — Partout.
699. **COLEOSP. OCHRACEUM.** *Bon.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles disposées en rosette à la base des tiges d'*Agrimonia eupatoria*. — Automne. — Broussailles, bords des chemins. — CCC.

4^e GENRE. — **MELAMPSORA.** — *Tul.*

700. **MEL. EUPHORBIAE.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Petites taches irrégulières, d'un noir luisant, sous les feuilles et sur les tiges des *Euphorbia*, *Esula*, *Cyparissia*, *Helioscopia*, composées de Téléutospores brunes en forme de graines de Tournesol. l'*Uredo Euphorbiae* est son état stylosporifère.
701. **MEL. LINI.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Fréquent sur les tiges et les feuilles de *Linum*

catharticum. — Sur les pelouses sèches, sur le bord des routes en automne. — AC. — Stylospores, *Uredo Lini*.

702. **MEL. SALICINA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Recouvre souvent les feuilles languissantes de *Salix caprea* en automne, sous forme de petites taches rousses puis noires, proéminentes. Styl. *Uredo Capræarum*.

703. **MEL. POPULINA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les feuilles de *Populus nigra* et *Pyramidalis* tombées. — Automne. — Styl. *Uredo longicapsula*.

5^e GENRE. — **PRAGMIDIUM.** — *Tul.*

704. **PHRAGM. BREVIPES.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sous les feuilles de *Poterium Sanguisorba*, dans le voisinage de l'*Uredo potentillarum* ou sur le coussinet qui lui donne asile. Les téléutospores sont courtes, obtuses au sommet, munies seulement de 2 à 3 cloisons et d'un court pédicelle. — Styl. *Uredo potentillarum*. — AC. — En Automne. — Champs, côteaux herbus.

705. **PHRAGM. INCRASSATUM.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Croît sous les feuilles des *Rubus* en compagnie de l'*Uredo ruborum*. — Styl. Téléutospores cylindriques 5-6 cloisons, brunes. — CCC.

706. **PHRAGM. ASPERUM.** *Wallr.* — Alb. de l'Est. — Envahit pendant l'hiver la face inférieure des feuilles de *Rubus fruticosus*. Elle se

distingue des autres *Phragmidium* par sa surface verruqueuse, par ses trois cloisons et son pédicelle assez long, renflé brusquement à la base. — Dans les bois et le long des haies. — AC.

707. **PHRAG. EFFUSUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. Croît à la face inférieure des feuilles de *Rubus cœsius*, dans les bois de Sermaize. — AR. — Styl. *Uredo gyrosum* plus fréquent.

708. **PHRAGM. ROSARUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Très fréquent après l'été sous les feuilles des rosiers dans les jardins. Sa Téletospore est allongée, brune, à 6 cloisons, verruqueuse et munie d'un mucron conique au sommet; le pédicelle est de même longueur et renflé à la base. — Styl. *Uredo Rosæ.* — Partout.

709. **PHRAG. SPARSUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît en groupes peu nombreux sur les tiges de *Spiræa Ulmaria* et sur les chaumes d'*Agrostis vulgaris*; les individus franchement séparés l'un de l'autre ne sont pas issus d'un strôme commun comme chez la plupart des autres *Phragmidium*. Les sporidies sont cylindriques, apiculées, brunes, munies de 5 à 6 cloisons et de très fines aspérités; les pédicelles sont allongés, incolores et cylindriques. — Récolté dans les bois entre St-Amand et Aulnay-l'Aître. — AR.

6^e GENRE. — **XENODOCHUS**. — *Fuckel*.

710. **XEN. CARBONARIUS**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Le Xenodochus possède des Téléutospores et des Stylospores comme toutes les Puccinées. La disposition remarquable des Téléustopores a motivé la création d'un Genre à part ; elle consiste dans la présence d'une vingtaine de cloisons ou segments ressemblant à des grains de Maïs, superposés et maintenus par l'épispore unique servant de capsule générale. Ces segments ne se désagrègent pas comme dans les *Torula*. — RRR. — Sous les feuilles de *Sanguisorba* déjà envahies par un *Uredo* qui en est la Stylospore. — Sapinières de Bayarne près de Soulanges. — Automne.

7^e GENRE. — **TRIPHRAGMIDIUM**. — *Tul.*

711. **TRIPH. ULMARIÆ**. *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît à la fin de l'été sur les feuilles de *Spiræa Ulmaria*, à la face inférieure. Les Téléutospores sont brunes, rondes ou ovales, tuberculeuses, divisées en trois et plus rarement quatre loges. — Styl. *Uredo Ulmariae*. — C. — Bords des ruisseaux.

8^e GENRE. — **PUCCINIA**. — *De By.*

712. **PUCC. ANEMONES**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Anemone nemorosa*. — Pustules brun-pâle, éparses. Téléutospores à

stipes courts, tuberculeuses, brunes. — R. —
Été. — Forêt de Charmont, Vanault-les-Dames.

713. **PUCC. CALTHÆ.** *Duby.* — Alb. de l'Est. —
Hypophylle sur *Caltha palustris*. Pustules petites,
éparses, rousses. Téléutospores brunes ovales ;
loges resserrées au milieu. — CC. — Automne.
— Bords des ruisseaux ; St-Amand. — Styl.
Uredo Calthæ.

714. **PUCC. PRUNORUM.** *Link.* — Alb. de l'Est,
— Hypophylle sur *Prunus domestica*. Groupes
bruns, épars. Téléustopore courte, échinulée,
étranglée au milieu. — CC. — Jardins. — Styl.
Uredo Prunorum.

715. **PUCC. LYCHNIDEARUM.** *Link.* — Alb. de
l'Est. — Hypophylle sur *Dianthus sinensis*.
Dans les jardins. Pustules brunes sur une tache
jaune-pâle, disposées en cercles concentriques.
Téléutospores brun-clair, stipe court. — CC. —
Rencontré aussi sur *Agrostema Githago*.

Var. Behenis. *Link.* — Hypophylle sur *Silene
inflata*, sans décoloration de la feuille. — CC.
— Automne. — Champs crayeux. — Styl.
Uredo Lychnidearum.

716. **PUCC. FALCARIÆ.** *Fuckel.* — Alb. de
l'Est. — Hypophylle sur *Bupleurum falcarie*.
Pustules éparses, brunes. Téléutospores courtes,
à court pédicelle. — Styl. *Uredo falcarie*,
habitant les mêmes pustules. — AR. — St-
Amand. — Automne.

717. **PUCC. ÆGOPODII.** *Link.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle sur *Ægopodium podagraria*. Teleu-

- tospore ovale, brune ; stipe très court. — R. — Mais commune à St-Amand. — Bois humides. — Automne.
718. **PUCC. TANACETI.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Tanacetum vulgare*. Teleutospore elliptique, rouge brun, stipe très long. — Styl. *Uredo Tanacetii*. — Bords de la Marne. — AC. — Automne.
719. **PUCC. CHONDRILLÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les feuilles et les tiges de *Lactuca perennis*. Pustules noires, arrondies. Téléutospores brunes à court pédicelle. — Styl. *Uredo cichoracearum*. — Champs de terre légère. — AC. — Juillet.
720. **PUCC. OBTEGENS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cirsium arvense* mélangé avec la Styl. *Uredo Suaveolens*. Téléutospore ovale, granuleuse. Stipe court. — CC. — Partout. — Été-Automne.
721. **PUCC. BARDANÆ.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Lappa tomentosa*. Téléutospore brune, tuberculeuse, à stipe court. — Styl. *Uredo Tanacetii*. — C. — Été-Automne. — St-Amand, Francheville.
722. **PUCC. CONII.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Commune sur les tiges de *Conium maculatum*. Elle forme des boursouflures de l'épiderme gris-noir, allongées, se déchirant rarement. Téléutospores brunes, à court pédicelle. — Automne. — Partout.
723. **PUCC. CIRSII.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette Puccinie rare est hypophylle sur *Cir-*

sium oleraceum ; elle forme des tubercules bruns - rougeâtres, épars, aplatis en disques. Téléutospores rougeâtres, vues en masse et d'un jaune doré sous la lentille. Pédicelle égal aux deux loges. — RR. — Bords du Fion.

724. **PUCC. TRAGOPOGONIS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Croît sous les feuilles et sur les tiges de *Salsifis.* en Juillet, accompagné de l'*Æcidium Tragopogonis.* Téléutospores brunes, presque rondes, à stipe très court. — Bois herbus et prairies. — CC. A la fin de l'Été.

725. **PUCC. THESII.** *Chaill.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur les tiges de *Thesium humifusum.* Pustules noires, allongées. Téléutospores brunes, ovales ou pyriformes ; stipe long. — Collines crayeuses de Soulanges, Aulnay. — AR. — Automne.

726. **PUCC. BUXI.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Buxus sempervivens.* Pustules discoïdes brunes. Téléutospores allongées, jaune-miel foncé. Pédicelle très long. — RR. — Jardins. — Printemps.

727. **PUCC. POLYGONORUM.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Polygonum convolvulus* et *hydropiper.* Pustules brunes, longtemps recouverts par l'épiderme. Téléutospores brunes, long pédicelle. — Styl. *Uredo polygonorum.* — CC. — Dans les champs après moissons, et sur le bord des eaux où croît *Poly. hydropiper.*

728. **PUCC. RUMICIS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Hypo. et épiphyllle sur *Rumex acetosa* en

Automne. Téléutospores brunes, courtes, elliptiques, pédicelle presque rudimentaire. — Styl. *Uredo Rumicum*. — CC.

729. **PUCC. CIRCEÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Circea lutetiana*. Tubercules rouge-pourpre, disséminés. Téléutospores allongées, brun-rougeâtre pâle; stipe d'égale grandeur. — CC. — Été. — Bois de St-Amand, Sermaize.

730. **PUCC. EPILOBII.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Epilobium hirsutum*; pustules en cercles concentriques; Téléutospores brunes, oblongues, stipe plus ou moins long. — Styl. *Uredo epilobii*. — AC. — Bords des eaux. — St-Amand, Lisse, etc. — Automne.

731. **PUCC. ASPARAGI.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges et pétioles d'*Asparagus officinalis*; pustules oblongues, confluentes, brunes; Téléutospores allongées, brun-clair; très long pédicelle. Styl. *Uredo Asparagi*. — Hiver, Automne. — CC. — Dans les jardins.

732. **PUCC. VAILLANTIÆ.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Vaillantia cruciata*. Pustules brun-clair; Téléutospores claviformes, de même couleur; stipe très long. — Été, Automne. — CC. — Partout.

733. **PUCC. STELLARIÆ.** *Duby.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Alsine media*; groupe de pustules en cercles brun-roux. Téléutospores oblongues, rousses. — AR. — Bois de St-Lumier. — Été.

734. **PUCC. TEUCRII.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle sur *Teucrium chamædrys*. Pustules tuberculeuses, brun-rougeâtre ; Téléospores brun-rougeâtre, stipe long. — CC. — Automne. — Lieux arides, bords des routes.
735. **PUCC. GLECHOMÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
Hypophylle sur *Glechoma hederacea* ; pustules en cercles brun-rougeâtre. Téléospores de même couleur ; stipe long. — CCC. — Automne. — Bois, jardins.
736. **PUCC. RIBIS.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Epiphyllle sur *Ribes rubrum* ; pustules réunies, formant des taches rondes, brunes, éparses. Téléospores brun-rougeâtre ; stipe plus court. — RR. — Récolté une seule fois. — Jardins. — St-Amand.
737. **PUCC. MENTHÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle sur *Mentha sylvestris* ; Téléospores brunes, courtes, tuberculeuses. — Pédicelle court. — Styl. *Uredo Menthæ*. — CC. — Champs et jardins. — Automne.
738. **PUCC. CALAMINTHÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Clinopodium vulgare*. — Téléospore elliptique, verruqueuse, jaune d'or foncé. — Styl. *Uredo Clinopodii*. — Cette espèce donne asile aux périthèces de *Darlucium*. — CC.
739. **PUCC. GENTIANÆ.** *Link.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle sur *Gentiana cruciata*. — Collines boisées de pins sylvestres. — St-Amand, Soulanges. — AC. — Téléospore ronde-brune, stipe court.

740. **PUCC. DIANTHI, PUCC. AGROSTEMMÆ, PUCC. LYCHNIDIS DIOICÆ**, que j'ai fréquemment récoltés dans nos localités, appartiennent à *Pucc. Lychnidearum*, cité plus haut.
741. **PUCC. MALVACEARUM**. *Mont.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur toutes les Mauves. Téléutospores allongées, brun-clair; pédicelle très long. Cette espèce est aujourd'hui très commune; quand je l'ai récoltée pour la première fois à St-Amand en 1872, elle n'avait pas encore été signalée en Europe; la priorité de ma découverte a été confirmée par la Société botanique de France. — Elle cause de grands ravages dans les jardins.
742. **PUCC. LILIACEARUM**. *Duby.* — Alb. de l'Est. — Hypo. et Epiphylle sur *Ornithogalum pyreneaicum*. Téléutospores ovoïdes, oblongues, brun-pâle; stipe très court. — Automne. — Bois de St-Amand. — R.
743. **PUCC. VINCÆ**. *Cast.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Vinca major* encore en pleine vigueur; les Téléutospores sont brunes, courtes et à peine pédicellées. — Styl. *Uredo Vincæ*. — St-Amand. — Automne. — AR.
744. **PUCC. CALCITRAPÆ**. *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Centaurea calcitrapa*. Téléutospores elliptiques, à peine pédicellées, brunes. — Styl. *Uredo Calcitrapæ*. — Champs après les moissons. — Automne. — AR. — La même espèce sous le nom de *Pucc. Centaureæ*; croît aussi sur *Centaurea Jacea*. — St-Amand.

745. **PUCC. CHÆROPHYLLI.** *Purt.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Chærophyllum temulum*. — CC. — Automne. — Dans les bois et les jardins. — Téléutospores brunes, elliptiques; stipe court.
746. **PUCC. ARUNDINACEA.** *Hedw.* — Alb. de l'Est. — Envahit les feuilles d'*Arundo phragmites* encore vertes; elle forme des stries brunes, longitudinales, visibles des deux côtés de la feuille. Téléutospores oblongues, brunes, stipe de même dimension. — CC. — Bords des ruisseaux. — Automne. — Partout.
747. **PUCC. GRAMINIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Epiphyllle sur les graminées en général, principalement sur le blé et le seigle; les pustules longitudinales contiennent des Téléutospores oblongues, amincies aux deux bouts, brunes, munies d'un pédicelle d'égale longueur. — Styl. *Uredo Linearis*; état hymenifère *Æcidium berberidis*. — CC. — Été.
748. **PUCC. STRIÆFORMIS.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur les gaines de *Phalaris arundinacea*. Sries brunes; Téléutospores claviformes, brunes; stipe très court. — AC. — Bords des ruisseaux. — Automne.
749. **PUCC. CARICIS.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypo. et épiphyllle sur *Carex acuta*. Téléutospores brunes, claviformes; pédicelle égal. — Bois marécageux. — St-Amand, St-Lumier. — CCC.
750. **PUCC. LUZULÆ.** *Lob.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Luzula pilosa*. Téléutospores en

massue , brun-clair ; pédicelle égal. — Styl. ronde, *Uredo Luzulæ*.

751. **PUCC. CORONATA.** *Corda.* — Alb. de l'Est.
— Cette espèce dont certains auteurs ont fait le Genre *Solenodonta* , croît sur les feuilles et sur les chaumes de l'avoine ; Téléutospores d'un brun-fauve , claviformes ; la loge supérieure est ornée, à son sommet de dents radiées en forme de couronne. — CC. — Automne. — Sur les rives des champs qui ont été moissonnés et dans leur voisinage.

9^e GENRE. — **UROMYCES.** — *De By.*

752. **UROM. FICARIÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle et sur les pédoncules de *Ranunculus ficaria*. Groupes brunâtres , tuberculeux . décolorant les tissus voisins. Téléutospores brun-clair, sub-ovoïdes, anguleuses ; pédicelle court. — CC. — A la fin du Printemps, dans les bois humides. — St-Amand, La Chaussée , etc. — Etat hyménifère *Æcidium ranunculacearum*.
753. **UROM. PHASEOLORUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Phaseolus vulgaris*. Téléutospore brun-clair. — AC. — En Automne — Jardins. — St-Lumier, St-Amand, etc. — Etat. hym. *Æcidium Phaseolorum* ; plus rare.
754. **UROM. FABÆ.** *De By.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur les gousses et tiges de *Vicia faba*. Pustules couleur de rouille ; Téléutospores rousses. long pédicelle. — Styl. *Uredo fabæ*. — CC. — Jardins, champs, près des villages. — Automne.

755. **UROM. PISI.** *De By.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Pisum sativum*. Téléutospores brun-roussâtre, ovoïdes cunéiformes. Pédicelle court. — CC. — Jardins. — Été, Automne. — Styl. *Uredo leguminosarum*.

Var. Orobi. *Fuckel.* — Hypophylle sur *Orobis tuberosus*. Mêmes caractères que le type. — AR. — Forêt d'Epernay.

756. **UROM. LABURNI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cytisus laburnum*. Téléutospores brun-rougeâtre, tuberculeuses, à pédicelle très court, en compagnie de l'*Uredo laburni* dans les mêmes pustules. — Commencement de l'hiver. — Jardins.

757. **UROM. BETÆ.** *Kühn.* — Alb. de l'Est. — Epi. et hypophylle sur la *Betterave*. Champs. — Automne. — Téléutospores ovoïdes, rousses; stipe court. — Styl. *Uredo Betæ*.

758. **UROM. POLYGONI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. Hypophylle et sur tiges de *Polygonum aviculare*. Téléutospores rondes ou anguleuses, brunes, stipe long. — Styl. *Uredo polygoni aviculariæ*. — AC. — Champs, après les moissons.

759. **UROM. SCUTELLATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Euphorbia Cyparissias*. Les feuilles attaquées s'épaississent et se déforment. Téléutospores rondes, tuberculeuses; pédicelle court. — CC. — Au printemps. — Sur les collines sèches de la Champagne. — Etat hym. *Æcidium Euphorbiæ*.

760. **UROM. EXCAVATA.** *Lév.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle et sur les tiges d'*Euphorbia dulcis*. — Champs des terrains crétacés. — St-Amand. — AR. — Téléutospores brunes, ovoïdes, stipe court. — Cette espèce ne déforme pas l'Euphorbe comme la précédente.
761. **UROM. GERANII.** *Oth.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Geranium dissectum* et *molle*. Téléutospores ovoïdes cunéiformes, brunes. — Styl. *Uredo Gerani*. — Coteaux d'Epernay. — AR. — Automne. — Champs voisins de la forêt.
762. **UROM. AMBIGUA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur la tige d'*Allium sphaerocephalum*. — AR. — Bois de St-Amand. — Téléutospores coniques, anguleuses, pédicelle de moyenne grandeur. — Styl. *Uredo limbata*.
763. **UROM. FLOSCULOSORUM.** *Kickx.* — Alb. de l'Est. — Groupes hypo. et épiphylls sur *Taraxacum dens leonis*, brun-foncé, tachant la feuille d'une auréole jaune. Téléutospores brunes, ovoïdes-anguleuses. — Styl. *Uredo flosculosorum*.

10^e GENRE. — **URED.** — *Pers.*

764. **URED. HYPERICORUM.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur les tiges d'*hypericum pulchrum*. Pustules éparses ; la face supérieure de la feuille correspondante présente des taches rougeâtres-violacées. — Stylospores orangées.

765. **URED. ARI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Arum maculatum*. Stylospores rondes, tuberculeuses, jaunes. — AC. au Printemps mais plus rare que l'*Æcidium*. — Dans les bois de St-Amand, St-Lumier, etc.
766. **URED. LINI.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Epiphyllle et sur les tiges de *Linum catharticum*. Stylospores rondes, jaunes, tuberculeuses avec stipe court, entourées de paraphyses. Téléuto-spores *Melampsora lini*. — CC. — Automne. — Collines sèches.
767. **URED. EPILOBII.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Epilobium hirsutum*. Pustules brunes, disposées en cercle. Stylospores brun-clair. — Téléut. *Puccinia epilobii*. — AR. — bords du Fion.
768. **URED. LONGICAPSULA.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Populus alba*. Stylospores jaune-d'or, de forme oblongue. — Téléut. *Melampsora populina*. — CCC. — A la fin de l'Été. — Partout.
769. **URED. CAPRÆARUM.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Salix capræa*. Stylospores rondes, tuberculeuses, entourées de cystides. — Téléut. *Melampsora salicina*. — Les pustules de cet Uredo donnent quelquefois asile au *Darluca vagans*. — CC. — Automne.
770. **URED. EUPHORBIAE.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Euphorbia helioscopia*. Stylospores rondes jaune-d'or. — Téléut. *Melampsora Euphorbiae*. CC. — Automne. — Jardins, vergers. — Partout.

771. **URED. PRUNORUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Prunus domestica* ; stylospores brunes, rondes, irrégulières, tuberculeuses, munies d'un très court pédicelle (an *Uromyces* ?) — Téléutospores *Puccinia prunorum.* — CC. — Automne. — Jardins.
772. **URED. POTERII.** *Rbh.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Poterium sanguisorba.* Stylospores rondes, jaunes, entourées de cystides. — Téléut. *Phragmidium mucronatum.* — CCC. — Champs. — Partout.
773. **URED. ROSÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Rosa canina* et autres. Stylospores rondes, jaune-pâle, tuberculeuses entourées de cystides. — Téléut. *Phragmidium rosarum.* — CCC. — Automne.
774. **URED. GYROSA.** *Reb.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle, disposé en cercle et décolorant la feuille. Stylospores arrondies, jaunâtres, portées par un stipe plus ou moins long. — Téléutospores *Phragmidium effusum.* — AR. — forêts de Sermaize, Reims.
775. **URED. RUBORUM.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Rubus fruticosus.* Stylospores arrondies, ponctuées, jaune-pâle, entourées de cystides. — Téléut. *Phragmidium incrassatum.* — C. — Automne, hivers doux. — Partout.
776. **URED. VINCETOXICI.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cynanchum vincetoxicum.* Stylospores rondes, jaune-pâle, habitant les mêmes pustules que les téléutospores, *Cronar-*

tium asclepiadeum. — Automne. — AC. —
Collines herbues de Soulanges.

777. **URED. PÆONIÆ.** *Tul.* — Alb. de l'Est. —
Hypophylle sur *Pœonia officinalis* ; stylospores
rondes, jaunes, à épispore ponctué-épineux,
mêlées avec les téléutospores, *Cronartium*
Pœoniæ. — Fin de l'Été. — AR. — Jardins.

778. **URED. CALTHÆ.** *Rabh.* — Alb. de l'Est. —
Hypophylle sur *Caltha palustris*. Pustules
rousses, éparses, peu nombreuses. Stylospores
rondes, chagrinées, brun-pâle. — Téléut. *Puccinia*
calthæ. — Bords des ruisseaux ou dans
les bois marécageux. — AC. — Été. — St-
Amand, St-Lumier.

779. **URED. FICARIÆ.** *Alb. et Schw.* — Alb.
de l'Est. — Voir *Uromyces Ficarice*.

780. **URED. VALERIANÆ.** *D.C.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle sur *Valeriana officinalis* ; pus-
tules rousses, souvent disposées en cercles ;
stylospores de même couleur, rondes-ovales. —
Téléut. *Puccinia Valerianæ*. — CC. en Été. —
— Bois humides, près des ruisseaux.

781. **URED. GERANII.** *Lév.* — Alb. de l'Est. —
Hypophylle sur *Geranium dissectum* et *molle*.
Stylospore brune, ronde, tuberculeuse. — AR.
— Epernay. — Téléut. *Uromyces Geranii*.

782. **URED. POLYGONORUM.** *D.C.* — Alb. de
l'Est. — Hypophylle sur *Polygonum convol-
vulus* ; Pustules brunes, saillantes et allon-
gées sur les tiges ; stylospores jaune foncé ou

café au lait ; rondes. — Téléut. *Uromyces polygonorum*. — CC. dans les champs après les moissons.

783. **URED. RUMICUM.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypo. et epiphyllé sur *Rumex acetosa*, *crispus*, etc ; stylospores rondes, tuberculeuses, brun-clair, habitant les mêmes pustules que les Téléutospores *Puccinia Rumicum*. — CC. — Automne. — Bois et jardins.

784. **URED. PISI.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Pisum sativum*. Pustules éparses brunes, contenant les stylospores brun-pâle, rondes, finement échinulées, mélangées avec les Téléut. *Uromyces Pisi*. — CC. — Automne. — Jardins.

785. **URED. LABURNI.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cytisus laburnum*. Pustules réunies formant de larges taches rousses contenant chacune des stylospores rondes, roux-clair et les Téléut. *Uromyces laburni*. — CC. avant la chute des feuilles. — Jardins. — Partout.

786. **URED. FABÆ.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur tiges de *Vicia faba* ; pustules rouillées ; stylospores rondes, tuberculeuses. — Téléut. *Uromyces fabæ*. — CC. — en Automne.

787. **URED. FALCARIÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur tiges de *Bupleurum falcariae*. Stylospores rondes, brunes mélangées avec les Téléut. *Pucciniæ falcariae*.

- AR. — Automne. — L'*Æcidium falcariæ*, état hym. est au contraire très commun. — Lieux herbus des coteaux secs. — Partout.
788. **URED. VINCÆ.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Vinca major* ; pustules brunes, contenant les stylospores brun-clair. rondes, état Téléut. *Puccinia vincæ*. — R. — St-Amand, Soulanges. — Automne. — Les tiges des feuilles attaquées meurent dans l'année.
- 789 **URED. ULMARIÆ.** *Mart.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Spiræa ulmaricæ* ; stylospores rondes, jaunâtres, ou rousses mélangées aux Téléut. *Thriphragmidium Ulmaricæ*. — RR. — Automne. — St-Amand.
790. **URED. BETÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Epi. et hypophylle sur la *betterave* ; stylospores rondes, granuleuses, rousses, dans les mêmes pustules que celles de la Téléut. *Uromyces Betæ*. — AC. — Été et Automne, après les pluies. — Jardins et champs cultivés. — Partout.
791. **URED. SCUTELLATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Euphorbia cyparissias*. Stylospores rondes, brunes, tuberculeuses ; sa présence déforme les feuilles. — CC. — Au printemps. — Le long des chemins herbus.
792. **URED. CALAMINTHÆ.** *Fuekel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Clinopodium vulgare*. Stylospores rondes, ponctuées, roux très pâle, mélangées avec les Styl. *Puccinia Calaminthæ*. — Automne. — AR. — Bords des haies, voisinage des jardins. — St-Amand, etc.

793. **URED. MENTHÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Hypophylle sur *Mentha sylvestris*; pustules disposées en cercles. Stylospores brun-clair mêlées aux Téléut. *Puccinia Menthæ.* — CC. — Le long des haies, autour des habitations. — Partout.
794. **URED. LIMBATA.** *Rhb.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Allium sphaerocephalum*, pustules d'un beau jaune, bordées par l'épiderme. Stylospores blanches, globuleuses, granulées, jaunâtres au centre. — Téléut. *Puccinia Alliorum.* — AR. — Automne et Été. — St-Amand. — Champs, bois
795. **URED. VIOLARUM.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Viola canina* et *sylvestris*. Stylospores brun-clair, rondes, granuleuses. — Téléut. *Puccinia violarum.* — AC. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Été.
796. **URED. CYNAPII.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Aethusa cynapium*. Stylospores rousses, rondes, brun-clair. — Téléut. *Puccinia aethusæ.* — AR. — Jardins, champs fumés. — Automne.
797. **URED. CONDRILLÆ.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Lactuca perennis*. Stylospores rondes, brun-clair, verruqueuses. — Téléut. *Puccinia chondrillæ.* — AR. — Champs d'avoine, dans les terrains crayeux. — St-Amand, Soulanges. — Été.
798. **URED. FLOSCULOSORUM.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Sur *Taraxacum*. — Voir *Uromyces flosculosorum*.

799. **URED. CENTAUREÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Epi. et hypophylle sur *Centaurea calcitrapa* et *Centaurea jacea*. Stylospores brunes, rondes, granuleuses ou lisses. — Téléut. *Puccinia calcitrapæ.* — AC. — Champs, prairies, bords des chemins après les moissons.
800. **URED. BARDANÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Lappa communis*. Stylospores rondes, brun-clair, ponctuées, mélangées aux Téléut. *Puccinia bardanæ.* — AC. — Automne. — Bords des chemins, sur les décombres autour des jardins, etc.
801. **URED. TANACETI.** *Str.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Tanacetum vulgare*. Stylospores brunes, globuleuses. — Téléut. *Puccinia tanacetii.* — AR. — Bords de la Marne et sur les graviers destinés à l'entretien des routes.
802. **URED. LAPSANÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Lapsana communis*. — CC. — Été, Automne. — Téléut. *Puccinia Lapsanæ.*
803. **URED. PUSTULATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Epilobium roseum*. Pustules jaunes se rompant rarement; stylospores rondes, jaune-pâle, échinulées. — AR. — St-Amand. — Bois humides. — Automne.
804. **URED. SUAVEOLENS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cirsium arvense*; stylospores brun-olive, rondes, très petites. — AC. — Dans les jardins. — Automne. — Champs. — Téléut. *Puccinia obtegens.*
805. **URED. CONCENTRICA.** *Desm.* — Alb. de

l'Est. — Hypophylle sur *Iucca gloriosa* ; Pustules en cercles concentriques. Stylospores brun-olive, rondes, très petites. — AC. — Dans les jardins. — Automne.

806. **URED. LINEARIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypo. et épiphyllle sur *Triticum vulgare* ; *Secale cereale* ; pustules longitudinales ; stylospores rondes, granuleuses, jaunes. — Téléut. *Puccinia graminis.* — CCC. — Dans les moissons. — ROUILLE DU BLÉ.

807. **URED. ARUNDINACEA.** *Nouvel.* — Alb. de l'Est. — Hypo. et épiphyllle, sur *Phragmites communis.* Stylospores rondes ou ovales, brun-clair, ponctuées. — Téléut. *Puccinia arundinacea.* — CCC. — A la fin de l'Automne et en Hiver.

11^e GENRE. — **ÆCIDIUM.** — *Pers.*

808. **ÆCID. RANUNCULACEARUM.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Ranunculus ficariæ* et *R. Bulbosus*, cupules multifides, renfermant des spores rondes, jaunes. Téléut. *Uromyces ficariæ.* — AC. — Sur la Ficaire ; plus rare sur *R. Bulbosus.* — Printemps. — Lieux humides des bois. — Partout.

809. **ÆCID. PHASEOLORUM.** *Wltr.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Phaseolus vulgaris* ; cupules à l'imbe blanc ; spores blanches. — Téléut. *Uromyces phaseolorum.* — RR. — Trouvé une seule fois à St-Amand à la fin de l'Été, dans un jardin près de la rivière.

810. **ÆCID. QUADRIFIDUM.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Anemone coronaria* ; cupules blanches à l'imbe à 4 segments ; spores blanches. — AR. — Jardins. — Téléut. *Puccinia anemones*.
811. **ÆCID. LEUCOSPERMUM.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Anemone sylvatica* ; cupules blanches ; spores blanches. — AC. — Printemps. — Bois de St-Amand, de Charmont, etc.
812. **ÆCID. URTICÆ.** *Schum.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Urtica divica*. Cupules blanches ; spores blanches. — RR. — Bois de St-Lumier.
813. **ÆCID. GENTIANÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Gentiana cruciata*. Cupules et spores jaunes. — Téléut. *Puccinia gentianæ*. — J'ai découvert cette espèce en 1872, dans les sapinières de Soulanges, longtemps avant qu'elle ne soit signalée par Fuckel. — RR.
814. **ÆCID. CLEMATIDIS.** *Schwz.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Clematis vitalba*. — Cupules et spores jaunes. — RR. — Dans les bois et haies de St-Remy-en-Bouzemont. — Été.
815. **ÆCID. TARAXACI.** *Kze.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Taraxacum dens leonis* ; cupules et spores jaunes. — Téléut. *Puccinia chondrillæ*. — AC. — En Automne. — champs, bois découverts, partout.
816. **ÆCID. CONVALLARIARUM.** *Schum.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Convallaria*

polygonatum ; cupules en cercles sur une tache jaune ; spores orangées. — AR. — Été. — Bois de St-Lumier, etc.

817. **ÆCID. TRIFOLII.** *Cast.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Trifolium repens* ; cupules jauné-pâle ; spores orangées. — Téléut. *Uromyces trifolii*. — AC. — Le long des chemins, dans les prairies. — Été.

818. **ÆCID. EUPHORBIAE.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Euphorbia cyparissias* Cupules jaunes dont la présence déforme considérablement les feuilles ; spores jaunes. — Téléut. *Uromyces Tuberculatus*. — CC. — Soulanges, St-Amand, etc. — Au printemps.

819. **ÆCID. RUBELLATUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Rumex crispus* ; cupules blanches, disposées en cercles sur une tache rouge-pourpre, — Téléut. *Uromyces rumicum*. — AR. — Dans les bois ; au bord des ruisseaux. — St-Amand, Aulnay, etc. — Été, automne.

820. **ÆCID. GROSSULARIAE.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur les fruits de *Ribes Grossulariae*. Cupules à limbe blanc, à spores jaune d'or, sur des taches orangé-pourpre. — R. — Printemps. — Dans les jardins à St-Amand. — Téléut. *Puccinia Ribis*.

821. **ÆCID. VIOLARUM.** *Schum.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur les pétioles de *Viola canina* et *sylvestris*. — Téléut. *Puccinia Violarum*. — AC. — Bois, bords des champs. — Été. — Spores jaunes.

822. **ÆCID. TUSSILAGINIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Tussilago farfara*. Spores jaunes. Le côté correspondant de la feuille, supérieurement, présente des taches rondes, roussâtres, d'un bel effet. — CC. — Champs, bords des routes, partout.
823. **ÆCID. TRAGOPOGONIS.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle et sur les tiges de *Tragopogon pratense* ; spores rondes, jaune-pâle. — Téleut. *Puccinia Tragopogonis.* — CCC. — Champs, prairies ; partout. — Été, Automne.
824. **ÆCID. FALCARIÆ.** *D.C.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Buplevrum falcariae* ; pustules éparses, à limbe blanc. Spores jaunes, rondes. — Téleut. *Puccinia buplevri.* — AC. — Lieux herbus des collines crayeuses. — St-Amand. — Automne.
825. **ÆCID. ARI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Arum maculatum*. Cupules et spores jaunes sur une tache de même couleur. — AC. — Printemps. — Dans les bois ; partout. — L'*Uredo ari* est plus rare.
826. **ÆCID. BERBERIDIS.** *Gmel. (Tubularium).* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Berberis vulgaris*. Spores jaunes. — Téleut. *Puccinia graminis.* — D'après les auteurs la stylospore est la rouille du blé, *Uredo linearis.* — CC. — Jardins, haies. — A la fin de l'été. — Partout.
827. **ÆCID. ELONGATUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Cet æcidium (*Tubularium*) est hypophylle sur *Rhamnus Cathartica*. Cupules tubu-

lées, jaunes. sur une tache brune. Spores jaune-pâle. — Téléut. *Puccinia coronata*. — AC. — Dans les jardins, les haies. — Automne. — La Chaussée, St-Amand, etc.

12^e GENRE. — **PODISOMA**. — *Oest.*

828. **POD. JUNIPERI**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Tubercules jaune-orangé, coniques ; sur les rameaux du *Genévrier commun* qu'il déforme et détruit avec le temps. Ces tubercules sont composés d'une masse de *Téleutospores* biloculaires, réunies, agglutinées en faisceaux, émettant des spores ovales difficiles à observer. — AC. — En Automne. — Soulanges, Aulnay, etc. — L'état hyménifère est *Ræstelia cancellata*.

Var. Clavariæforme. *Duby.* — Tubercules allongés, aplatis en lanières, surtout pendant les pluies. — Mêmes localités.

13^e GENRE. — **RÆSTELIA**. — *Rebent.*

829. **RÆST. CANCELLATA**. *Rebent.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Pirus communis* et sur les pétioles. — CC. — Dans les jardins, en Automne. — La partie correspondante du côté supérieur de la feuille présente une tache d'un beau rouge, couverte de *Spermogonies* ponctiformes. *Stylospores Podisoma Juniperi*. Spores brunes, rondes.

830. **RÆST. LACERATA**. *Var. Mali. Sow.* — Alb. de l'Est. — RR. — Hypophylle sur *Pyrus*

malus. v. Sylvestris. — Découvert une seule fois dans une vallée boisée de Soulanges, sur un pommier sauvage dont toutes les feuilles envahies par les taches rouge-pourpre étaient d'un très bel effet. — Fin de l'Été.

Var. Oxyacantha. Alb. de l'Est. — Cette variété est beaucoup plus commune ; elle attaque les feuilles, les pétioles et les fruits de l'aubépine en Automne. — Lisse, St-Amand, etc.

831. **RÆST. CORNUTA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Sorbus acuparia* ; Périidium allongés, tubuleux, jaunâtres, placés sur une tache brune. Les feuilles attaquées restent longtemps vertes ; spores rondes-irrégulières, brun-rougeâtre. — R. dans la Marne. — Récolté à Bassuet.

14^e GENRE. — **GRAPHIOLA.** — *Poit.*

832. **GRAPH. PHÆNICIS.** *Poit* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur les dattiers dans les serres. — Apparences de petites pezizes noires à centre jaune, remplies de filaments blancs, longs, réunis en faisceau cylindrique, couvert de spores blanches, rondes, très petites. — Communiqué par M. Marcilly, récolté chez lui à Châlons-sur-Marne.

15^e GENRE. — **CRONARTIUM.** — *Tul.*

863. **CRON. ASCLEPIADEUM.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cynanchum Vincetoxicum*. Téléutospores rondes, échinulées, jaune

- d'ambre. Styl. *Uredo Vincetoxici*. — Collines de Soulanges, Possesse. — AR. — Automne.
834. **CRON. PÆONIÆ.** *Fuekel*. — Alb. de l'Est. — Espèce voisine de la précédente, hypophylle sur *Pæonia officinalis*. Columelles couvertes de basides 2-4 spores, jaune-d'or, lisses. Stylosp. *Uredo Pæoniæ*. — AR. — Dans mon jardin à St-Amand. — Automne.

16^e GENRE. — **PHYSODERMA.** — *Wællr.*

835. **PHYS. ERYNGII.** *Corda*. — Alb. de l'Est. — Dans les cellules du parenchyme des feuilles d'*Eryngium campestre*. Sporidies jaunâtres . ovales-irrégulières. CC. — Automne-hiver.
836. **PHYS. MACULARE.** *Wllr.* — Alb. de l'Est. — Petites taches brunes, rondes ; sur feuilles d'*Alisma plantago*. contenant des sporidies assez grosses, rondes. jaune-pâle entourées d'une bordure rougeâtre. — AR. — Automne ; Bords des eaux, lieux inondés des prairies, à Soulanges, La Chaussée, etc.
-

2^e DIVISION.

ENDOSPORES.

5^e ORDRE. — **PHYCOMYCÈTES** — *De Bary.*

1^{re} FAM. — **Péronosporées.** *De Bary.*

Petites plantes filamenteuses, parasites sur les feuilles vivantes, à ramifications extérieures et intérieures terminées par des Sporangies qui contiennent les Spores.

1^{er} GENRE. — **PERONOSPORA.** — *De By.*

837. **PERON. AFFINIS.** *De By.* — Album de l'Est. — Cette espèce croît à la face inférieure et au sommet des lobes des feuilles de *Fumaria officinalis*, sous forme de taches grises velues. — Été, automne. — Jardins et champs nouvellement fumés. — AC. — Terrains crayeux.
838. **PERON. DEVASTATRIX.** *Casp.* — Album de l'Est. — Hypophylle sur les Pommes de terre. — MALADIE DE LA POMME DE TERRE. —

Taches d'abord blanches, puis grises, enfin brunes, envahissant graduellement tout le végétal et occasionnant sa mort. — Acrospores et Zoosporanges (organes de la fructification) ovales. — CCC. — Dans les jardins et dans les champs pendant les saisons d'été pluvieuses. — Partout.

839. **PERON. CHENOPODII.** *Schlecht.* — Album de l'Est. — Hypophylle sur *Chenopodium viride*. Taches jaune-pâle, de teinte violacée au centre dûe à la couleur des acrospores. — Été-automne. — Jardins, champs. — CC. — Partout.

840. **PERON. VITICOLA.** *De By.* — Album de l'Est. — Hypo. et épiphyllé sur les différentes espèces de Vigne. — Ce champignon a fait son apparition dans le midi de la France en 1879. C'est en automne 1883 que j'ai signalé sa présence dans nos vignobles de la Marne, pour la première fois. Les feuilles de vigne envahies brunissent, se dessèchent et tombent avant la maturité du raisin. Les dommages que peut occasionner le *Peronospora viticola*, surnommé le MILDEW des Américains, le font considérer comme un fléau. — CC — Sur les treilles des Jardins et dans les vignobles du Département dont les plants sont de nature délicate. — (Voir : *Rapport sur les maladies de la Vigne* au Comité de Vigilance contre le Phylloxera de la Marne par Ch. RICHON, 1883).

841 **PERON. GANGLIFORMIS.** *Berk.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Sonchus oleraceus*,

Senecio vulgaris, *Lactuca sativa*. Taches blanchâtres, éparses, arrondies, acrospores presque rondes, portées sur des rameaux, terminaux, trifurqués, en petits plateaux triangulaires. —

CC. — Été, Automne. — Jardins, vergers ; partout.

842. **PERON NIVEA.** *De By.* — Alb. de l'Est.

— Hypophylle sur les Ombellifères. — *Cherophyllum temulum*, *Ægopodium podagnaria*, *Angelica sylvestris*, etc. Acrospores ovoïdes, blanches. — Été, Automne. — CCC. — Bois, bords des eaux, jardins. — Partout.

843. **PERON. PARASITICA.** *De By.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce envahit les feuilles, les fruits et les tiges des *Crucifères*, notamment du *Capsella bursa pastoris* ; Les organes attaqués se déforment et donnent souvent asile au *Cystopus candidus*. — CC. — Sur le bord des routes, dans les rues des villages, etc. — Été-Automne.

2^e GENRE. — **CYSTOPUS.** — *De By.*

844. **CYST. CANDIDUS.** *De By.* — Alb. de l'Est.

— Commun sur les feuilles, les tiges et les siliques des *Crucifères*, *Capsella bursa pastoris*, *Cochlearia armorica*, *Alyssum*, etc. Spores et zoosporanges incolores, contenus longtemps sous l'épiderme bulleux de la plante. — AC. — Été-Automne. — Partout.

Les Genres de cette curieuse Famille , classés autrefois parmi les *Urédinées*, possèdent une fructification *Endospore* et doivent prendre place dans cette 2^e Division. Les sporanges internes et externes qui contiennent des Anthéridies font l'office des thèques qui caractérisent les *Endospores* en général.

2^e FAM. — **MUCORINÉES.** — *De Bary.*

Plantes filamenteuses. parasites sur les corps en décomposition ; Ramifications extérieures terminées par des Sporanges.

1^{er} GENRE. — **PILOBOLUS.** — *Coemans.*

845. **PILOB. CRYSTALLINUS.** *Tod.* — Alb. de l'Est. — Filament court , dressé , renflé-vésiculeux vers le milieu, incolore, transparent ; sommet de la vésicule surmonté d'un sporange brun, lenticulaire, contenant des spores ovoïdes. — Croît en automne sur le crottin de cheval et de brebis. — Sur la lisière des bois. — St-Amand, Soulanges. — AR.

2^a GENRE. — **MUCOR.** — *De Bary.*

846. **MUC. MUCEDO.** *Lin.* — Alb. de l'Est. — Touffes de filaments blancs , longs , surmontés chacun d'un sporange brun, relativement petit. — CCC. — Sur la plupart des substances qui entrent en décomposition. — Printemps, Automne. — Partout.

847. **MUC. CANINUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Duvet blanc très dense de filaments ; les uns fertiles surmontés d'un sporange jaune, puis brun ; les autres rampants à la surface des crottes de chien. — Automne. — Partout.
848. **MUC. STERCOREUS.** *Tod.* — Alb. de l'Est. — Touffes de filaments blancs porteurs de sporanges sphériques, jaunes, puis verdâtres. — AC. — Sur les excréments humains. — Partout. — Automne.
849. **MUC. FUNGICOLA.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Filaments fertiles simples ou bifurqués ; sporanges incolores ; spores elliptiques. — Sur les agarics en décomposition. — Fréquent en Automne. — Partout.
850. **MUC. RAMOSUS.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les chapeaux d'agarics en décomposition. Sporangies d'abord blancs, puis gris-bruns. portés par des filaments très rameux, en buisson. — Automne. — CC. — Bois de pins. et forêts.

3^e GENRE. — **SPINELLUS.** — *Vantieghem.*

851. **SPINEL. FUSIGER.** *Vantieghem.* — Alb. de l'Est. — Parasite sur chapeaux de différents agarics, notamment de *Collybia dryophila*. Filaments fertiles très longs, bruns, sporange noir, spores fusiformes, noires. — Bois de pins. — St-Amand. — AR.

4^e GENRE. — **RHIZOPUS.** — *Ehrenb.*

852. **RHIZ. NIGRICANS.** *Ehrenb.* — Alb. de l'Est. — Filaments et sporanges bruns, parasites sur le pain moisi. — En Automne. — Mycelium radiciforme, spore elliptique, chagrinée. — AR.

5^e GENRE. — **THAMNIDIUM.** — *Link.*

853. **THAMN. ELEGANS.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur le crottin de cheval, dans les écuries, en Automne et au Printemps. — CC. — Elle possède deux sortes de sporanges renfermant des spores de même forme et d'égale grosseur. 1^o Un sporange très gros, terminant le filament principal, contenant une grande quantité de spores incolores, ovoïdes; 2^o vers le milieu du filament une couronne élégante de ramifications dichotômes, munies chacune d'un petit sporange contenant de 2 à 4 spores.

6^e GENRE. — **SPORODINIA.** — *Link.*

854. **SPOROD. GRANDIS.** *Link.* — Alb. de l'Est. — — Parasite en Automne sur les chapeaux des Agarics en décomposition. — Cette espèce présente d'une façon très distincte ses *Sporanges* et ses *Zygosporos*, organes qui caractérisent complètement la fructification des *Mucor*. Les *Sporanges* sphériques, à spores rondes-

ovales, gris-bleuâtre sont portés par des filaments arborescents, dichotômes. Les *Zygospores*, résultant de la conjugaison de deux rameaux renflés et du mélange de leur protoplasma, sont brunes, échinulées, visibles à l'œil nu. — AC. — St-Amand, Sermaize, etc.

7^e GENRE. — **MORTIERELLA**. — *Coemans*.

855. **MORT. POLYCEPHALA**. *Coemans*. — Album de l'Est. — J'ai récolté cette espèce sur le crottin de cheval, en mars 1886, à St-Amand. On dirait à première vue un *Botrytis*, mais au microscope on distingue au sommet de chaque rameau latéral ou terminal un sporange contenant une vingtaine de spores incolores. — Les filaments ne sont pas cloisonnés et à leur base on découvre des *chlamydospores* échinulées, à court pédicelle. — AC.

8^e GENRE. — **CHÆTOCLADIUM**. — *Fresenius*.

856. **CHÆT. JONESII**. *Fresenius*. — Album de l'Est. — Cette espèce croît au printemps et en automne, sur le crottin de cheval, dans le voisinage de *Mucor mucedo* et de *Thamnidium elegans*. Ses filaments grêles et rameux rampent comme des lianes ; les branches fructifères, arborescentes se terminent par une pointe allongée ; les ramuscules en verticilles sont terminées par des sporanges granuleux, monospermes, gris ardoisés. — A.C.

6^e ORDRE. — **ASCONÉMÉS.** — *Kickx.*

1^{re} FAM. — **Ascomycées.** — *Kickx.*

*Petites plantes parasites sur les feuilles vivantes,
réduites à une Cellule ou Thèque
contenant les spores.*

1^{er} GENRE. — **EXOASCUS.** — *De Bary.*

857. **EXOASC. ALNI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est.

— Sur feuilles d'*Alnus glutinosa*. Taches grises puis brunes, gaufrant et crispant les feuilles formées par la masse des thèques superficielles, contenant chacune 8 spores ovales, incolores, bisériées. — A.C. — St-Amand, dans les bois avoisinant la rivière.

858. **EXOASC. BULLATUS.** *Berk.* — Alb. de

l'Est. — Sur les feuilles de poirier, boursouflées par sa présence ; thèques cylindriques ou en massue , contenant 8 à 12 spores incolores. — C. Dans certaines années. — Jardins. — St-Amand.

859. **EXOASC. PRUNI.** *Fuhl.* — Alb. de l'Est.

— Cette espèce envahit les jeunes fruits des pruniers et occasionne le développement monstrueux que les horticulteurs nomment la LÈPRE

DU PRUNIER. Les thèques prolongées en un court mycelium contiennent 8 spores rondes ou ovales. — AC. — Printemps.

860. **EXOASC. DEFORMANS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — AC. sur les pêcheurs ; vulgairement nommé CLOQUE DU PÊCHER. — Automne. — Jardins. — Cette espèce attaque les feuilles et les déforme, d'où leur vient le nom de *Cloque*.

2^e GENRE. — **TAPHIRINA.** — *Tul.*

861. **TAPH. POPULINA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Croît à la face inférieure des feuilles de peuplier d'Italie, dès la fin du printemps, sous forme de tache jaune-d'or, située au fond d'une dépression de la feuille. Thèques cylindriques, renflées au sommet ; sporules très nombreuses, jaune-pâle. — CC. — St-Amand.

7^e ORDRE. — **ONIGÉNÉS.** — *Tul.*

1^{re} FAM. — **Onigénées.** — *Tul.*

Plantes parasites sur les substances animales, ayant l'apparence de Lycoperdinées ; filaments du capillitium terminés par des thèques.

1^{er} GENRE. — **ONIGENA.** — *Pers.*

862. **ONIG. CORVINA.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette espèce une seule fois, à St-Lumier-en-Champagne, sur un tas de

détritus où séjournaient depuis longtemps des plumes de pigeon. — RR. — L'*Onigena equina* qui croît sur les sabots de cheval doit être plus commun, bien que je ne l'aie pas encore rencontré dans la Marne.

8^e ORDRE. — **CUPULÉS.** — *Quélet.* — (Discomycètes).

1^{re} FAM. — **Helvellées.** — *Fries.* (*)

Cupules extérieures.

2. 1^{er} — **OPERCULÉS.**

1^{re} TRIBU. — **MITRÉS.**

MORCHELLÉS.

1^{er} GENRE. — **MORCHELLA.** — *Dill.*

863. **MORCH. ESCULENTA.** *Dill.* — (*Morch.*) —
Atlas Champ. Ch. R. et Roze, p. 226 pl.
LXVIII. — **MORILLE.** — Espèce comestible assez

(*) NOTA. — Cette nombreuse Famille vient d'être l'objet d'un important travail de mon savant ami E. Boudier de Montmorency ; nous empruntons sa classification qui résume, pour les *Helvellées*, depuis la tribu des *Mitrés* jusqu'aux *Patellariacés*, les progrès les plus récents de la science.

Dans cette Classification, le Genre *Peziza* de Linn. jusqu'alors adopté a presque complètement disparu ; il renfermait toutes les espèces qui font partie des *Operculés* (à part le *Rhizina* et les *Ascobolés*) et les deux tiers des *Inoperculés*. Comme renseignement, nous avons cru devoir rappeler en abrégé et entre parenthèse, le Genre ancien auquel appartenait chaque espèce.

commune dans les bois des terrains calcaires et dans les plantations de pins sylvestres. — Mi-avril. — Soulanges, St-Amand, etc.

864. **Var. Villatica.** — Cette variété est plus rare et croît spécialement dans les bois tourbeux qui avoisinent la rivière à St-Amand, St-Lumier-en-Champagne ; elle atteint de grandes dimensions, sa couleur est blonde, ses aréoles très larges et son pédicule renflé outre mesure. — Avril, Mai. — AC.

865. **MORCH. COMICA.** *D.C.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 228 pl. LXIX. — MORILLE DES SAPINS. — Cette espèce croît au mois de Mai dans les Sapinières de Soulanges, Bassu. — AC.

2^e GENRE. — **MITROPHORA.** — *Lév.*

866. **MITR. SEMILIBERA.** *D.C.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 230 pl. LXIX. — *Comestible.* — Commune dans les bois de St-Amand, Aulnay, La Chaussée ; sous les Erables et sous les Ormes ; croît environ quinze jours après *M. Esculenta* ; réceptacle conique.

867. **Var. Rimosipes.** *D. C.* — Diffère de l'espèce précédente par son stipe sillonné dans son tiers supérieur de stries longitudinales. — AR.

3^e GENRE. — **GYROMITRA.** — *Alb. de l'Est.*

Gyr. Esculenta. — Commun dans les Vosges ; manque au Département.

HELVELLÉS. — Quél.

1^{er} GENRE. — **VERPA**. — *Schwartz*.

868. **VERP. DIGITALIFORMIS**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — *Comestible*. — Espèce en forme de doigt terminé par un dé à coudre. — Taillis, broussailles. — Soulanges, St-Amand. — AR. — Printemps.

869. **Var. Morchelloides**. — Réceptacle creusé de petites aréoles. — RR. — Mêmes localités.

2^e GENRE. — **LEPTOPODIA**. — *Boudier*.

870. **LEPT. ELASTICA**. *Bull.* — Alb. de l'Est. — *Comestible*. — Bois ombragés, dans les lieux humides. — St-Amand, Sermaize, etc. — Été, Automne. — AC.

3^e GENRE. — **HELVELLA**. — *Linn.*

871. **HELV. CRISPA** et **Var.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 232, pl. LXIX. — *Comestible*. — Commun dans les bois de pins sylvestres à Soulanges, Francheville. Dans les taillis à St-Amand, Aulnay. — Printemps et quelquefois en Automne. — AC.

872. **HELV. LACUNOSA**. *Afz.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 233 pl. LXIX. — *Comestible*. — Plantations de pins sylvestres sur les collines crayeuses de Bayarne, Francheville. — Été-Printemps. — AC.

873. **HELV. MONACHELLA**. *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 234 pl. LXIX. — *Comestible*. — Trouvé une seule fois dans les bois de la montagne de Reims au-dessus de Dizy. — RRR. — Mai.
874. **HELV. ATRA**. *Kon.* — Album de l'Est. — *Comestible*. — Espèce plus petite que les précédentes. — Récoltée une seule fois dans les lieux sablonneux de la Forêt de Sermaize. — Été. — RR.
-

2^e TRIBU. — **CUPULÉS.**

RHIZINÉS.

1^{er} GENRE. — **RHIZINA**. — *Fries.*

875. **RHIZ. UNDULATA**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Terrains siliceux de la montagne de Reims; dans la forêt. — Septembre-Octobre. — RR. — Cette espèce est adhérente au sol par des appendices radiciformes.
-

PÉZIZÉS.

GENRE. — **DISCIOTIS**. — *Boud.*

876. **DISC. VENOSA**. *Pers.* — (*Peziza*). — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 239, pl. LXX. — *Comestible*. — Très grande espèce étalée en

rosace sur la terre des bois et des vergers ,
autour de la rivière à St-Amand, Aulnay ,
St-Lumier. — Mois de Mai. — CC.

877. **DISC. RETICULATA.** *Grev.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Se rapproche de la précédente
et croît dans les mêmes localités. — RR. —
Mai-Juin.

2^e GENRE. — **ACETABULA.** — *Fuckel.*

878. **ACET. ACETABULUM.** *Linn.* — (*Peziza*).
Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 236, pl.
LXX. — *Comestible.* — Sur la terre, dans les
taillis épais de St-Amand à St-Lumier ; à Aulnay-
l'Aître. — Printemps. — AC. — Forme de
ciboire au pied ciselé.

879. **ACET. LEUCOMELAS.** *Pers.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Sur la terre dénudée des plan-
tations de pins sylvestres, sur les hauteurs de
Soulanges, La Chaussée, Bassu. — CC. — Com-
mencement du printemps.

3^e GENRE. — **MACROPODIA.** — *Fuckel.*

880. **MACR. MACROPUS.** *Pers.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Sur l'humus des bois ombragés.
— St-Amand, Trois-Fontaines, Possesse. —
AC. — Été.

4^e GENRE. — **ALEURIA.** — *Fries.*

881. **ALEUR. VESICULOSA.** *Bull.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Espèce ayant l'apparence d'un
gros grelot, croissant sur les fumiers et les

terreaux autour des habitations et dans les jardins. — CC. — Été, Automne. — Partout.

832. **ALEUR. CEREÆ.** *Sow.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Sur la terre des bois ombragés. — Sermaize, St-Amand, etc. — Printemps-Été. — CC. — J'ai trouvé dans les bois de Vavray-le-Grand une variété *Purpuræscens* qui se rapproche de *Pez. Nigrella*. — RR.

883. **ALEUR. EPIXILA.** *Ch. R.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Toutes les espèces du Genre *Aleuria* sont terrestres ; j'ai récolté celle-ci sur les branches de *Juniperus communis* mises en tas sur la terre des bois d'Aulnay-l'Aître ; c'est donc la seule qui soit epixyle ; les échantillons étaient assez nombreux pour affirmer cette nouvelle espèce que j'ai publiée dans les Bulletins de la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François. — RRR.

884. **ALEUR. AMPLIATA.** *Cooke.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Cette espèce est très voisine d'*Al. Vesiculosa* ; elle croît sur les écailles de bois de peuplier humides et mises en tas l'hiver ; plus petite que *Vesiculosa*, sa cupule extérieure est moins furfuracée et sa station est différente. — AC. — Printemps. — St-Amand.

5^e GENRE. — **GALACTINIA.** — *Cooke.*

885. **GALACT. SUCCOSA.** *Berk.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Coupe fragile d'un à 2 centimètres de largeur, exsudant un suc blanc puis

jaunâtre à la cassure. — Bois de Sermaize à Trois-Fontaines. — AR. — Été. — Terrestre.

886. **GALACT. COCHLEATA.** *Pers.* — (*Peziza*).
Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p, 238, pl. LXX.
— Coupe fragile, contournée en limaçon ; extérieur brun-clair, hymenium brun-pourpre. Dans les allées des forêts de Cheminon , Sermaize , etc. — AC. — Automne. — On la dit *Comestible*.

6^e GENRE. — **SARCOSPHERA.** — *Aw.*

887. **SARC. CORONARIA.** *Jacq.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Cette belle espèce presque *hypogée*, croît dans les plantations de Pins sylvestres de St-Amand, de Francheville dès les premiers jours de Mai ; sa déhiscence a lieu par déchirure au sommet qui se divise en 4 ou 6 fragments triangulaires. Ces fragments se déjetent en dehors et donnent à la cupule la forme d'une tulipe dont l'intérieur est d'une couleur violette-tendre puis purpurine. — AR. — Cette espèce a été décrite sous différents noms « *Peziza Corona*. *Jacq.* — *P. Eximia*. *Lév.* — *Schizostoma*. *Ch. R.* — *P. Macrocalyx*. *Riess*, etc.

7^e GENRE. — **OTIDEA.** — *Fuckel.*

888. **OTID. ONOTICA.** *Pers.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Forêt de Trois-Fontaines, Cheminon, dans les tranchées. — RR. — Octobre. — Espèce couleur orangée , en forme d'oreille de lièvre.

889. **S. G. Pseudotis-Abietina.** *Pers.* — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Plantations de Conifères
dans les Parcs. — Ablancourt, Aulnay. — RR.
— Cupule concave, flexueuse, couleur de rouille.
— Automne.

8^e GENRE. — **PUSTULARIA.** — *Fuckel.*

890. **PUST. CUPULARIS.** (*Linn.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Bois-taillis à St-Amand, Char-
mont, etc. — Printemps. — AC.

9^e GENRE. — **PEZIZA.** — *Dill.*

891. **PEZ. AURANTIA.** *Pers.* — (*Peziza*). — Atl.
Champ. Ch. R. et Roze, p. 239, pl. LXX. —
Cupules d'une belle couleur orangée-rouge,
groupées sur les souches et troncs de chênes
coupés à ras de terre. — CC. — Forêts de
Sermaize, Charmont, etc. — Automne.
892. **PEZ. SPLENDENS ?** *Quélet.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Récoltée une seule fois près de
Cheminon, dans les lieux sablonneux de la forêt ? ?
893. **PEZ. POLYTRICHINA.** *Pers.* — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Espèce rare, récoltée sur
les mousses (polytrichs) qui l'enveloppent et ne
laissent voir que la belle cupule orangée qui
tranche sur le vert sombre de son entourage.
— Sermaize. — Automne.

10^e GENRE. — **CALOSCYPHA.** — *Boud.*

894. **CALOSC. FULGENS.** *Pers.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Lieux herbus. pâturages près

des bois de Charmont. — RRR. — Cupules orangées ; spores rondes.

11^e GENRE. — **SARCOSCYPHA.** — *Fries.*

895. **SARCOSC. COCCINEA.** *Jacq.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Cupule pédiculée , blanche extérieurement et d'une brillante couleur rouge-vermillon, pourprée à l'intérieur ; croissant sur les brindilles de bois. — St-Lumier-en-Champagne, Méry-sur-Marne , Soulanges. — AR. — Automne.

12^e GENRE. — **RHIZOPODELLA.** — *Cooke.*

896. **RHIZ. MELASTOMA.** *Sow.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Cupules plus petites que les espèces précédentes brunes, à hymenium noir ; terminées inférieurement par des houppes filamenteuses, radicales. — Croît sur le bois pourri. — Plantations de pins à Soulanges. — AR.

13^e GENRE. — **PSEUDOPLECTANIA.** — *Fuckel.*

897. **PSEUD. NIGELLA.** *Pers.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Croît sur la terre des bois à Sermaize. — AR. — Son disque a la couleur et la taille de *Bulgaria inquinans*. — Printemps

14^e GENRE. — **LEUCOSCYPHA.** — *Boudier.*

898. **LEUCOSC. LEUCOTRICHA.** *Alb. et Schw.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Cupules blanches, velues, hémisphériques. — Sur la terre des lieux ombragés. — Forêt de Charmont. — RR.

15^e GENRE. — **LACHNEA**. — *Fries*.

899. **LACHN. HEMISPHERICA**. *Weber*. — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Commun sur la terre
humide des forêts. — Sous les chênes, les
charmes, etc. — Automne.
900. **LACHN. BRUNNEA**. *Alb.* et *Schw.* —
(*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Croît dans les
forêts, sur la terre où l'on a brûlé du char-
bon. — Cupule brune; disque chamois. — AC.
— Sermaize, Charmont, etc. — Automne.
901. **LACHN. GREGARIA**. *Cooke*. — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Cupules petites, en groupes
serrés, sur le sol de mon jardin, le long des
pins qui bordent les allées. — Extérieur velu,
brun; disque blanchâtre. — AR. -- Automne.

16^e GENRE. — **SEPULTARIA**. — *Cooke*.

902. **SEPULT. ARENOSA**. *Boud.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Croît enfouie dans le sable.
Lieux découverts des forêts de Cheminon à
Trois-Fontaines. — Cette espèce en vieillissant
est envahie par une *Sphériacée* remarquable,
le *Melanospora Zobelii* qui m'a été gracieuse-
ment communiqué par M. Boudier. — Automne.
-

3^e TRIBU. — **LENTICULÉS.**

CILIARIÉS.

1^{er} GENRE. — **TRICHOPHÆA.** — *Boud.*

903. **TRICHOPH. HISPIDULA.** *Sch.* — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Cette petite espèce jaunâtre extérieurement et parsemée de poils bruns-rougeâtres, rigides ; à disque plan, blanchâtre, croît, tantôt sur le sol, tantôt sur les rameaux de peuplier mis en tas, sur la terre humide.
— Pendant l'hiver. Je l'ai récoltée à St-Quentin-Marais. le 15 Novembre 1885.

2^e GENRE. — **CILIARIA.** — *Quélet.*

904. **CILIARIA. SCUTELLATA.** *Linn.* — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Espèce très commune dans les bois, sur la terre près des souches d'arbres abattus. — Été. Automne. — Partout.

3^e GENRE. — **CHEILYMENIA.** — *Boud.*

905. **CHEIL. STERCOREA.** *Pers.* — (*Peziza*). —
Alb. de l'Est. — Sur les bouses de vaches. Bords des chemins ; prairies. — AC. — Automne.
906. **CHEIL. PULCHERRIMA?** *Crcuan.* — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Sur les bouses de vaches.
— Cette espèce considérée jadis comme un *Ascobolus*, ayant un disque non papillé et des

thèques cylindriques est reléguée avec raison dans le Genre *Cheilymenia*.

4^e GENRE. — **ANTHRACOBIA**. — *Boud.*

907. **ANTHR. MELALOMA**. *Alb. et Schw.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Croît dans les forêts, sur la place où l'on a fait du charbon. — Récolté près de Reims, en Automne. — AR. — Cupule rouge-brique ; extérieur squameux.

5^e GENRE. — **MELASTIZA**. — *Boud.*

908. **MELAST. MINIATA**. *Fuckel.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Sur la terre calcaire des fosses où l'on met en réserve les pulpes de betteraves. — AC. à St-Amand, Bassu, etc.

HUMARIÉS.

1^{er} GENRE. — **HUMARIA**. — *Fries.*

909. **HUM. CONVEXULA**. *Pers.* — (*Peziza*). — — Alb. de l'Est. — Sur la terre des sentiers humides ; dans les forêts. — Charmont, Sermaize. — AR. — Automne.
910. **HUM. LEUCOLOMA**. *Hedw.* — (*Peziza.*) — Alb. de l'Est. — Sur la terre ; dans les lieux où séjournent des détritrus azotés et putrescibles ; dans le voisinage des jardins et des maisons de culture.
911. **Var. Uvicola**. *Ch. R.* — Commun dans les vignes sur les dépôts anciens des marcs

de raisin. — Le Type et la Var. C. en Automne. — St-Amand, Bassuet, etc.

2^e GENRE. — **LAMPROSPORA**. — *De Not.*

912. **LAMPR. CRECQ'HERAULTII**. *Crouan*. — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Cette petite espèce, jaune-indien, si remarquable par ses spores rondes, ciliées, m'a été communiquée par M. Boudier, et a été retrouvée depuis sur la terre sablonneuse des bois de Reims. — RR.

913. **LAMPR. CROUANI**. *Boud.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Récolté une seule fois sur la mousse qui tapissait le sol d'un endroit découvert de la forêt, près de Trois-Fontaines. — Automne.

Je possède deux espèces voisines intéressantes : le *Lamprospora Wrightii* et le *Boudiera areolata*. — *Berk.* trouvées par M. Boudier dans les localités identiques du Département de *Seine-et-Oise*. Des recherches ultérieures permettront sans doute de les récolter dans la Marne.

914. **LAMPR. HUMOSA**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre humide, forêt de Sermaize. — AC.

3^e GENRE. — **COPROBIA**. — *Boud.*

915. **COPROB. GRANULATA**. *Bull.* — (*Peziza*). — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur le fumier de vaches. — On la rencontre en Automne dans les prairies où l'on fait pâturer les bestiaux. — CC.

4^e GENRE. — **PYRONEMA.** — *Carus.*

916. **PYRON. OMPHALODES.** *Bull.* — (*Peziza*).
— Alb. de l'Est. — Cette espèce d'un beau rouge vermillon, entourée d'une bordure de mycelium blanc, croît en groupes très nombreux sur la terre où l'on a fait du charbon. — Automne.
— Sermaize, Vanault-les-Dames, etc. — CC.

ASCOBOLÉS.

1^{er} GENRE. — **ASCOBOLUS.** — *Pers.*

917. **ASCOB. FURFURACEUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce la plus développée du Genre croît sur la bouse de vache et sur le crottin de cheval. — Dans les prairies et dans les enclos servant à la pâture. — Partout. — Automne. — CC.
918. **ASCOB. IMMERSUS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les bouses de vaches. plongé dans la croûte grise qui en tapisse la surface. — Bords des chemins, prairies. — Automne. — CC.
919. **ASCOB. GLABER.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Commun sur le crottin de cheval. — Dans les champs et les écuries, presque toute l'année. — Partout.
920. **ASCOB. DENUDATUS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Récolté dans mon jardin sur tiges de *Dahlia* et de *Zimia* en décomposition. — AR.
— Été-Automne.

2^e GENRE. — **SACCOBOLUS**. — *Boud.*

921. **SACC. NEGLECTUS**. *Boud.* — Alb. de l'Est.
— Récolté sur les crottes de brebis. — Hauteurs de Bayarne, Francheville. — AC. — Automne.

3^e GENRE. — **LASIOBOLUS**. — *Boud.*

922. **LASIOB. PILOSUS**. *Boud.* — Alb. de l'Est.
— Très commun sur le crottin de cheval et de brebis dans les pâturages, sur les collines herbues. — Automne.

4^e GENRE. — **ASCOPHANUS**. — *Boud.*

923. **ASCOPH. CARNEUS**. *Boud.* — Alb. de l'Est.
— Commun sur les crottes de brebis et les bouses de vaches ; dans les champs et sur les collines herbues. — Soulanges, St-Amand, etc.
— Automne.
924. **ASCOPH. SUBFUSCUS**. *Boud.* — Alb. de l'Est. — Très petite espèce souvent confondue avec *Riparobius Cookei*, qui l'accompagne sur les excréments de chien. — AR. — St-Amand.
— Automne.
925. **ASCOPH. SPADICEO-NIGER**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce granuliforme, sphérique, brun-foncé, croît sur les crottes de lapin et les brindilles qui entourent les fumiers. — Elle est voisine d'*Ascoph. Ochraceus* de Boud. Ses paraphyses ne sont pas renflées au sommet et

ses spores prennent en vieillissant une légère teinte orune. — St-Amand. — Automne. — Dans les jardins.

926. **ASCOPH. SACCHARINUS.** *Bord.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les substances mélangées aux fumiers, débris végétaux, vieux papiers, toiles pourries, etc. — St-Amand.

5^e GENRE. — **RIPAROBIOUS.** — *Boud.*

927. **RIPAR. COOKEI.** *Crouan.* — Alb. de l'Est. — Récolté sur les crottes de chien recouvertes d'une croûte grise, en compagnie de *Stilbum Erythrocephalum*. Cupule très petite, brun-clair, d'abord sphérique puis aplatie. Thèques larges, contenant 64 spores ovales, incolores. — AC. — Automne-Printemps. — St-Amand, Aulnay.

928. **RIPAR. BRUNNEUS.** *Boud.* — Alb. de l'Est. — Ressemble à l'espèce précédente, mais plus brune et ne contenant que 32 spores. — Mêmes localités. — AR.

929. **RIPAR. MYRIOSPORUS.** *Boud.* — Alb. de l'Est. — Très petite espèce, croissant sur le crottin de cheval. — Inappréciable à l'œil nu; remarquable par ses thèques larges, courtes, ovales, contenant une quantité innombrable de spores. — Printemps. — Dans les écuries. — St-Amand. — AR.

6^e GENRE. — **ASCOZONUS.** — *Boud.*

930. **ASCOZ. CUNICULARIA.** *Boud.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les crottes de lapin. — Espèce

presqu'imperceptible à l'œil nu . Réceptacles sphériques, blanchâtres, couverts de poils courts, blancs, hispides. Thèques larges, à déhiscence en fente bilabiée ; spores elliptiques, allongées, incolores, très nombreuses. — RR.

§. 2^e. -- *INOPERCULÉS.*

4^e TRIBU. **CLAVULÉS.**

GÉOGLOSSÉS.

1^{er} GENRE. — **TRICHOGLOSSUM.** — *Boud.*

931. **TRICH. HIRSUTUM.** *Boud.* — (*Geoglossum*).
— Alb. de l'Est. — Cette espèce plus petite que ses congénères atteint à peine 2 centimètres de hauteur. Elle est d'un brun-foncé, couverte de poils courts, noirs, dressés ; ses spores sont baculiformes, d'un blanc-grisâtre, septées. — Elle croît très rarement dans les plantations de pins. — Bassu. — Automne.

2^e GENRE. -- **GEOGLOSSUM.** — *Pers.*

932. **GEOGL. GLABRUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Cette espèce croît sur la terre des plantations de pins sylvestres, dans tout le Département. — Elle est noire, haute de 4 à 6 centi-

mètres ; sa forme est celle d'une langue ou d'une spatule. — CC. — Automne. — Spore brune, cylindrique, cloisonnée.

3^e GENRE. — **MICROGLOSSUM**. — *Sacc.*

933. **MICROGL. VIRIDE**. *Pers.* — Alb. de l'Est.

Cette espèce presque de même forme que la précédente est de couleur verte. Ses spores sont incolores, cylindriques mais courtes, un peu courbes. — Elle croît dans les taillis des bois de Possesse, Charmont. — Été. — RR.

4^e GENRE. — **LEPTOGLOSSUM**. — *Cooke.*

934. **LEPTOGL. OLIVACEUM**. *Quél.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce m'a été communiquée par le Dr Quélet, et a été récoltée depuis dans la Meuse sur les confins de la Marne. — Nous la citons ici parce qu'elle représente un Genre particulier (existant sans doute dans le Département) remarquable par ses spores incolores, triseptées, en fuseau.

LÉOTIÉS.

1^{er} GENRE. — **HEYDERIA**. — *Fries.*

935. **HEYD. CUCULLATA**. *Batsch.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette petite et élégante espèce dans les bois de pins sylvestres, à Aulnay-l'Aître et à Ablancourt. — En Automne, après les pluies. — Elle est remarquable par son

capitule d'un beau jaune-d'or et son pédicelle brun. — Elle croît en groupes nombreux, sur la mousse. — RR.

2^e GENRE. — **LEOTIA**. — *Hill.*

936. **LEOT. LUBRICA**. *Scop.* — Alb. de l'Est. — Croît dans les lieux humides des forêts de Sermaize, Vanault-les-Dames, etc. — AC. — Automne.

3^e GENRE. — **PILACRE**. — *Fries.*

937. **PIL. FRIESII**. *Wein.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce dont les organes caractéristiques ont été imparfaitement signalés par les auteurs, est le type du Genre *Pilacre*, jadis décrit par *Weinmann* et définitivement fixé par M. Boudier, dans sa classification des *Discomycètes*, 1885. — C'est le fameux champignon des racines de la vigne nommé improprement *Ræstleria hypogea*, par Von-Thümen, et attribué par nous au Genre *Vibrissea*. J'en ai fait la première découverte en France en 1872, et M. Boudier en 1877-1878, sur les racines et souches de l'orme, de l'érable, de la vigne et du pêcher. Depuis cette époque, le *Pilacre* a envahi les vignes du Midi et de la Champagne. — CC. sur la vigne ; RR. sur les racines des autres végétaux. — St-Lumier, St-Amand.
-

5^e TRIBU. — **CARNOSÉS.**

OMBROPHILÉS.

1^{er} GENRE. — **OMBROPHILA.** — *Fries.*

938. **OMBR. CLAVUS.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — La variété *Purpurascens* et la variété *Lilacina* se rencontrent sur les brindilles de bois, notamment sur les écailles de peuplier qui ont séjourné dans les fossés humides. — R. dans les bois de St-Lumier à St-Amand. — Automne.

2^e GENRE. — **CALYCELLA.** — *Fries.*

939. **CALYC. CITRINA.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — J'ai récolté une seule fois cette espèce sur un fragment de cerisier, à demi enfoui dans la mousse, dans une garenne de sapins à St-Amand. — Automne.

3^e GENRE. — **CORYNE.** — *Tul.*

940. **CORYNE SARCOIDES.** *Jacq.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Espèce couleur vineuse, très fréquente sur les troncs abattus des chênes, peupliers, érables, etc. — Son état conidiophore ressemblant à une trémelle frisée, violacée, l'accompagne souvent. — Automne. — Partout.

4^e GENRE. -- **BULGARIA.** — *Fries.*

941. **BULG. INQUINANS.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— *Peziza nigra* de Bull. — Espèce très commune sur les troncs de chênes abattus, dont elle envahit l'écorce en automne et en hiver.
— Forêts et chantiers. — Partout.
942. **BULG. PULLA.** *Karst.* — Alb. de l'Est. — (*Patellaria*). — Sur les souches de peuplier à demi cariées, au bord des cours d'eau à Lisse et à Soulanges. — RR. — Automne.
-

CALLORIÉS.

1^{er} GENRE. — **CALLORIA.** — *Fries.*

943. **CALL. FUSAROIDES.** *Berk.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Croît en Automne et en Hiver sur les tiges desséchées de l'Ortie, sous forme de petits boutons rouge-minium, en compagnie de l'état conidien (*Tremella urticæ* des auteurs. — CC. — Les long des haies, des jardins. — Partout.

2^e GENRE. — **CORYNELLA.** — *Boudier.*

944. **CORYN. ATROVIRENS.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
(*Peziza*). — J'ai récolté cette espèce sur une écaille de bois de frêne cariée, sur la terre, dans les bois de Sermaize. La forme conidio-phore, *Epidochium virens* est plus commune.

945. **CORYN. AUREA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Cette espèce croît sur les chaumes pourrissantes de l'*Arundo phragmites* et sur les rhizomes. — Je l'ai récoltée en Automne dans les fossés du château d'Aulnay-l'Aître et le long d'un ruisseau à Lisse. — Etat conidien CC. — Type RR.

3^e GENRE. — **ORBILIA.** — *Fries.*

946. **ORB. ROZEI.** *Quélet.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — J'ai rencontré maintes fois cette très petite espèce transparente et rouge. à l'aisselle des feuilles mortes de l'*Helleborus viridis*. Ses thèques larges contiennent huit spores ovales, incolores. — Soulanges, sur les collines crayeuses. — Automne.

947. **ORB. FERRUGINEA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Cette espèce récoltée une seule fois à Sermaize sur un morceau de bois pourri, est petite, d'un jaune orangé foncé-transparent, ses spores sont fusiformes, incolores. — RRR.

948. **ORB. RUBELLA.** *Kartlen.* — Alb. de l'Est. — Espèce trémelloïde, glabre, rouge-incarnat, à bords laciniés, crénelés; thèques cylindriques; tronquées au sommet. — Paraphyses terminées en fer de lance. — Spores fusiformes. — Croît en groupes sur l'écorce des rameaux et branches d'orme tombées à terre. — St-Amand. — Automne. — AR

4^e GENRE. — **HYALINIA**. — *Boud.*

949. **HYALIN. CRYSTALLINA**. *Quél.* — Alb. de l'Est. — Petite espèce transparente, sessile, blanchâtre, à bords dentés. — Spores vermiculaires. — Croît sur les écailles de bois pourries et jonchant la terre humide. — St-Amand, St-Lumier. — Automne. — AC.
-

6^e TRIBU. — **CYATHULÉS**.

HÉLOTIÉS.

1^{er} GENRE. — **CIBORIA**. — *Fuckel.*

SOUS-GENRE. — **Stromatinia**. — *Boud.*

950. **STROM. RAPULUM**. *Bull.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*) — Lieux humides et tourbeux des bois de St-Lumier, d'Aulnay-l'Aître où croît ordinairement le *Convallaria polygonatum*. — R. — Été-automne.

SOUS-GENRE. — **Ciboria**. — *Fuckel.*

951. **CIB. AMENTI**. *Batsch.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les chatons du *Salix caprea*, en Avril, dans les lieux où ils ont séjourné l'hiver sous des tas de feuilles. — Aulnay-l'Aître. St-Lumier. — C.

952. **CIB. AMENTACEA.** *Balb.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Sur les écailles des chatons
femelles de l'*Alnus glutinosa*. — En automne
et en hiver, dans les lieux humides des bois
de St-Amand à St-Lumier. — CC.

2^e GENRE. — **PHIALEA.** — *Fries.*

953. **PHIAL. PHIALEA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Sur les branches mortes d'*Alnus
glutinosa* planté dans les lieux marécageux
des bois entre St-Amand et St-Lumier. — AC.
— Automne-Printemps.

954. **PHIAL. BOLARIS.** *Batsch.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Sur les racines et sur les
rameaux du Coudrier tombés à terre. — Prin-
temps-automne. — AC.

955. **PHIAL. FIRMA.** *Bolt.* — Alb. de l'Est. —
(*Peziza*). — Sur les troncs coupés à ras de
terre et sur les branches tombées d'*Alnus glu-
tinosa*. — Automne, hiver. — A.C.

3^e GENRE. — **CHLOROSPLENium.** — *Fries.*

956. **CHLOR. ÆRUGINOSUM.** *Fl. D.* — Alb. de
l'Est. — (*Peziza*). — AR. sur les branches de
chêne tombées à terre et pourries. — Cette
espèce est de couleur verte, son mycelium
envahit le support et lui donne la même teinte.
— Bois de Charmont, Sermaize, etc. — Au-
tomne.

957. **CHLOR. VERSIFORME.** *Pers.* — Alb. de
l'Est. — (*Peziza*). — Espèce rare, récoltée pen-

dant plusieurs années dans l'intérieur d'un saule creux. Dans les bois entre St-Amand et Lisse. — Eté-automne.

4^e GENRE. — **HELOTIUM**. — *Fries*.

958. **HELOT. VIRGULTORUM**. *Walr.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commun sur les rameaux et sur les brindilles pourrissant sur la terre humide des bois. — Automne, Printemps. — Partout.
959. **HELOT. EPIPHYLLUM**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commun dans les forêts de chêne, sur les feuilles tombées. — Sermaize, Charmont, etc. — Automne.
960. **HELOT. HERBARUM**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les grandes plantes herbacées, notamment sur *Urtica dioica*. — Dans les haies, jardins, etc. — CCC. — Automne, hiver.
961. **HELOT. ACICULARE**. *Bull.* — Troncs pourris. — CC. — Dans les forêts.
962. **HELOT. ALNIELLUM**. *Karsten.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commun à la fin de l'automne sur les chatons femelles de l'*Alnus glutinosa* tombés sur le sol humide. — St-Amand, Lisse, etc.
963. **HELOT. CLAVATUM**. *Pers.* — Alb. de l'Est — (*Peziza*). — Commun en Automne sur les tiges sèches d'ombellifères; sur les collines crayeuses, St-Amand, Soulanges.

964. **HELOT. CAULICOLUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les tiges d'asperges. — Automne et Printemps. — Jardins, parmi les détritux des végétaux mis en tas. — St-Amand. — AC.
965. **HELOT. CYATHOIDEUM.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Dans les bois sur les tiges herbacées et sur les pétioles des feuilles. — CC. — St-Amand, Aulnay, etc. — Automne. Printemps.
966. **HELOT. PHYLLOPHILUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Croît sur les feuilles de *Fagus sylvatica*, tombées ; à peine visible à l'œil nu. — Bois du château d'Aulnay-l'Aître. AR. — Automne.
967. **HELOT. SALICELLUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les branches et petits rameaux de Saule morts, encore adhérents au tronc. — Hiver, printemps. — Dans les saussaies marécageuses à Soulanges. — AR.
968. **HELOT. FRUCTIGENUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les glands et sur les pétioles des feuilles de Chêne. — Dans les bois. — Partout. — Automne.
969. **HELOT. PINETI.** *Batsch.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les rameaux et aiguilles de pin après les pluies. — CC. au printemps. — St-Amand.
970. **HELOT. FAGINEUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les péricarpes de *Fagus sylvatica* tombés à terre ; — Forêt de Trois-Fontaines. — Automne. — AC.

971. **HELOT. IMBERBE.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est.
— Sur bois pourri d'*Alnus glutinosa*. — AC. —
Bois de St-Amand, etc.

5^e GENRE. — **CYATHICULA.** — *De Not.*

972. **CYATH. CORONATA.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Commun sur les tiges des plantes herbacées, surtout sur *Urtica dioica*. — Dans les haies. — Automne. — Partout.
-

DASYSCYPHÉS.

1^{er} GENRE. — **DASYSCYPHA.** — *Fries.*

973. **DASYSC. VIRGINEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commun sur les bois cariés et sur les écailles de bois pourries ; dans les bois. — Partout. — Automne.
974. **DASYSC. BICOLOR.** *Bull.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Très commun sur les petites branches de chênes tombées ; dans les bois et les forêts. — Sermaize, St-Amand ; etc. — Automne, hiver.
975. **DASYSC. BRUNNEOLA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Croît sur les petites branches mortes de *Cornus sanguinea*, — AR. — Été. — St-Amand.
976. **DASYSC. CERINA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commun sur la tranche des troncs de peuplier et de frêne coupés à ras de terre ;

se présente sous deux formes, sur le même tronc ; pédécellée et sessile. — Été, automne. — Partout.

977. **DASYSC. ACUUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les aiguilles de pin sylvestre encore adhérentes aux rameaux pourris, sur la mousse. — CC. en automne et au printemps. — Partout.

978. **DASYSC. CILIARIS.** *Schrad.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Espèce extrêmement petite, éparses sur les feuilles de chêne. — Lisse, St-Amand. — Automne. — AR.

979. **DASYSC. FUSCESCENS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Visible seulement à la loupe ; croît sur les feuilles de hêtre. — Bois entre St-Amand et Aulnay-l'Aître. — AR. — Automne.

980. **DASYSC. NIVEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Espèce très petite, difficile à déterminer à cause de sa ressemblance avec *Cyphella villosa* de la famille des *Auricularinées*, et de son hymenium souvent stérile.

981. **DASYSC. PALEARUM.** *Desm.* — Album de l'Est. — (*Peziza*). — Assez commun sur la paille de blé pourrie et mise en tas. — Printemps, hivers doux. — AC. — St-Amand, St-Lumier.

982. **DASYSC. MOLLISSIMA.** *Lasch.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Croît sur tiges mortes d'*Eupatorium cannabinum*, dans les bois de St-Lumier. — En automne et au printemps. — AC.

983. **DASYSC. SERICEA.** *Alb. et Schw.* — *Alb.* de l'Est. — (*Peziza*). — Récolté deux fois sur les souches de chêne, dans la forêt de Trois-Fontaines, au lieu dit la *Colotte*. — *RR.* — Automne.
984. **DASYSC. RUFO OLIVACEA.** — *Alb. et Schw.* — *Alb.* de l'Est. — (*Peziza*). — Espèce très curieuse qui se rapproche beaucoup des *Cenangium*. — Elle croît isolément ou en petit nombre sur les rameaux secs de *Rubus fruticosus*. — Dans les broussailles et le long des termes à St-Amand, Sermaize. — *AR.* — Automne.
985. **DASYSC. HYPOCASTANI.** *Ch. R.* — *Alb.* de l'Est. — (*Peziza*). — J'ai trouvé cette nouvelle espèce, plusieurs années de suite à la face interne des involucre du Marron d'Inde pourrissant sur la terre des bois de St-Lumier-en-Champagne. — Elle est voisine de *Pez. Godroniana* ou *Episcopalis* de Montagne. — Automne. — *RR.*

2^e GENRE. — **LACHNELLA.** — *Fries.*

986. **LACHN. SULFUREA.** *Pers.* — *Alb.* de l'Est. — (*Peziza*). — Espèce commune sur les grandes herbes, au pied des haies, notamment sur *Urtica dioica*, *Sambucus ebulus*. — Automne et hivers doux.
987. **LACHN. CORTICALIS.** *Pers.* — *Alb.* de l'Est. — (*Peziza*). — Croît sur l'écorce de peuplier qui entoure les troncs coupés à ras de terre. — *CC.* en Automne. — Partout.

988. **LACHN. JUNIPERI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Espèce nouvelle récoltée sur les branches de *Juniperus communis*, mises en tas de fagots dans les bois du château à Aulnay-l'Aître. — L'hyménium de plusieurs sujets était blanc-pruineux ; cette pruine était due à la présence d'un champignon parasite, nouveau, que j'ai nommé *Didymaria pezizæ*. — RRR. — en Automne.
989. **LACHN. PRASINA.** *Quel.* — St-Lumier. — Mai 1886, sur chaumes mortes de *Phragmites* et de *Sparganium*. — R.

3^e GENRE. — **TRICHOSCYPHA.** — *Boud.*

990. **TRICH. CALYCINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Espèce jaune d'or à l'intérieur et blanche velue extérieurement, croissant en groupes de 5 à 6 sur les branches mortes de *Pinus sylvestris*. — St-Amand, Bassu, etc. — Automne. — AC.
991. **TRICH. PYGMEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Cette espèce plus grande que la précédente est munie d'un pédicelle allongé ; elle lui ressemble par la couleur de son hyménium et par son extérieur villeux — beaucoup plus rare que la première, je ne l'ai récoltée qu'une seule fois sur les branches de pin sylvestre à Bayarne. — Automne.
992. **TRICH. NIDULUS.** *Kunze.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commune en hiver sur les tiges du *Sceau de Salomon*. — St-Amand, Aulnay. — Bois.

4^e GENRE. — **HYALOSCYPHA.** — *Boud.*

993. **HYAL. DENTATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — J'ai récolté cette espèce sur
un morceau de bois de peuplier carié ; elle
vient en groupes très denses ; la cupule
sessile, blanche, est urcéolée, dentée sur les
bords, très petite. — Bois de St-Amand. — R.
en automne.

URCÉOLÉS.

1^{er} GENRE. — **URCEOLELLA.** — *Boud.*

994. **URCEOL. ASTEROSTOMA.** *Phill.* — Alb.
de l'Est. — (*Peziza*). — Petite pezize blanche,
urcéolée, dont les poils extérieurs disposés en
faisceaux séparés simulent une étoile — sur
les écailles de peuplier tombées à terre, dans
les bois humides. — A.C. — Printemps.
995. **URCEOL. FILICINA.** *Cooke.* — Alb. de
l'Est. — (*Peziza*). — Petites cupules brunes,
parsemées de papilles blanches, brillantes —
Croît sur tiges de *Pteris aquilina*. — RR. —
Sermaize.
996. **URCEOL. ARENULA.** *Alb. et Schw.* —
Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Commun en
Automne, hiver ; sur les tiges desséchées de
Spirea Ulmaria. — Le long du ruisseau de
St-Amand à St-Lumier.

997. **URCEOL. HYALINA.** *P. Quel.* p. 398.

— Se rapproche de la précédente. Elle est sphérique, transparente, blanche, tuberculeuse à côtes ciliées, très petite. — Sur le bois humide, notamment sur le peuplier, le noyer. — St-Amand et ailleurs. — Commun — Automne, Printemps.

998. **URCEOL. POPULICOLA.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — J'ai trouvé cette espèce sur un morceau de peuplier carié, déjà envahi par *Bulgaria pulla*; en automne 1885, à Lisse. Ses petites cupules urcéolées, sessiles rouge-incarnat, parsemées de poils blanchâtres sont d'un bel effet; elles reposent sur les fibres ligneuses humides, colorées en rose. — RR. — Nouv. Esp.

2^e GENRE. — **TAPESIA.** — *Fries.*

999. **TAPES. ROSÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est. (*Peziza*). — Commun sur les rameaux secs de *Rosa canina*. — Bois et bords des chemins. — Été-Automne. — Partout.

1000. **TAPES. PRUNICOLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Croît sur les branches mortes de *Prunus spinosa* tombées à terre et recouvertes de mousse. — AC. — Soulanges, St-Amand, etc.

1001. **TAPES. FUSCA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur les rameaux et sur les branches d'*Alnus glutinosa*, tombés sur le sol humide. — CCC. — Partout. — Automne, Printemps.

1002. **TAPES. ERRATICA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Commun sur les lattes et planches de chêne pourrisant dans les caves ou sur des troncs cariés. — AC. — St-Amand.

1003. **TAPES. STOBILINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Sur les cônes de *Pinus abies* tombés à terre. Subiculum brun. — AC. — Ablancourt, Aulnay-l'Aître. — Automne, hivers doux.

3^e GENRE. — **MOLLISIA.** — *Fries.*

1004. **MOLL. CINEREA.** *Batsch.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Espèce très commune sur le bois pourri des vieux troncs et charpentes séjournant à l'ombre dans les lieux humides. — Consistance trémelloïde. — Toute l'année. — Partout.

1005. **MOLL. ATRATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Sur tiges d'*Angelica sylvestris*, et de *Sambucus ebulus*. — AC. — Automne-Printemps. — St-Amand, Ablancourt, etc.

1006. **MOLL. POÆ. MICROPEZIZA POÆ.** *Ch. R.*
— Vavray. — Bois. — Sur chaumes de Poa. — AR. — Automne.

1007. **MOLL. IMBERBE.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Commun sur les troncs cariés, à demi enfouis dans le sol. — Bois de St-Amand. — Printemps, Automne.

4^e GENRE. — **PYRENOPEZIZA.** — *Fuckel.*

1008. **PYREN. GRAMINIS.** *Desm.* — Alb. de l'Est.
— (*Peziza*). — Cette espèce croît au printemps

sur les chaumes et sur les feuilles de *Carex sylvatica* et de *Poa*. — Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — AC.

1009. **PYREN. CHAILLETII.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Sur tiges d'*Angelica sylvestris* desséchées. — AC. Dans les bois, sur les bords du Fion de St-Amand à La Chaussée. — Automne, hiver.

1010. **PYREN. ERYNGII. an. LABIATA.** *Desm ?* — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Petites cupules noires, à marge décolorée, denticulée. — AC. Sur les feuilles d'*Eryngium campestre* desséchées. — St-Amand, Soulanges. — Printemps.

1011. **PYREN. JACEÆ et PYREN. GALII.** — Alb. de l'Est. — (*Peziza*). — Ces deux espèces dont la première croît sur les tiges de *Centaurea Jacea* et la seconde sur les tiges de *Galium Mollugo* me semblent être l'ancien *Peziza phacidioïdes* de Fries. — On les rencontre après l'hiver le long des termes et des chemins, à Soulanges, Bassu, etc. — AC.

5^e GENRE. — **PSEUDOPEZIZA.** — *Fuckel.*

1012. **PSEUDO - PEZ. TRIFOLII.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — (*Ascobolus*). — Croît à la face inférieure des feuilles de *Trifolium pratense*, sur de petites taches rondes, brunes. Le disque grisâtre est ponctué granulé comme celui des *Ascobolus*. — Fin de Juin ; dans les champs, sur le bord des chemins. — Partout. — CC.

1013. **PSEUDO - PEZ. MEDICAGINIS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — (*Phacidium*). — Cette espèce envahit la face supérieure des feuilles de *Medicago sativa*, en Été et en Automne, dans les prairies artificielles. — St-Amand. — CCC.
1014. **PSEUDO - PEZ. RANUNCULI.** *Kickx.* — Alb. de l'Est. — (*Phacidium*). — Croît à la face supérieure des feuilles de *Ranunculus repens* et *R. bulbosus*. — Prairies, bords des chemins. — St-Amand, La Chaussée, etc. — C. — Automne.
-

PATELLARIACÉS.

1^{er} GENRE. — **HETEROSPHERIA.** — *Grév.*

1015. **HETER. PATELLA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les tiges desséchées de *Daucus carota* et de *Linaria vulgaris*. — La forme conidiophore se présente en automne et ce n'est qu'après l'hiver qu'apparaît la forme ascophore. — Chemins herbus; le long des champs; autour des habitations.

2^e GENRE. — **LECANIDION.** — *Rabenh.*

1016. **LECAN. ATRUM.** *Rab.* — Alb. de l'Est. — (*Patellaria*). — Espèce commune sur les rameaux des rosiers et des ronces, sur le bois de chêne et de sapin. — Partout. — Toute l'année.

3^e GENRE. — **DERMATEA.** — *Fries.*

1017. **DERM. CERASI.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Cenangium*). — Envahit les branches et rameaux de cerisier, coupés et mis en tas à l'humidité. — C. — Automne-hiver. — Dans les bois. — Les cupules sont précédées ou accompagnées par leurs pycnides. (*Micropera*).
1018. **DERM. FURFURACEA.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — (*Cenangium*). — Récolté sur les branches d'*Alnus glutinosa* tombées à terre, dans le parc du château d'Aulnay-l'Aître. — AR. — Été.
1019. **DERM. VERNICOSUM ?** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — (*Cenangium*). — AR. sur les branches mortes du *Prunus spinosa*. Se rapproche de *Dermatea cerasi* par la forme générale de ses cupules en cônes renversés et entourées de spermogonies. — Elle s'en distingue néanmoins par son disque noir à marge rousse, striée ; par ses spermogonies noirâtres et non rosées, (*Micropera*) enfin par ses spermaties plus courtes et non septées. — Récolté à Ablancourt dans le mois de février.
1020. **DERM. FASCICULARIS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — (*Cenangium*). — Récolté sur rameaux et branche de *Salix caprea* une seule fois. — A Aulnay-l'Aître au lieudit *la Rouge-Terre*. — Automne.

4^e GENRE. — **PEZICULA.** — *Fuckel.*

1021. **PEZIC. CRATÆGI.** *Awd.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette rare espèce sur les branches mortes de *Cratægus oxyacantha*, encore adhérentes au tronc ; dans la plantation de pins réservée du château d'Ablancourt. — Printemps.

1022. **PEZIC. RESINÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce d'un beau jaune d'or croît sur la résine du *Pinus sylvestris*. — Fuckel et Nylander la considéraient comme l'état asco-phore du *Nectria Resinæ*, dont on ne connaissait que la spermogonie. La découverte que j'ai faite du *Nectria* muni de thèques, lève toute espèce de doute et permet de supprimer la parenté de ces deux espèces, si différentes l'une de l'autre ! — AC. — Automne-hiver. — St-Amand.

1023. **PEZIC. EUCRITA.** *Kasten.* — Alb. de l'Est. — Espèce commune en Automne sur les racines déterrées et sur les branches tombées de *Pinus sylvestris*. Sessile, obconique, immarginée, glabre jaune d'ocre. Thèques assez larges contenant de 4 à 6 spores elliptiques, allongées, un peu courbes, incolores, munies de plusieurs gouttelettes. — St-Amand, Soulanges, etc.

5^e GENRE. — **CENANGIUM.** — *Fuckel.*

1024. **CENANG. FERRUGINOSUM.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cupules brunes sortant de dessous

l'épiderme des branches et rameaux du *Pinus sylvestris*, en groupes de 2 à 6. — Soulanges, Bassu, etc. — AC. — Automne.

Var. Strobilini. — Plus petit que le type ; croît sur les écailles des cônes. — Mêmes localités.

1025. **CENANG. PRUNASTRI.** *Fuckel.* — Sur *Prunus Spinosa*. — Ablancourt. — AC. — Automne.

1026. **CENANG. VITICOLUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — (*Tympanis*). — J'ai rencontré une seule fois cette espèce rare sur de vieux sarments de vignes mis en tas et exposés toute l'année à l'humidité. — Près du village de Lisse, en Octobre 1882.

1027. **CENANG. SALIGNUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — (*Tympanis*). Cette espèce croît sur les branches mortes du *Salix caprea* ; elle est très rare, je l'ai récoltée dans une plantation de saules et de pins, sur les côtes de Bassu. Les cupules noir-verdâtre groupées étaient, les unes sphériques (spermogonies) les autres pézi-zoïdes (état parfait.) — Printemps.

1028. **CENANG. ERICÆ** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Je n'ai récolté que deux fois ce *Cenangium* sur les tiges mortes de *Calluna vulgaris* ; la première, dans les bois de Sermaize, en Automne, et la deuxième au mois d'Août, dans les *Ardenes*, à la dernière session de la Société botanique de France. — *Fuckel* ne cite que la Pycnide de l'espèce, j'ai été assez heureux pour trouver l'état ascophore. — RR.

1029. **CENANG. CONSPERSUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. (*Tympanis*). — Sur branches mortes de pommier et de peuplier. Jardins. — Automne. — AR. — Groupes composés de cupules ascophores et de pycnides pyriformes entourant la base des cupules. Théques grandes; spores rondes, très nombreuses; spermaties ovales portées par des basides arborescentes.

Var. Oxyacanthæ. — Sur les branches de l'aubépine. — St-Amand. — RR.

6^e GENRE. — **TROCHILA.** — *Fries.*

1030. **TROCH. CRATERIUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les feuilles de lierre dont elle envahit les parties mortes et décolorées d'une foule de petits points noirs, pézizoïdes. — CC. — Automne. — Partout.

PHACIDIACÉS.

1^{er} GENRE. — **RHYTISMA.** — *Fries.*

1031. **RHYT. ACERINUM.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les feuilles d'*Acer pseudo-platanus*. — CC. en Automne. — Partout. — Fructification complète au printemps. — RR. — Spore plus petite que celle de *Rhy. Salicinum*.
1032. **RHYT. PUNCTATUM.** *Rbh.* — Alb. de l'Est. — Ce *Rhytisma* me semble n'être qu'une variété de l'espèce précédente; cependant Fuckel

l'adopte comme une espèce bien distincte. Il croît sur le même support et à la même époque. — AC. — St-Amand.

1033. **RHYT. SALICINUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de saule Marceau, dans les bois en Automne. — Partout. — CC. — Ce n'est qu'au mois d'Avril suivant qu'apparaît l'état thécasporé sur les feuilles tombées à terre. Spores aculéiformes.

1034. **RHYT. MAXIMUM.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté plusieurs fois l'espèce désignée sous ce nom par Tul. Sur les branches des saules qui bordent la Marne à Soulanges. J'ai pu constater par l'examen microscopique, que les formes secondaires. *Discella carbonacea.* Br. et *Pilidium fuliginosum.* Sacc. envahissaient seuls les rameaux à l'exclusion du type ascophore. Suivant Fuckel ce type parfait serait le *Cryptospora salicella* inscrit dans notre catalogue dans l'ordre des *Nuclées*, (Pyrenomycètes). — Été, Automne. — AR.

1035. **RHYT. ONOBRYCHIDIS.** *DC* — Alb. de l'Est. — De même que pour l'espèce précédente, nous avons récolté très fréquemment sur les feuilles de sainfoin la spermogonie nommée par Saccardo *Placosphaeria Onobrychidis* — Je doute que l'état ascophore existe dans nos parages. — Fin de l'Eté. — Partout.

2^e GENRE. — **STEGIA.** — *Fries.*

1036. **STEG. ILICIS.** *Rbk.* — Alb. de l'Est. —

Sur les feuilles mortes d'*Ilex. aquifolium*.
— Bois de Sermaize à Cheminon. — AC.
— Automne. — Thèques souvent remplies de granulations, mais normalement octospores.

3^e GENRE. — **PHACIDIUM**. — *Fries*.

1037. **PHAC. CORONATUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de chêne desséchées. — Petits groupes au centre d'une tache blanche. Forme arrondie. — CC. — Dans les forêts — Automne, hiver.
1038. **PHAC. DENTATUM**. *Schmit*. — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de chêne, au centre d'une tache blanche ; forme anguleuse. — CC. Automne, hiver.
1039. **PHAC. PINI**. *Fries*. — AC. — Sur *Pinus Sylvestris*.
1040. **PHAC. REPANDUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. *Phac. Vernale* de Fuckel. — Commun sur les tiges des grandes herbes, notamment sur les *Rubiacées* : *Galium mollugo*, *Sherardia arvensis*, etc. — Automne. Été. — Moissons, bords des chemins. — CC. — Fuckel a divisé cette espèce en *Ph. vernale* et *Ph. autumnale*.
1041. **PHAC.? VIRIDE**. *Ch R*. — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette nouvelle espèce sur un rameau de peuplier dénudé — Je l'ai placée parmi les *Phacidiacés* en raison de la déhiscence de sa cupule en plusieurs segments et à cause de son disque pézizoïde — Elle croît incrustée dans l'écorce. — Les cupules d'abord

fermées, extérieurement brun-clair et granuleuses, se déchirent en 4 ou 5 segments et laissent voir un disque vert-foncé. — Les cupules ont à peine 1 à 2 mill. de largeur. Les thèques renflées en massue contiennent huit spores aculéiformes (0,04), remplies de gouttelettes. Paraphyses simples, incolores, un peu plus longues, recouvertes au sommet par un *epithecium* brunâtre analogue à ceux des *Lichen*. — RR. — St-Amand. — Printemps.

4^e GENRE. — **PROPOLIS**. — *Fries*.

1042. **PROP. VERSICOLOR**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Croît communément sur les branches mortes de saule, de prunier, de hêtre etc. — Toute l'année — *Hymenium* blanchâtre, puis gris de fer, ponctué. — Bois, Jardins. — Partout.

1043. **Var. Strobilina**. — Cette variété un peu plus rare et plus petite, croît sur les cônes de *Pinus abies* et *Pinus sylvestris*.

STRICTÉS.

1^{er} GENRE. — **HABROSTICTIS**. — *Fuckel*.

1044. **HABR. CHRYSOPHÆA**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur les branches et sur les rameaux des jeunes peupliers, encore adhérents au tronc. — St-Amand, Lisse, Bassu. — Automne — AC. — Disque d'un rouge-cuivre entouré par l'épiderme.

1045. **HABR. RUBRA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est.
— Ressemble à la précédente espèce, mais elle est plus petite, le disque moins foncé. — sa station a lieu sur les branches d'Orme tombées à terre. — AC. — au printemps. — St-Amand, Soulanges, etc.

2^e GENRE. — **STICTIS.** — *Pers.*

1046. **STICT. RADIATA.** *Nées.* — Alb. de l'Est.
— Très commun sur les tiges herbacées et sur les brindilles de bois tombées à terre, dans les bois. — St-Amand, Vanault-les-Dames, etc. — Toute l'année.

3^e GENRE. — **SCHIZOZYLUM.** — *Pers.*

1047. **SCHIZ. ÆRUGINOSUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes de *Rubus cæsius* à l'automne et au printemps. — Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — AC. — Cette petite espèce a la forme d'un *Ophiobolus*.
1048. **SCHIZ. PUPULA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. Sur les rameaux de *Cornus Sanguinea*, de *Prunus Spinosa* etc. — Dans les bois taillis à St-Amand, Soulanges, etc. — Spermogonie, *Melanostroma*, Corda.
1049. **SCHIZ. GRAMINUM.** *Karst.* — Alb. de l'Est. — Récolté plusieurs fois sur les feuilles mortes de *Festuca Sylvatica*, au Printemps. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Cette espèce ressemble extérieurement à *Oomyces carneo-albus* de Cooke.

4^e GENRE. — **XYLOGRAPHA.** — *Fries.*

1050. **XYLOG. ? PARALLELA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges desséchées de *Solidago virga aurea*, et sur *Genista tinctoria*. — En automne, à Aulnay-l'Aître au lieu dit *la Rouge-terre*, et dans les bois de Charmont. — Le disque est rouge-incarnat, entouré par un limbre noirâtre qui se ferme par le sec. — AR.
-

2^e FAM. — **TUBÉRACÉES.** — *Tul.*

Cupules (Plissées-chiffonnées) intérieures.

1^{er} GENRE. — **ELAPHOMYCES.** — *Tul.*

1051. **ELAPH. GRANULATUS.** *Fries.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 249 pl. LXXI. — Récolté au pied des chênes ou croît ordinairement la truffe à Verzy, près de Reims. — Été. — AR.
1052. **ELAPH. MACULATUS.** *Lév.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 248, pl. LXXI. — Récolté dans les mêmes terrains que le précédent et à la même époque. Une exploration sérieuse pourrait y faire découvrir les espèces voisines. *Elaph aculeatus*, *Leverillei*, etc. que j'ai trouvées près de Montmorency dans des conditions semblables.

2^e GENRE. — **TUBER.** — *Mich.*

1053. **TUB. MESENERICUM.** *Vitt.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 246, pl. LXXII. — Cette espèce croît dans les bois de la Montagne de Reims. — Elle m'a été communiquée par le Dr Maillart. — Sa surface est verruqueuse. brune ; elle possède un parfum assez prononcé. Les spores sont brunes, entourées d'une aréole. — RR. — Février, mars. — Verzy.

1054. **TUB. ABUM.** *Bull.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 246, pl. LXXII. — Cette espèce a été récoltée en Eté sous des peupliers qui servaient de limite à un pré, dans les environs de Vitry-le-François. — AR. — La surface est lisse et d'une couleur blanc-jaunâtre. Les spores sont jaunâtres, entourées d'une aréole, sans odeur spéciale.

1055. **TUB. UNCINATUM.** *Chatin.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze, p. 246, pl. LXXII.

3^e GENRE. **OOGASTER.** — *Corda.*

1056. **OOG. CIBARIUM.** *Cord.* — Atl. Champ. Ch. R. et Roze. p. 243. pl. LXXII. — Cette espèce ainsi que l'*Oog. brumalis* (distinctes l'une de l'autre par des caractères peu appréciables) m'a été envoyée par le Dr Maillart médecin à Verzy. — Elle a un parfum qui rappelle les truffes récoltées dans le Périgord. Aussi la

récolte, souvent abondante, était-elle entreprise, il y a quelques années, par des commerçants des environs de Périgueux pour en tirer parti. — Les spores sont noires et couvertes d'aiguillons. — Signalée seulement (dans le Département) sous les chênes de la Montagne de Reims, entre Ay et Verzenay.

9^e ORDRE. — **NUCLÉÉS.** — *Quélet.* —
(Pyrénomycètes). — *Fries.*

1^{re} FAM. — **Périssporiacées.** — *Fries.*
Périthèces membraneux, coriaces ou charbonneux.
sans ouverture.

SUB-FAMIL. 1. — **Erysipheæ.** — *Lév.*

1^{er} GENRE. — **PODOSPHÆRA.** — *Kunze.*

1057. **PODOSPH. TRIDACTYLA.** *Wallr.* — Alb.
de l'Est. — Croît sur les feuilles de *Prunus*
spinosa. Les périthèces ne contiennent qu'une
thèque octospore ; les filaments mycéliens
sont allongés, terminés par des découpures
dichotômes élégantes. — CC. — Automne.

2^e GENRE. — **SPHÆROTHECA.** — *Lév.*

1058. **SPHÆR. CASTAGNEI.** *Var. humuli.*
Kickx. Sacc. — Alb. de l'Est. — Cette espèce
croît à la face supérieure des feuilles de hou-
blon. Les périthèces brunâtres, enfoncés dans
le mycelium, ont des appendices flexueux qui
se confondent avec ceux du mycelium ; ils ren-
ferment une seule theque octospore. AC. —
Juillet. — St-Amand.

3^e GENRE. — **PHYLLACTINIA**. — Lév.

1059. **PHYLL. SUFFULTA**. Sacc. — (*Ph. guttata*. Wallr.) — Alb. de l'Est. — Espèce très commune à la face inférieure des feuilles du *Corylus avellana*. — Les périthèces garnis de poils raides, renflés-bulbeux à la base, renferment plusieurs théques 2-4 sporidies. — Automne.

4^e GENRE. — **UNCINULA**. — Lév.

1060. **UNCIN. ADUNCA**. Lév. — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît à la face supérieure des feuilles de *Salix caprea*. — Les filaments blancs dressés en colerette autour des périthèces leur donne l'aspect de petites marguerites en miniature. — CCC. — Automne.
1061. **UNCIN. ACERIS**. Sacc. — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît abondamment à la face supérieure des feuilles d'*Acer campestre* — Les Périthèces un peu déprimés sont garnis d'appendices bifides-uncinulés au sommet. — Été. Automne.

5^e GENRE. — **MICROSPILÆRA**. — Lév.

1062. **MICROSPH. GROSSULARIÆ**. Lév. — Alb. de l'Est. — Cette espèce envahit les feuilles de *Ribes grossularia*. — Elle croît de préférence à la face supérieure dont l'aspect est poudreux ; c'est le résultat des débris de

l'Oidium erysiphoides qui a précédé l'apparition des périthèces. — CC. en Automne ou à la fin de l'été — dans les haies — St-Amand.

1063. **MICROSPH. PENICILLATA.** Lév. — Alb. de l'Est. — Commun sur les feuilles d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces munis de 8 à 12 appendices terminés par des divisions plusieurs fois dichotômes. — Fin de l'Eté, automne.

6^e GENRE. — **ERYSIPIHÉ.** — Lév.

1064. **ERYS. LAMPROCARPA.** Lév. — Alb. de l'Est. — Croît sur les feuilles de *Plantago* et de *Galeopsis ladanum*. ordinairement sur les deux faces. — Périthèces à filaments courts, inégaux, bruns ; thèques de 10 à 20 munies de 2 sporidies. — AC. en Automne. — St-Amand.
1065. **ERYS. TORTILIS.** Lév. — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Cornus sanguinea*. — Mycelium fugace ; appendices très longs, fasciculés. thèques 3-4 renfermant 4 sporidies. — CC. — Automne.
1066. **ERYS. HORRIDULA.** Lév. — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Symphytum* et sur *Borrago*. Périthèces à appendices courts, flexueux, contenant 10 à 20 Thèques à 2-4 sporidies. — AC. — Prés, bois, bords de la Marne.
1067. **ERYS. UMBELLIFERARUM.** De Bary. — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît communément sur les feuilles et tiges d'*Heracleum spondylium* et sur *Angelica sylvestris*, à la fin de

l'Eté. — Elle occupe la face supérieure qui prend une teinte grisâtre, ponctuée, appendices peu nombreux confondus avec le mycelium ; plusieurs thèques contenant de 2 à 4 sporidies. — Automne. — Prés, bois.

1068. **ERYS. COMMUNIS.** *Fries.* — Var. *Nitida Wallr.* — Alb. de l'Est. — Cette variété de l'Erys. Communis envahit les feuilles et les tiges d'*Aconit napel*. — Les périthèces sont plus superficiels et d'un noir plus luisant que dans le type, ils contiennent de 2 à 5 thèques munies de 4 à 8 sporidies. — AR. — Jardins. — St-Amand, St-Lumier.

1069. **ERYS. MARTII.** *Lév.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce, commune sur les *crucifères* et sur les *ombellifères*, ne diffère pas, selon de Bary, de l'espèce précédente. — St-Amand, Soulanges, etc.

1070. **ERYS. ULMARIÆ.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Espèce commune à la fin de l'Eté sur les feuilles de la Spirée Ulmaire. — Ses périthèces sont très petits, luisants ; ils contiennent de 6 à 8 thèques octospores. — Bords du Fion à St-Amand et ailleurs.

1071. **ERYS. GRAMINIS ?** *D. C.* — Recueil 10. p. 31. — L'Erysiphe graminis, marqué ici d'un point de doute, envahit les feuilles et les tiges de *Poa nemoralis* et de *Festuca sylvatica*. — Les périthèces sont ornés de 6 ou 8 appendices simples et renflés à la base. Il constitue probablement une variété de *Phyllactinia suffulta*

non signalée par les auteurs et différente de
l'Erysiphe graminis de Saccardo.

1072. **ERYS. TUCKERI.** Berk. *Kickx.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce si redoutée des viticulteurs ne se présente dans nos contrées que sous la forme conidienne, *Oidium Tuckeri*, et sous la forme spermogonienne, *Cicinnobolus Cesati* ; ces états præformatifs sont indiqués dans notre catalogue, le 1^{er} parmi les Hyphomycètes, le 2^e parmi les Sphéropsidées.
-

SUB-FAMIL. 2. — **Perisporiæ.** — Sacc.

1^{er} GENRE. — **EUROTIIUM.** — Link.

1073. **EUROT. HERBARIORUM.** Link. — Alb. de l'Est. — Très commun sur les plantes mal séchées des herbiers et sur les fruits. — Ses périthèces sphéroïdes, jaune-soufre, renferment des thèques sphériques, octospores ; l'état conidien est l'*Aspergillus glaucus*.
1074. **EUROT. CORIORUM.** Wallr. — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette espèce sur les harnais de cuir, graissés et séjournant depuis longtemps dans une écurie. — Sa couleur est d'un beau rouge-carminé ; son appareil conidien est le *Torula Corii*, (Ch. R.) habitant le même support.
1075. **EUROT. EPIXYLON.** Kunze. — Alb. de l'Est. — Commun sur les claies d'osier anciennes, humides placées dans les caves.

2^e GENRE. — **ZASMIDIUM**. — *Fries. Ch. R.*

1076. **ZASM. CELLARE**. *Kickx. Ch. R.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté plusieurs fois cette espèce sur les lattes de chêne qui supportent les bouteilles mises en tas dans les caves ; les filaments mycéliens sont le *Racodium cellare* et son appareil thécasporé est un véritable *Eurotium* pour la fructification. Les Périthèces sont petits, sphériques, astomes, noirs, hérissés de filaments en massue, cloisonnés, jaunes. Les thèques sont rondes, octospores ; sporidies ovales hyalines puis brunes. — St-Amand. — Eté, automne.

3^e GENRE. — **CEPHALOTHECA**. — *Fuckel.*

1077. **CEPH. SULFUREA**. *Sacc. Fuckel.* — Alb. de l'Est. — On rencontre cette espèce sur les chaumes de blé humides et pourrissants au milieu des gerbes mises en tas ; elle tire son nom de la forme exceptionnelle de son hyménium composé de filaments rameux, courts, terminés par des thèques rondes, renfermant 8 sporidies, rondes-ovales, brunes ; les périthèces qui les contiennent sont glabres, jaunâtres, munis seulement à la base de longs filaments rampants ; ils succèdent à la forme conidienne beaucoup plus commune l'*Actinospira chartareum* de Corda. — St-Amand, St-Lumier. —

Automne, printemps. — Dans les meules de paille exposées à l'injure du temps.

1078. **CEPH. HISPIDA.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est.
— Cette pérисporiacée que nous plaçons dans le Genre *Cephalotheca*, à cause de ses périthèces astômes, hispides et de ses thèques rondes, a été trouvée sur écaille de vieux pommier mort, encore debout, dans un jardin de St-Amand. — Les thèques ne contiennent que 4 sporidies ovales, hyalines et non colorées.

4^e GENRE. — **ASCOTRICHIA.** — *Berk.*

1079. **ASC. CHARTARUM.** *Berk.* — Alb. de l'Est.
— Assez commun sur le papier de tenture et sur les fragments de journaux délaissés dans les lieux sombres et humides. Les périthèces sphériques sont hérissées de poils rigides, noirs, ils reposent sur les filaments dichotômes et conidifères de *Myxotrichum chartarum*. Thèques cylindriques. — Sporidies brunes 6-8. — St-Amand. — Automne.

5^e GENRE. — **ASTERINA.**

1080. **ASTER. SCABIOSÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette espèce sur tige desséchée de *Scabiosa Columbaria*, à St-Amand, en Automne. — Elle appartient à la section *Asteridium* de Saccardo, à sporidies pluriseptées et à thèques ovoïdes; elle est très voisine d'*Asterina Eugeniae* de Montagne, et est munie, comme cette dernière d'un ostiole central.

6^e GENRE. — **ANIXIA.** — *Fries.*

1081. **ANIX. WALLROTHII.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette espèce sur les excréments de chien, le 7 mars 1880. — Ses périthèces sont d'un noir mat, sphériques, de la grosseur d'un grain de navette ; les thèques sont cylindriques à 8 sporidies rondes, incolores, lisses, monostiques, occupant le sommet de la thèque. Sa forme conidienne me paraît être le *Mycogala parietinum* de Saccardo. — RR. — St-Amand.

7^e GENRE. — **RICHONIA.** — *Boud.*

1082. **RICH. VARIOSPORA.** *Boud.* — Rev. Myc. 1885. — Rec. 10, p. 42. — Cette espèce m'a été dédiée par mon savant ami Boudier de Montmorency ; elle croît sur les racines de l'asperge. — Les périthèces sont sphériques, astômes, noirs, superficiels ; les thèques larges, entourées de paraphyses rameuses, contiennent une à 3 sporidies elliptiques, comprimées au milieu, incolores, munies de 2 grosses spores ; ces spores, en vieillissant, grossissent considérablement, deviennent uni-cloisonnées, d'un brun-noir opaque et sont hérissées de filaments tortueux remarquables, identiques pour la forme et la structure aux paraphyses. — On peut voir par le dessin de notre Album, les thèques jeunes avec leurs sporidies incolores de dimension

normale, puis une sporidie brune, enveloppée de fragments de paraphyses et quadruplée de volume après sa sortie de la thèque. — RR. — 12 Mai 1885.

8^e GENRE. — **PERISPORIUM.** — *Fries.*

1083. **PERISP. FIMETI.** *Sacc.* — **PREUSSIA.**

FIMETI. *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les crottes de lapin; elle est précédée par des taches blanches de *Torula nivea*, sa forme conidienne. — AC. au printemps. — St-Amand.

1084. **PERISP. SECALE.** *Ch. R. Sacc.* — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette espèce plusieurs années de suite sur les chaumes du seigle, à St-Amand. — La description en a été publiée dans le Bulletin de la Société de Vitry-le-François et par Saccardo; elle se rapproche de l'espèce précédente par ses caractères généraux, et s'en distingue par sa station et par les filaments blancs et rayonnants situés à la base des périthèces. — RR.

1085. **PERISP. MATRICARIÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les tiges pourrissantes de la Matricaire des jardins mélangées aux détritiques mis en tas. — Elle paraît au printemps; à son aspect extérieur, on la prendrait pour *Mycogala parietinum*; elle en diffère par ses sporidies lisses et non tuberculeuses, obovales et non sphériques, brun-clair et non jaune-soufre. L'absence des théques classe cet

état præformatif parmi les *Species dubiæ Perisporiacearum* de Saccardo près de *Perisp. Tragopogi*.

9^e GENRE. — **DIMEROSPORIUM**. — Sacc.

1086. **DIMER. PULCHRUM**. Sacc. — Alb. de l'Est.
— Jusqu'à présent, je n'ai trouvé sur les feuilles languissantes de *Cornus sanguinea*, que l'état conidien *Coniothecium Questieri*. Sacc.

10^e GENRE. — **ZOPHIA**. — Rabh. Sacc. Alb. de l'Est.

1087. **ZOPF. RHIZOPHILA**. Rabh. Ch. R. — Rec. 11. p. 41. — Cette Périsporiacée croît ainsi que le *Richonia Variospora*, sur les racines d'asperges. — Elle a le même aspect extérieur, mais elle en diffère par la forme des sporidies et des théques. Les théques sont larges, ovales ou obovales, elles contiennent de 4 à 8 sporidies apiculées ; celles de *Richonia* sont allongées, claviformes et ne renferment que deux ou 3 spores sans apicules. — RR. — Jardins.

11^e GENRE. — **CAPNODIUM**. — Mont.

1088. **CAPN. SALICINUM**. Mont. — Alb. de l'Est.
— Les feuilles et les rameaux de saule envahis par cette espèce semblent noircis par la fumée ; la forme conidienne composée de filaments toruleux, bruns, donne naissance aux périthèces thécasporés, pyriformes, en massue, renflés et percés au sommet par un ostiole. Les théques

obovales renferment 6 à 8 sporidies brunes, elliptiques, muriformes. — AR. — Récolté entre St-Amand et Lisse.

1089. **CAPN. TILIÆ. CAPN. CITRI. CAPN. FUMAGO.** (*Vitis*). — Ces Pérисporiacées sont fréquentes, à l'état conidien seulement, sur les feuilles de Tilleul, d'Oranger et de la Vigne, sous le nom de *Cladosporium fumago*.
-

2^e FAM. — **Sphériacées.** — *Fries.*

Périthèces charbonneux, membraneux ou coriaces, sans ouverture.

SECT. I. — **ALLANTOSPORÉES.**

1^{er} GENRE. — **ENCHNOA.** — *Fries.*

1090. **ENCHN. FRIESII.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sous l'épiderme des tiges ou troncs de *Sambucus nigra*, entre les fentes de l'écorce et sur le bois dénudé. — Les périthèces sont réunis comme ceux des *Valsa* ou épars, munis de longs cols glabres et noirs, plongés à la base dans un substratum tomenteux, brun, envahissant parfois les sphéries; les théques sont en massue allongée et les sporidies botuliformes avec 4 gouttelettes. — AC. — Automne, hiver. — St-Amand.

1091. **ENCHN. CLEMATIDIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sous l'écorce des vieilles tiges mortes de *Clematis vitalba*. — Elle ressemble beaucoup à *Ench. Friesii*, parasite sur *Sambucus*, par la disposition de ses périthèces agglomérées en cercle et par ses longs cols flexueux ; elle s'en distingue cependant par deux caractères importants ; l'existence de longues paraphyses et la cloison médiane des sporidies. Je l'ai trouvée, de même que l'*Ench. Friesii*, accompagnée d'un *Cephalotrichum* (*Stysanus*) qui semble en être l'état conidien. — CC. — St-Amand. — Bois, haies des jardins. — Automne-hiver.

GENRE. — **CÆLOSPHERIA** — *Sacc.*

1092. **CÆLOSPH. CUPULARIS.** *Karsten et Sacc.*

2^e GENRE. — **CALOSPHERIA.** — *Tul.*

1093. **CAL. PRINCEPS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cette belle sphériacée croît sur les troncs et sur les grosses branches de Cerisier coupés et exposés à l'air depuis longtemps. — Ses périthèces placés sous l'écorce sont sphériques. disposés en cercles et leurs longs cols tortueux se joignent en un disque à la surface de l'épiderme ; les pycnides sont mêlées aux périthèces, mais en petit nombre. — CC. en automne et au printemps. — Jardins.
1094. **CAL. MINIMA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce, moins développée que la précé-

dente croît aussi sur le *Cerasus*, elle ressemble un peu au *Cal. Vibratilis*; ses thèques sont extrêmement petites et pourraient être prises pour des sporidies, elles sont portées par des pédicules arborescents compacts et nombreux. — AR. — Avril-mai 1883. — St-Amand.

1095. **CAL. VIBRATILIS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les branches de *Prunus spinosa*; elle possède des périthèces disposés en rosette, moins nombreux que ceux de *Cal. princeps*, renfermant des thèques plus développées et remarquables par la disposition de leurs pédicules en faisceaux arborescents. — AC. — Février 1882. — St-Amand.

3^e GENRE. — **CORONOPHORA.** — *Fuckel.*

1096. **CORON. GREGARIA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette espèce sur le bouleau en compagnie du *Melanconis lanciformis*; les périthèces groupés par 3-5 sont affaissés, ils contiennent des thèques ovales, amples, terminées brusquement par un prolongement filiforme; les sporidies en nombre indéterminé sont courbes. — AC. — Printemps. — St-Amand, 1879.

1097. **CORON. ANNEXA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Croît en automne sous l'épiderme des rameaux d'*Alnus glutinosa*. — Les périthèces au nombre de 5-8 sont munis, à la base, de fibrilles brunes; les thèques plus resserrées que dans

l'espèce précédente renferment des sporidies plus grosses. — AR. — St-Amand. — Décembre 1884.

4^e GENRE. — **QUATERNARIA.** — *Tul.*

1098. **QUAT. PERSOONII.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Croît sur l'écorce des branches et des troncs du hêtre. — Les périthèces groupés régulièrement par 5-8 sous l'épiderme en forme de rosettes, contiennent des thèques très longuement pédicellées et des sporidies un peu courtes, faiblement teintées. — Récoltée aussi sur le noyer, en février 1882. — AC. — St-Amand. — La spermogonie *Libertella Faginea* est plus commune.

5^e GENRE. — **VALSA.** — *Fries.*

1099. **VALS. CERATOPHORA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les petits rameaux morts de *Rosa canina*. — Elle forme des tubercules saillants, noirâtres, recouverts par l'épiderme et surmontés de 5 à 10 cols, divergents, du sommet desquels s'échappent de longs filaments sporigères. — AR. — Bois, haies. — St-Amand.
1100. **VALS. RUBI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Ce Valsa croît sur les tiges des *Rubus*; il se rapproche du *V. Ceratophora*, *Var. Rosarum*; ses périthèces sont plus petits et munis de cols plus courts avec un ostiole béant, très visible. — Je n'ai pas observé de paraphyses. — 28 décembre 1885. — St-Amand. — AR.

1101. **VALS. PINI.** *Alb.* et *Schw.* — *Alb.* de l'Est. — Cette espèce est commune en hiver sur l'écorce des troncs de *Pinus sylvestris* abattus. — Elle forme des petits tubercules arrondis, noirs au centre et entourés par une matière pulvérulente, jaune, mêlée aux ostioles réunis en disque. Thèques sans paraphyses. — Sapinières. — Partout.
1102. **VALS. VITIS.** *Fuckel.* — *Alb.* de l'Est. — Cette espèce croît sur les vieux sarments de vigne en compagnie de sa spermogonie, le *Cytispora vitis*. — Ses tubercules contiennent 10 à 15 périthèces qui émergent de l'écorce en lignes longitudinales. — AC. — St-Amand, etc. — Hiver, printemps.
1103. **VALS. JUNIPERINA.** *Sacc.* — *Alb.* de l'Est. — Croît en hiver sur les rameaux morts tombés à terre du *Juniperus communis*, sous forme de petits tubercules blancs, farineux, enfoncés dans l'écorce. — Cette espèce est plus petite dans toutes ses dimensions que le *Vals. pini*. — AC. — St-Amand. — Printemps.
1104. **VALS. GLANDULOSA.** *Cooke.* — *Alb.* de l'Est. — Ce Valsa envahit les rameaux secs de l'*Ailanthus glandulosa*; ses pustules coniques, à disque aplati au sommet, naissent sur un strôme noir, étalé sous l'épiderme; ils contiennent de 15 à 20 périthèces; les thèques sont petites, renflées en massue. — AC. — Dans les jardins à Soulanges, St-Amand. — Février 1884.

1105. **VALS. SYNGENESIA.** *Sacc.* — Sur *Sambucus nigra*. — CC.
1106. **VALS. AMBIENS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Fréquent sur les branches et rameaux recouverts d'écorce de l'orme, du pommier, du prunier, etc. — Les pustules de cette espèce, aplaties au sommet, sont traversées par les ostioles des périthèces qui apparaissent au dehors, disposés en cercle ou couronne. — Les thèques sont très fugaces. — CCC. — Hiver et printemps. — Partout.
1107. **VALS. SALICINA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce vient communément sur les branches sèches de *Salix alba* ; elle a l'aspect du *Valsa nivea* dont elle diffère, par l'absence du conceptacle, par le nombre moindre des périthèces ; ses thèques sont fugaces et contiennent 8 sporidies moyennes ou 4 grandes spores. — CC. — Hiver, printemps.
1108. **VALS. NIVEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur l'écorce des rameaux de peupliers morts et mis en fagots. — Remarquable par le disque rond, blanc-farineux des pustules pointillé de noir, par les ostioles des périthèces. — CCC. — Hiver. — Partout. — Spermogonie. *Cytispora nivea*.
1109. **VALS. LEUCOSTOMA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Fréquent sur les rameaux des cerisiers, pruniers, et sur l'épine blanche. — Disque elliptique, blanc-farineux ; pustules contenant de 5 à 10 périthèces. — Spermogonie. *Cytispora leucostoma*. -- CCC. — Partout.

6^e GENRE. — **EUTYPELLA**. — *Nits.*

1110. **EUTYP. PRUNASTRI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Espèce commune au printemps sur les rameaux morts du *Prunus spinosa*. — Tubercules munis d'un conceptacle, renfermant de 15 à 20 périthèces dont les ostioles épais, 3-5 angulaires réunis à la base et divergents au sommet paraissent au dehors après avoir rompu l'épiderme du rameau transversalement. — CCC. — Jardins, haies. — Spermogonie. *Cytispora rubescens*.
1111. **EUTYP. STELLUTATA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce est commune sur les rameaux secs de l'Orme. — Elle rompt l'épiderme en étoile et laisse apparaître une dizaine d'ostioles 4 angulaires, sortant d'un conceptacle noir, arrondi, logé dans l'écorce. — Hiver, printemps.
1112. **EUTYP. BRUNAUDIANA**. *Sac.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté cette espèce plus rare que les deux précédentes sur les rameaux morts et secs de *Ribes rubrum*, dans mon jardin. — Automne 1886. — Les ostioles sont cylindriques.

7^e GENRE. — **EUTYPA**. — *Tul.*

1113. **EUT. ASPERA**. *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Les tiges mortes de *Lonicera* envahies par l'*Eutypa aspera* sont recouvertes d'un strôme mince, cendré-rougeâtre, parsemé çà et là de

petites aspérités dues à la sortie des ostioles arrondis des périthèces incrustés dans le bois.
— AC. dans les jardins en hiver et au printemps. — St-Amand.

1114. **EUT. SPINOSA.** *Tul.* -- Alb. de l'Est. — Cette espèce est remarquable par ses ostioles coniques, tétragones et sa large cruste noire étalée sur les branches dénudées de peuplier; elle est très commune en hiver. — St-Amand.
1115. **EUT. FLAVOVIRESCENS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Fréquent sur les rameaux secs de *Rosa canina* et de *Prunus spinosa*. — Le strôme aplati, noir, de forme irrégulièrement arrondie est d'une belle couleur jaune-verdissant à l'intérieur. — Printemps, hiver. — St-Amand 1882.
1116. **EUT. LIGUSTRI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette nouvelle espèce croît sur les vieux rameaux de *Ligustrum vulgare*. — L'épiderme qui la recouvre est percé par les ostioles noirs, arrondis et sans changement de couleur, quand on le soulève on voit l'écorce convertie en une croûte noire et çà et là des strômes en disques irréguliers, de substance noirâtre, contenant les périthèces à nucleus blanc. Les thèques sont longuement pédicellées et atténuées en fuseau au sommet. — Cet *Eutypa* se rapproche du *Flavo virescens*, à part le strôme vert-jaunâtre. — AR. — St-Amand. — Mars. Haies, jardins.
1117. **EUT. HETERACANTHA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Croît fréquemment sur les jeunes

branches et sur les rameaux de *Sambucus nigra* morts depuis longtemps ; le rameau envahi est entouré d'un strôme noir, parsemé de pustules valsiformes qui contiennent 6 ou 8 périthèces dont la base est plongée dans la substance du bois. — Jardins. — St-Amand, Soulanges. — Mars.

1118. **EUT. LATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Commun sur le bois et les branches dénudés de Noyer, d'*Acer pseudo-platanus*, etc. — Strôme mince, noirâtre, très étendu, superficiel ; sphérules incrustées dans le bois ; sporidies petites ; thèques accompagnées de rares paraphyses à peine visibles. — CC. — St-Amand. Hiver, printemps.

8^e GENRE. — **CRYPTOSPHERIA.** — *Grev.*

1119. **CRYPT. POPULINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de peuplier noir et sur tremble. — Strôme étendu, irrégulier sous l'épiderme un peu soulevé et d'une teinte grise causée par les ostioles rugueux qui sont disséminés à la surface. — CC. dans tous les bois. — Hiver.

1120. **CRYPT. MILLEPUNCTATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes et troncs de *Fraxinus excelsior* ; *Sphaeria eunomia* de Fries. — Se rapproche du précédent ; strôme moins étendu et ne colorant pas ou très peu l'épiderme ; ostioles punctiformes. — AC. dans les bois. — Hiver, printemps. — St-Amand, St-Lumier, etc.

9^e GENRE. — **CRYPTOVALSA.** — *Ces.*

1121. **CRYPT. PRUNI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux secs de *Prunus spinosa*. — Plaques disciformes sous l'épiderme, plus ou moins larges, traversées çà et là par les ostioles noirs, obtus, anguleux ; périthèces logés dans la couche corticale ; thèques polyspores. — CCC. — Jardins, vergers. — St-Amand. — hiver, printemps.
1122. **CRYPT. EFFUSA.** — *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments de *Rubus fruticosus* et sur *Rosa canina*. — Thèques polyspores ; disposition des Périthèces comme dans *Cryp. millepunctata*. — CC. — Hiver, printemps. — St-Amand. — Bords des routes et talus boisés.
1123. **CRYPT. PROTRACTA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois dénudé d'*Acer pseudo-platanus*. — Strômes allongés, étroits, rugueux par la présence des ostioles coniques ; périthèces incrustés dans le bois. Thèques polyspores. — AC. — Hiver, printemps. — St-Amand, etc.

10^e GENRE. — **DIATRYPE.** — *Fries.*

1124. **DIATR. BULLATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux secs de *Salix caprea* et *Populus alba*. — CCC. — Partout ; dans les haies de clôture et bois des villages. — Hiver, printemps. — Strômes en disques entourés par l'épiderme.

1125. **DIATR. STIGMA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches sèches du hêtre, du charme, de *Crataegus*, etc. — Grandes plaques entourant les rameaux, parsemés de petits points saillants et tétragones, formés par les ostioles des périthèces sous-jacents. — CCC. — Partout. — Toute l'année.

1126. **DIATR. ACERICOLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'Erable sèches. — J'ai rencontré cette espèce une seule fois à St-Amand. — Elle n'a été signalée par Saccardo qu'en Italie. — Elle ressemble à *Diatrypella quercina* par ses pustules et ses disques rugueux ; mais sa station sur Acer et le nombre de ses sporidies limité à 8, le placent dans le Genre *Diatrype*. — RR. — Printemps. — St-Amand.

11^e GENRE. — **DIATRYPELLA.** — *Cés.*

1127. **DIATR^{plla}. VERRUCIFORMIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les branches mortes d'*Alnus glutinosa*. — Strôme verruqueux entouré par l'épiderme fendu en étoile ; thèques polyspores. — Ressemble beaucoup à *Diatrype quercina*. — Bois, bords des eaux. — St-Amand, etc. — CC. — Printemps.

1128. **DIATR^{plla}. FAVACEA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux et troncs de Bouleau servant de barrières et clôtures des jardins, à St-Amand. — AC. — Hiver, printemps. — Strômes elliptiques sortant de dessous l'épiderme fendu transversalement.

1129. **DIATR^{plla}. NIGRO ANNULATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les branches de Bouleau. — Elle se distingue du *Diatr. verruciformis* par ses pustules sphéroïdes et par la ligne noire qui circonscrit les pustules à la base. — Hiver, printemps. — St-Amand. — AR.
1130. **DIATR^{plla}. MINUTA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les branches mortes du châtaignier déjà envahies par *Clypeosphaeria castanea*. — Pustules saillantes, rondes, aplaties au sommet, entourées à la base par une ligne noire, renfermant 10 à 12 périthèces. — RR. — Bois de la Montagne de Reims. — Printemps.
1131. **DIATR^{plla}. QUERCINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Espèce très commune sur les branches et les rameaux morts du chêne. — Pustules éparses, orbiculaires, rugueuses, noires, entourées par l'épiderme lacinié. — Dans tous les bois et forêts. — Automne, Printemps.
1132. **DIATR^{plla}. RIBIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les branches mortes de *Ribes nigrum*. — Les pustules elliptiques sortent par une fente transversale de l'épiderme. — On pourrait la confondre avec *Diatrype strumella* sans ses thèques polyspores, allongées. — AR. — Jardins de St-Amand. — Hiver, Printemps.
-

SECT. II. — PHÆOSPORÉES.

12^e GENRE. — **CERATOSTOMA**. — *Ces.*

1133. **CERAT. ROSÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est.
— J'ai trouvé cette nouvelle espèce près de Bassu, sur les bords de la route de St-Amand; sur les tiges mortes de *Rosa spinosissima*. — Il ne faut pas la confondre avec *Valsa ceratophora* dont les sporidies sont incolores et botuliformes. Dans *Cerat. Rosæ*, les ostioles sont filiformes; les thèques rondes comme celles des *Eurotium* et les sporidies brunes, ovoïdes. — Je n'ai constaté que 4 spores dans chaque thèque. — RR. — Automne.

Le **Ceratostoma Piliferum**, de *Sacc.* doit être reporté au Genre *Melanospora*. — Croît sur les écailles de chêne. — CCC.

Il en est de même du **Cerat. hæmatorrhynchum**, qui est sans doute le *Melanospora Capreæ*.

13^e GENRE. — **CHÆTOMIUM**. — *Kunze.*

1134. **CHÆT. CRISPATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les murs des caves et sur le bois pourri; formant des taches noires, velues. — Les périthèces ovoïdes sont couverts de plusieurs sortes de filaments, les uns bruns, raides, septés, disséminés à la surface; les autres très longs, tortueux, septés, placés au sommet du périthèce

et formant une houppe assez semblable à une grenade ; sporidies incolores dans les thèques , brunes et limoniformes étant mûres. — AC. — Hivers doux, Printemps. — St-Amand.

1135. **CHÆT. COMATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les pailles de seigle et de blé pourrisantes. — Automne , Printemps. — Partout.

1136. **CHÆT. ELATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les poutres et bois pourris, formant de larges taches velues ; dans les lieux humides et sans lumière. — Voisin du précédent. — Caves, celliers, décombres. — Partout. — Hiver et Printemps.

1137. **CHÆT. GRISEUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri et sur tiges mortes des plantes herbacées : *Brassica*, *Solanum tuberosum*, etc. — Périthèces ovoïdes , couverts de très longs poils grisâtres, mous, courbés au sommet ; sporidies peu colorées ; St-Amand. — Automne. — AR.

14^e GENRE.—**HELMINTHOSPIÆRIA.**—*Fuckel.*

1138. **HELM. CLAVARIARUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce intéressante croît à la base des rameaux de *Clavaria cristata* et lui donne un aspect noirâtre et velu. — Les périthèces globuleux sont couverts de poils courts, raides, noirs. Les thèques cylindriques et les sporidies brunes limoniformes. Ils accompagnent l'état conidien qui est *Helminthosporium clava-*

ria, beaucoup plus commun que l'état thécasporé. — AC. — Dans les forêts de Cheminon, Sermaize. — Été-Automne.

15^e GENRE. — **SORDARIA**. — *Ces.*

1139. **SORD. FIMISEDA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur crottes de brebis et de vache. — Les périthèces sont ovoïdes, à col allongé ; ils renferment des thèques, 8 sporidies cylindriques avec des spores elliptiques, brunes, munies d'un appendice caudal incolore, de même longueur. — AC. — Automne. — Champs, lieux où pâturent les troupeaux.
1140. **SORD. CARBONARIA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Croît sur le sol où l'on a fait du charbon. — Les périthèces sont rugueux, ovales, noirs ; les thèques cylindriques, longuement stipitées ; les sporidies naviculaires, présentant un appendice hyalin très court et difficile à observer. — RR. — Sermaize. — Automne. — Forêts.
1141. **SORD. SQUAMULOSA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le crottin de cheval, en Été par l'humide. — Périthèces mous, verdâtres, recouverts de papilles plus foncées, éparses, terminés en un ostiole noir, conique, longues thèques ; sporidies diverses suivant l'âge ; d'abord vermiformes, puis renflées au sommet ; le renflement brunit et se sépare du prolongement hyalin. C'est la sporidie définitive, limoniforme,

tronquée inférieurement. Cette évolution de la spore est la même que celle de *Bombardia*. — AR. — Automne.

1142. **SORD. CAUDATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois pourri. — Elle diffère du *Squamulosa* par ses périthèces noirs, charbonneux, sans papilles. Les thèques et les sporidies sont semblables, cependant les jeunes sporidies munies de leur appendice sont munies de 4 à 5 cloisons. — AR. — Lieux humides, azotés. — St-Amand. — Automne.

1143. **SORD. ANSERINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — *Podospora Fimeti* de Ces. — AC. sur les crottes de brebis dans les pâturages. — Très voisin de *Sord. fimiseda*. — S'en distingue par la présence de 4 sporidies dans chaque thèque au lieu de 8. — Automne, printemps. — Partout.

16^e GENRE. — **HYPOCOPRA.** — *Fuckel.*

1144. **HYP. DISCOPORA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Epars sur les crottes de lièvre. — Périthèces munis de poils noirs, courts; thèques cylindriques et sporidies en forme de disques. — Soulanges, Bayarne, dans les bois de pins sylvestres. — AR. — Automne.

1145. **HYP. MACROSPORA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Croît aussi sur les crottes de lièvre. — Périthèces noirs, glabres; sporidies atteignant 0^{mm},02 — Environs de Reims. — Communiqué par le Dr Jolicœur.

1146. **HYP. MAXIMA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur crottes de lapin de garenne. — Périthèces en forme d'obusier ; thèques ne contenant que 4 sporidies encore plus grandes que celles d'*Hyp. macrospora* 0^{mm},03. — Récolté en décembre dans les sapinières de Lisse à Bassu. — RR.
1147. **HYP. CAPILLIFERA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Récolté sur tige pourrie de porreau près d'un tas de fumier. — Périthèces en forme de bouteille blancs-jaunâtres avec un col noir, couverts çà et là de poils blancs, courts, plus longs à la base. — RR. — St-Amand. — Automne.

17^e GENRE. — **COPROLEPA.** — *Fries.*

1148. **COPR. MERDARIA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur crottes de lapin noircies par les sphærules et le tapis tomenteux-brun dans lequel elles sont plongées ; sporidies grandes, elliptiques, entourées d'un limbe très visible. — RR. — Lieux incultes des plantations de Pins. — Soulanges. — Automne.
1149. **COPR. FIMETI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur crottin de cheval. — Périthèces plongés dans un pseudo-strôme crustacé, gris ; ostioles coniques superficiels. — CC. — Après l'hiver dans les champs fumés. — St-Amand, etc.
1150. **COPR. EQUORUM.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur crottin de cheval. — Périthèces globuleux, glabres à ostioles courts, plongés dans un strôme brun. — CCC. — Fumiers anciens, jardins, etc. — Hiver, printemps.

18^e GENRE. — **PHILOCOPRA.** — *Speg.*

1151. **PHIL. SETOSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur crottin de cheval. — Rare espèce récoltée à St-Amand, hameau de la Cense des Prés. — Périthèces pyriformes, munis de poils bruns ; thèques amples, fusiformes, renfermant une très grande quantité de sporidies brunes, elliptiques, munies d'appendices hyalins.

19^e GENRE. — **ROSELLINIA.** — *De Not.*

1152. **ROS. AQUILA.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les branches et rameaux pourris, fichés en terre, dans les haies. — Périthèces globuleux, plongés dans un subiculum tomenteux, brun. — Partout. — Conidie, *Sporotrichum fuscum*.
1153. **ROS. THELENA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur planches et bois pourris. — Périthèces placés sur un subiculum presque glabre, brun-pourpre. — Moins commun que *Ros. aquila*. — St-Amand, etc.
1154. **ROS. MAMMÆFORMIS.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et les rameaux pourrissants. — Périthèces sans subiculum, mammi-formes, glabres, plus ou moins agglomérés ; sporidiés brunes pourvues d'appendices hyalins. CCC. — Haies, tas de bois. — St-Amand, etc.

1155. **ROS. PULVERACEA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur bois dénudé et troncs de hêtre et de peuplier. — Grandes plaques formées par les périthèces nombreux, noirs, chagrinés, ressemblant à des grains de poudre ; sporidies brunes elliptiques. — CC. Dans les chantiers et dans les bois. — St-Amand, St-Lumier, etc.

1156. **ROS. LIGNIARIA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur bois et planches de chêne humides. — Périthèces disposés en ligne, très petits, sphériques, couverts de poils noirs, raides. — AC. dans les celliers et les vieilles charpentes abandonnées dans lieux frais. — St-Amand, etc.

1157. **ROS. MALACHOTRICA.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Pinus sylvestris*. — Petits amas de périthèces logés dans les fentes de bois pourri, placés sur un tapis de poils courts, noirs, recouverts eux-mêmes entièrement de poils raides. Thèques cylindriques, sporidies brunes, presque sphériques. — CCC. dans les sapinières. — Soulanges, Bassu, etc.

20^e GENRE. — **BOMBARDIA.** — *Fries.*

1158. **BOMB. FASCICULATA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur vieux troncs d'Erable et d'Aulne coupés près du sol. — Périthèces réunis en faisceaux, allongés en massue ; bruns, glabres. Thèques très longues et tronquées au sommet ; sporidies semblables à celles de *Sordaria squamulosa* décrites plus haut. — AC. — Automne, hiver. — St-Amand, etc.

21^e GENRE. — **ANTHOSTOMELLA.** — *Sacc.*

1159. **ANTH^{lla}. TOMICUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. —
Sur tiges de *Juncus Glaucus* et *J. Communis*.
— Petites taches brunes, rondes; éparées,
entourant les ostioles des périthèces nichés
dans le parenchyme. Théques elliptiques; spori-
dies brunes, bi-ocellées. — AC. — Lieux maré-
cageux. — Hiver, Printemps. — St-Amand,
etc.
1160. **ANTH^{lla}. CONORUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les écailles des cônes du Pin sylvestre.
— Périthèces à demi immergés dans l'écorce.
épars. Théques cylindriques, sporidies brunes,
elliptiques, sans cloison. — CC. — Plantations
de pins. — Soulanges. Bassu, etc.
1161. **ANTH^{lla}. LIMITATA.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Cornus sanguinea*. —
Sous-épidermiques. formant des plaques tumé-
fiées, noiciées; sporidies brunes, elliptiques,
munies de 2 gouttelettes. — AC. — St-Amand,
St-Lumier, etc.
1162. **ANTH^{lla}. INTERMEDIA.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur branches mortes de *Salix caprea*
— Groupes de Périthèces très petits, épars. —
Théques cylindriques; sporidies elliptiques,
brunes. avec 2 gouttelettes. — AR. — Aulnay-
l'Aître, Lisse, etc. — Automne.
1163. **ANTH^{lla}. VISCI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. —
Sur rameaux morts de *Viscum album*. — Péri-

thèces épars, nombreux, placés sous l'épiderme, assez semblables à ceux du *Diptodia visci*. Thèques amples, cylindriques, entourées de paraphyses confuses; sporidies grandes 0^{mm}.03. — RR — Ablancourt. — Automne, printemps.

1164. **ANTH^{lla}. BERBERIDIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est et Bull. de la Soc. bot. de France. — Sur petits rameaux encore verts de *Berberis vulgaris*. — Récolté dans mon jardin en automne. — Périthèces sous-épidermiques, isolés ou réunis 2-3. — Thèques cylindriques; sporidies elliptiques, brunes, aiguës aux extrémités. — Je crois cette espèce assez commune, bien qu'ignorée jusqu'alors.
1165. **ANTH^{lla}. BROMI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — J'ai trouvé cette espèce nouvelle sur chaumes de *Bromus asper*. — Elle diffère d'*Anth^{lla}. Tomicum* par ses périthèces plus saillants, elliptiques, et par ses sporidies cymbiformes, courbes, munies d'une gouttelette comme celle des *Rosellinia*. — RR. — Bois entre St-Amand et St-Lumier. — Automne.

22^e GENRE. — **ANTHOSTOMA.** — *Nits.*

1166. **ANTH. XYLOSTEI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Lonicera Xylosteum* et *L. Caprifolium*. — Périthèces en groupes, plongés dans un strôme mince et dans le bois; l'épiderme noirci, en plaques allongées, elliptiques est couvert d'aspérités dues aux ostioles érum-

pents. Sporidies elliptiques, sans cloison ni gouttelettes. — AC. — Jardins. — St-Amand, Aulnay. — Automne.

1167. **ANTH. GASTRINUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes d'*Ulmus campestris*. — Se présente sous forme de pustules grosses, saillantes, noir-bleuâtre. — Thèques cylindriques et sporidies elliptiques, brunes avec quelques gouttelettes. — CC. dans les bois. — Automne. — Partout.

23^e GENRE. — **XYLARIA**. — *Hill.*

1168. **XYL. POLYMORPHA**. *Grév.* — Alb. de l'Est. — Sur vieilles souches d'Orme, de Peuplier, etc. coupées au niveau du sol. — Très varié de forme ; le strôme est vertical, noir, extérieurement, blanc à l'intérieur, strié en rayonnant vers la circonférence qui est couverte de sphérules contenant des thèques cylindriques très longues et des sporidies brunes, elliptiques, courbes. — CC. — Bois de St-Amand, La Chaussée.
1169. **XYL. HYPOXYLON**. *Grév.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois pourri, les écailles de bois gisant sur le sol humide. — Strômes minces, claviformes couverts d'abord de poils noirs à la base, puis en spatule aplatie, blanche, conidifère (*fusidium parasiticum*) au sommet ; plus tard munis de périthèces sphériques presque superficiels. — CCC. dans les bois, haies, jardins. — Partout.

1170. **XYL. TULASNEI.** *Nits.* — Alb. de l'Est.
— Sur les crottes de lapin de garenne. — Très rare espèce ayant des strômes de formes variées, portant au sommet un capitule garni de péri-thèces linguiformes ; thèques cylindriques, sporidies noires, elliptiques, entourées d'un limbe hyalin. — Garenne de Meigneux entre St-Amand et Vanault-le-Châtel. — Automne.
1171. **XYL. CARPOPHILA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Espèce filiforme, sur les fruits du hêtre tombés sur la terre humide des bois. — Aulnay-l'Aître, St-Amand. — CC. — Automne-Hiver.
1172. **XYL. DIGITATA.** *Grév.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois de chêne pourri, pieux et palissades. — Vient en touffes épaisses ; strômes égaux, plus minces et plus réguliers que ceux de *Xyl. polymorpha*. — AC.
1173. **XYL. HIPPOTRICHOIDES.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — J'ai récolté ce *Xylaria* sur écailles de bois pourri de pin sylvestre. — Ses strômes sont filiformes, rameux, comme ceux des *Rhizomorpha* ; les sphérules ovoïdes ou lagéniformes sont disposées en petit nombre le long des filaments tenus ; elles renferment à l'intérieur un mucilage rempli de glomérules de sporidies petites, ovales, brunes qui résultent sans doute, des thèques fugaces disparues. — RR. — Bois de pins à Soulanges. — Automne.

24^e GENRE. — **FORONIA.** — *Wild.*

1174. **POR. PUNCTATA.** *Wild.* — Alb. de l'Est.
— Sur le crottin de cheval depuis longtemps à l'air libre. — Strômes dressés en clavules ou cônes renversés ; disque blanc, ponctué-noir, conidifère ; sphérules sous-jacentes ; thèques cylindriques ; sporidies ovales brunes. — RR.
— St-Amand, au lieu dit *Chemin des bois.* — Automne.

25^e GENRE. — **USTULINA.** — *Tul.*

1175. **USTUL. VULGARIS.** *Tul.* — Alb. de l'Est.
— Sur les troncs morts d'Erable, de Peuplier, etc. — Grandes plaques crustacées, noirâtres, friables, couvertes de conidies dans le jeune âge (*sporotrichum agaricinum*) ; sporidies brunes, fusiformes. — CC. — Automne, printemps.

26^e GENRE. — **HYPOXYLON.** — *Bull.*

1176. **HYPOX. COCCINEUM.** *Bull.* — Alb. de l'Est.
— Sur troncs et branches de Frêne et de Prunier. — Strômes de la grosseur d'un pois, minium puis brun-rouille, précédé quelquefois par l'état conidien (*anthina flavovirens*). — CC.
— Bois. — St-Amand, St-Lumier, etc. — Hiver, printemps.
1177. **HYPOX. ARGILLACEUM.** *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs et branches d'*Alnus glutinosa*, de *Corylus*, etc. — Strômes bruns, recou-

verts d'une couche tomenteuse couleur d'argile (état conidien) ; — AC. dans les bois . — St-Amand, Aulnay-l'Aître, etc. — Hiver, printemps.

1178. **HYPOX. FUSCUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs et branches d'*Alnus glutinosa*, de *Corylus*, etc. — Strômes bruns puis noirs, hémisphériques, nombreux. — CCC. — Partout.

1179. **HYPOX. MULTIFORME.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur tronc de Bouleau. — Strômes arrondis ou aplatis, irréguliers-confluents. — AC. dans les bois. — Printemps, hiver. — St-Amand, St-Lumier, etc.

1180. **HYPOX. RUBIGINOSUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs de Pommier et de Hêtre. — Plaques minces, passant du brun-rouge au noir ; Périthèces peu saillants, elliptiques, logés dans l'épaisseur du strôme. — CC. — Bois, chantiers. — Automne, printemps.

1181. **HYPOX. SERPENS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Croît sur le bois des vieux saules pourrisants. — Plaques irrégulières, étroites, parallèles ; sporidies brunes, un peu courbes, à 2 gouttelettes, — CC. — Bords des ruisseaux, saussaies.

1182. **HYPOX. UDUM.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri de chêne. — Plaques irrégulières, moins étendues que celles d'*Hypox. serpens* ; sporidies elliptiques-allongées, droites. — CC. — Bois. — Hiver, printemps.

1183. **HYPOX. MINUTUM.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur bois de chêne. — Ressemble à l'espèce

précédente, mais plus petite avec des périthèces confluent et distincts, roussâtres, à ostiole noir ; sporidies presque fusiformes. — CC. — Bois. hiver.

27^e GENRE. — **DALDINIA**. — *De Not.*

1184. **DALD. CONCENTRICA**. *Cés.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs et souches de Frêne et de Bouleau. — Strômes de la grosseur d'une noix, globuleux, noirs extérieurement et couverts de Périthèces à la périphérie ; chair grisâtre munie de lignes concentriques plus foncées. — AR. — St-Amand, St-Quentin-les-Marais. — Printemps.
-

SECT. III. — **HYALOSPORÉES**. — *Sacc.*

28^e GENRE. — **CERATOSTOMELLA**. — *Sacc.*

1185. **CERAT^{lla}. ROSTRATA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois et les écaïlles de peuplier pourries sur la terre humide des bois. — Périthèces presque superficiels, distincts, à col très long ; sporidies incolores, courtes, botuliformes. — AC. — Bois. — Printemps.

29^e GENRE. — **GNOMONIELLA**. — *Sacc.*

1186. **GNOM^{lla}. TUBIFORMIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Croît à la face inférieure des feuilles

d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces nichés dans le parenchyme ; très long col ; sporidies fusiformes. — CC. — Bois, Haies, Jardins. — Hiver, Printemps.

1187. **GNOM^{lla}. VULGARIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles du *Corylus avellana*. — Périthèces s'aplatissant en cupules, cols en tubes très minces ; sporidies en fuseaux presque aculéiformes. — CC. — Hiver, printemps.

30^e GENRE. — **LÆSTADIA.** — *Auersw.*

1188. **LÆST. COOKEANA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de chêne encore adhérentes au rameau ; à la face inférieure. — Périthèces discoïdes, épars ; sporidies elliptiques, assez grandes, un peu resserrées aux extrémités, granuleuses. — AR. — St-Lumier, dans les bois. — Printemps, hiver.

1189. **LÆST. VENETA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Platane*. — Périthèces nichés dans le parenchyme ; ostiole apparent au dehors ; sporidies elliptiques-fusiformes, munies d'une petite cloison à l'une des extrémités, — AR. — Ablancourt. — Été, automne.

1190. **LÆST. EXCENTRICA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches terminales de *Buis* mort. — Périthèces formant au dehors une tache elliptique blanche, à pourtour et point central noirs, nichés sous l'épiderme ; spores elliptiques. — CC. — Haies, Jardins. — Printemps. — Partout.

1191. **LÆST. CARPINEA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Carpinus betulus* mortes,
en hiver. — Périthèces épars, nombreux ;
ouverture de l'ostiole comme un point blanc
central. Sporidies elliptiques-oblongues, granu-
leuses. — CC. — Haies, bois.
1192. **LÆST. PYROLÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles vertes de *Pyrola rotundifolia*.
— Apparence d'un *phyllosticta* ; taches rouges
puis brunes ; Périthèces presque superficiels ;
sporidies elliptiques - oblongues , granuleuses .
(An *Læst. malbrancheana* de *Sacc.* ?) — AR.
— Automne. — St-Amand.

31^e GENRE. — **PHOMATOSPORA.** — *Sacc.*

1193. **PHOM^{spra}. MOLLUGINIS.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur tiges de *Galium mollugo*. — Pé-
rithèces peu nombreux près des nœuds ; spori-
dies elliptiques , munies de 2 gouttelettes sem-
blables aux sporules des *Phoma*. Thèques
cylindriques, monostiques. — AC. — St-Amand
— Talus et broussailles ; le long des routes.
1194. **PHOM^{spra}. BERBERIDIS.** *Ch. R.* — Alb.
de l'Est. — Sur jeunes rameaux morts de
Berberis vulgaris. — Thèques presque filifor-
mes ; sporidies elliptiques, 2 gouttelettes. —
AR. — Dans mon jardin. — Hiver.

32^e GENRE. — **PHYSALOSPORA.** — *Niessl.*

1195. **PHYS. GREGARIA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur tigelles et feuilles de *Taxus baccata*. —

Pustules noires, rangées en ligne comme celles du *Diplodia Taxi*. — Thèques larges : sporidies granuleuses, ovoïdes-oblongues. — AR. — Automne. — Jardins. — St-Amand.

1196. **PHYS. MINUTULA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Euphorbia sylvatica*. — Groupes de Périthèces sous-épidermiques formant des taches grises, oblongues ; thèques courtes, renfermant de 6 à 8 sporidies ovoïdes-oblongues. — Forêt de la Montagne de Reims. — Automne. — RR.

1197. **PHYS. ONONIDIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Ononis natrix*. — Périthèces sous-épidermiques ; ostioles noirs, érum-pents. Thèques fusiformes, larges ; sporidies elliptiques, oblongues ; quelques paraphyses fugaces. — AR. — Bords du chemin de Soulanges à St-Amand. — Automne. — Voisin de *Phys. minutella*. *Sacc.*

33^e GENRE. — **DITOPELLA.** — *De Not.*

1198. **DITOP. FUSISPORA.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Envahit les branches et rameaux d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces nichés sous l'épiderme qu'il est difficile de soulever sans les arracher. Thèques larges renfermant une grande quantité de sporidies fusiformes. — CC. dans les bois. — Automne, hiver. — Partout.

34^e GENRE. — **WALLROTHIELLA.** — *Sacc.*

1199. **WALLR. MINIMA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.

— Croît sur les lattes de chêne qui soutiennent les bouteilles dans les caves. — Périthèces à peine visibles, sphériques, superficiels, luisants ; thèques cylindriques ; sporidies ovales fusiformes. — AR. — St-Amand. — Automne, hiver.

35^e GENRE. — **BOTRYOSPHAERIA.** — Ces.

1200. **BOTRYOS. BERENGERIANA.** Sacc. — Alb. de l'Est. — Sur les branches mortes de Peuplier. — Forme des groupes de 5-8 périthèces réunis dans un même strôme irrégulier, elliptique et non en pustule comme celui de *Botryos. advena* ; sporidies ovoïdes-fusiformes granuleuses. — AC. — Automne. — St-Amand. — Est accompagné quelquefois du *Botryodiplodia*, sa forme pycnidienne.
1201. **BOTRYOS. ADVENA.** Ces. — Alb. de l'Est. — *Dothidea Melanops* de Tul. — Sur les branches et rameaux de chêne, accompagné de sa forme conidienne *Dothiorella advena*. — Sporidies ovoïdes, fusiformes, granuleuses. — AC. — Automne. — Bois de St-Lumier à St-Amand, etc.
1202. **BOTRYOS. DOTHIDEA.** Ces. — Alb. de l'Est. — Sur tiges encore vertes de *Rosa canina*. — Tubercules darts, fendillés, renfermant les périthèces à nucleus blancs ; thèques larges ; sporidies ovales ; paraphyses toruleuses. — CCC. dans les bois et les jardins. — Partout.

36^e GENRE. — **CRYPTOSPORELLA.** — Ces.

1203. **CRYPT**^{lla}. **HYPODERMIA.** Sacc. — Alb. de l'Est. — Croît sur les rameaux d'*Ulmus campestris*. — Périthèces sous-épidermiques; thèques amples; sporidies fusiformes très grandes; la conidie *Phoma. ulmicola*. Sacc. l'accompagne souvent. — AC. — St-Amand. — Automne.

1204. **CRYPT**^{lla}. **AUREA.** Sacc. — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux de *Carpinus betulus* — Forme des pustules composées de 6-8 périthèces réunis par un pseudo-strôme jaune orangé; larges thèques; sporidies ovoïdes, grandes. — AR. — Automne. — Bois. — Aulnay-l'Aître.

1205. **CRYPT**^{lla}. **POPULINA.** Sacc. — Alb. de l'Est. — Commun sur les branches de *Populus pyramidalis*. — Périthèces 6-8 à cols réunis en faisceau sous l'épiderme des rameaux; sporidies elliptiques un peu courbes. — CCC. — Bois, jardins. — Partout.

1206. **CRYPT**^{lla}. **CHONDROSPORA.** Rehm. — Alb. de l'Est. — Sur les petits rameaux encore adhérents au tronc du tilleul. — Sporidies obovales, teinte jaunâtre-claire, granuleuses, partie inférieure exempte de granulations et paraissant munie d'une cloison. — AC. — Soulanges, Aulnay. — Automne.

SECT. IV. — **HYALODIDYMÉES.** — *Sacc.*

37^e GENRE. — **SPHÆRELLA.** — *Ces.*

1207. **SPH^{lla}. MACULIFORMIS.** *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Hypophylle sur *Quercus robur.* — Périthèces très petits, réunis en groupes de teinte grisâtre ; thèques nombreuses ; sporidies ovoïdes, septées, peu visibles. — CCC. dans les bois. — Automne, printemps. — Partout.
1208. **SPH^{lla}. HEDERICOLA.** *Cooke.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Lierre.* — Taches blanches orbiculaires, entourées d'un limbe rouge ; périthèces peu nombreux, assez semblables à ceux de la spermogonie, *Septoria hederæ* ; sporidies elliptiques, uniseptées. — AR. — Ablancourt, St-Amand. — Hiver.
1209. **SPH^{lla}. GENUFLEXA.** *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles mortes de *Castanea vulgaris.* — Petits groupes à peine visibles ; thèques amples ; sporidies allongées, courbes, munies d'une cloison ; lobe supérieur renflé ; lobe inférieur étroit. — AC. — Bois de la Montagne de Reims. — Printemps.
1210. **SPH^{lla}. POPULI.** *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Populus nigra* ayant séjourné l'hiver sur le sol humide. — Périthèces hémisphériques, thèques renflées ; sporidies cylindriques, septées, amincies aux extrémités. — AC. — St-Amand, St-Quentin, etc. — Printemps.

1211. **SPH^{lla}. CRASSA.** *Auersw.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Populus cordifolia*, à la face inférieure ; — Petits groupes épars de périthèces hémisphériques ; thèques en massue renflée ; sporidies presque ovales, uniseptées. — AR. — St-Quentin-les-Marais. — Printemps.
1212. **SPH^{lla}. RUMICIS.** *Gon.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Rumex crispus*. — Périthèces 3-6, très petits, insérés sur une tache brune ; thèques en massue ; sporidies ovales, uniseptées, ressemblant aux sporules de *Trichothecium roseum*. — AC. — Printemps. — Ablancourt, etc. — Bois.
1213. **SPH^{lla}. DEPAZEÆFORMIS.** *Gon.* — Alb. de l'Est. — Petits groupes de Périthèces épars à la face inférieure des feuilles mortes de *Poterium sanguisorba* ; thèques en massue ; 4-8 sporidies elliptiques, allongées, courbes, uniseptées, 4 gouttelettes. — AC. — Champs crayeux, herbus, bois de Pins. — St-Amand, Soulanges. — Automne.
1214. **SPH^{lla}. PLANTAGINIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les scapes de *Plantago major* et *media*. — Groupes de périthèces très petits, sphériques ; thèques claviformes, renfermant 6 sporidies obovales-allongées. — AR. — Bords du chemin de Lisse à Bassu. — Printemps.
1215. **SPH^{lla}. DAHLIÆ.** *C. et Ell.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Dahlia* mortes, encore adhérentes au tubercule. — Groupe de périthèces très nombreux ; thèques en massue ;

sporidies grandes, ressemblant à celles des *Diaporthe*, munies de 4 sporules. — AC. — Hiver, Printemps.

1216. **SPH^{lla}. VINCETOXICI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges de *Cynanchum Vincetoxicum*, formant des taches grisâtres semblables à celles de *Sphæroopsis nebulosa*. — Les spermogonies viennent de préférence sur les siliques de la plante. Thèques cylindriques; sporidies assez grandes, ovales-allongées. — AR. — Collines de Soulanges. — Automne, hiver.

1217. **SPH^{lla}. RUBELLA.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Angelica sylvestris*. — Groupes allongés de petits périthèces sur une tache rouge-pourpre. Thèques en massue et sporidies elliptiques-allongées; rarement observées. — CC. — Automne, printemps. — Bords des eaux.

1218. **SPH^{lla}. CAULINCOLA. Var. Succisæ.** *Karst.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Scabieuse succise*. — Très petits périthèces disséminés sur des taches brunes qui entourent les tiges et les feuilles desséchées; thèques en massue; sporidies incolores d'abord, puis un peu jaunâtres. — Bois de Sermaize. — RR.

1219. **SPH^{lla}. EPILOBII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Envahit les deux côtés des feuilles d'*Epilobium roseum* et *angustifolium*. — Sur les bords du Fion à St-Amand. — Thèques la plupart cylin-

driques ; sporidies ovoïdes-allongées , teintées de jaune en vieillissant. — AC. — Automne.

1220. **SPH^{lla}. VULNERARIÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Anthyllis vulneraria*. — Petits groupes maculiformes ; thèques assez larges ; sporidies allongées , étroites , un peu courbes. — AR. — Bois de pins , bords des chemins herbus. — Automne , Printemps. — St-Amand, Lisse.

1221. **SPH^{lla}. EBULI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Sambucus ebulus*. — Péri-thèces disséminés donnant à l'épiderme une teinte grise ; thèques en massue ; sporidies uniseptées, un peu étranglées à la cloison. — AC. — Aulnay-l'Aître, Lisse, etc. — Automne.

1222. **SPH^{lla}. SUPERFLUA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sarments de houblon. — Thèques courtes , sans paraphyses, renfermant 6 sporidies ovales-allongées. — AC. dans les jardins et les bois à St-Amand, Aulnay, etc. — Hiver.

38^e GENRE. — **STIGMATEA.** — *Fries.*

1223. **STIGM. ROBERTIANI.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur la face supérieure des feuilles vivantes de *Geranium Robertianum*. — Groupes de périthèces petits, hémisphériques, noirs, luisants ; thèques distiques ou monostiques ; sporidies ovoïdes , uniseptées, incolores puis jaunâtres. — CC. — Automne. — Partout.

39^e GENRE. — **DIDYMELLA.** — *Sacc.*

1224. **DIDYM**^{lla}. **VEXATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les rameaux de *Cornus sanguinea*. —
Périthèces souscutanés, groupés ; ostioles petits,
érumpents, formant une tache grisâtre ; thèques
amples ; sporidies grandes, incolores puis
jaunâtres , uniseptées ; paraphyses fugaces ,
septées. — AC. — St-Lumier, St-Amand , etc.
— Printemps.
1225. **DIDYM**^{lla}. **MEDIA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges sèches de *Verbena officinalis*. —
Périthèces épars, sous-cutanés ; thèques amples ;
sporidies didymes, munies de quelques goutte-
lettes ; paraphyses très visibles. — AC. —
Ablancourt, La Chaussée, etc. — Printemps.
1226. **DIDYM**^{lla}. **HELLEBORI.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur les vieilles tiges d'*Helleborus*
viridis dont la surface noire, rugueuse est cou-
verte de périthèces disposés en lignes ; thèques
monostiques ; sporidies ovoïdes, uniseptées. —
AR. — Soulanges, Ablancourt. — Hiver, Prin-
temps.
1227. **DIDYM**^{lla}. **BRYONIAE.** *Rehm.* — Alb. de
l'Est. — Sur les tiges mortes de *Bryonia dioica*.
— Périthèces sous-cutanés puis érumpents ; thèques
grandes ; 8 sporidies didymes, lobe supé-
rieur plus large que l'inférieur ; paraphyses
nébuleuses. — AC. — Haies, jardins. — Hiver.

1228. **DIDYM**^{lla}. **CULMIGENA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes de *Bromus asper*, près des nœuds. — Périthèces aplatis à la base ; thèques renfermant 6 sporidies elliptiques-fusoïdes, contenant deux grosses gouttelettes ; paraphyses remplies de granulations. — AR. — Printemps. — St-Amand.
1229. **DIDYM**^{lla}. **EPILOBII**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Epilobium spicatum*. — Périthèces sous-cutanées, érumpents, s'affaissant en cupules ; ostioles coniques ; apparence de *Pleospora*. Thèques monostiques ; sporidies assez grandes. — AR. — St-Amand. — Jardins.

40^e GENRE. — **GNOMONIA**. — *Ces.*

1230. **GNOM. DEPRESSULA**. *Karst.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges sèches de *Rubus caesius* dont la surface est hérissée de petits aiguillons qui sont les ostioles des périthèces sous-jacents. — Thèques renfermant 4 sporidies elliptiques-allongées, munies de 4 gouttelettes. — AR. — St-Amand. — Automne.
1231. **GNOM. RHOIS**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur les pétioles de feuilles de *Rhus Typhinum*. — Périthèces sous-cutanées ; ostioles en forme d'épines, érumpents ; thèques sans paraphyses, amincies à la base ; sporidies fusiformes, étroites. — AR. — Dans mon jardin. — St-Amand. — Printemps.
1232. **GNOM. SETACEA**. *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur les écailles et les involucre des glands

du chêne, presque invisibles à l'œil nu. — Périthèces globuleux à cols filiformes ; thèques en massue renflée, contenant de 4 à 6 sporidies baculiformes, un peu courbes, 4 gouttelettes. — AR. en fructification. — St-Amand. — Printemps.

1233. **GNOM. ISCHNOSTYLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les nervures et sur les pétioles d'*Acer platanoides*. — Périthèces sous-cutanés, cols éruptifs, entourés à la base d'une tache noire ; thèques renfermant 8 sporidies fusiformes, étroites. — CCC. dans les bois. — Automne, hiver. — St-Amand.

1234. **GNOM. ERYTHROSTOMA.** *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Prunus avium* encore adhérentes à l'arbre. — Périthèces disséminés à la face inférieure en forme de petits mamelons rougeâtres et de cupules déprimées à la face supérieure ; thèques renfermant 8 sporidies distiques, oblongues, granuleuses. — RR. — St-Amand. — Printemps.

1235. **GNOM. LEPTOSTYLA.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de noyer desséchées ; espèce voisine de *Gnom. Ischnostyla*, mais plus développée, thèques contenant 8 sporidies fusiformes. — AC. — Hiver, Printemps. — Partout.

41^e GENRE. — **MELANOPSAMMA.** — *Nicssl.*

1236. **MEL. POMIFORMIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs d'arbres, Noyer, Aulne, etc. — Agglomération considérable de périthèces superficiels, petits, rugueux, s'affaissant en cupule,

formant de larges plaques irrégulières. — Thèques octospores ; sporidies uniseptées ; 4 gouttelettes. — AC. — Chantiers, bois. — St-Lumier, St-Amand. — Printemps.

1237. **MEL. CRYPTOSTOMA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur racines d'*Erica*, cachées sous terre. — Périthèces presque astomes, couverts de poils divergents-étoilés et placés sur un subiculum velu, brun ; thèques renfermant de 2 à 4 sporidies fusoides, allongées, uniseptées ; 4 gouttelettes. — R. — Forêt de Sermaize. — Automne.

42^e GENRE. — **BERTIA.** — *De Not.*

1238. **BERT. MORIFORMIS.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de chêne et sur cônes de *Pinus sylvestris*. — Périthèces réunis en petits groupes, noirs, tuberculeux, superficiels, allongés ou sphéroïdes ; thèques avec paraphyses filiformes ; sporidies allongées-étroites, munies d'une cloison. — AR. — Bois, sapinières. — Soulanges. — Forêt de Sermaize. — Automne.

43^e GENRE. — **LENTOMITA.** — *Niessl.*

1239. **LENT. AUERSWALDII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Genista tinctoria*, notamment à la base. — Les périthèces sous-cutanés sont réunis 3-5 ou épars ; les cols plus ou moins allongés, épais, percent l'épiderme. — Le Genre *Lentomita* diffère du G. *Rhinchospora* par ses sporidies incolores. — AR. — Bois de Charmont. — Automne.

44^e GENRE. — **VENTURIA**. — *De Not.*

1210. **VENT. KUNZEI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Rubus cæsius*. — Petits tubercules ou périthèces noirs, velus, épars, souvent stériles, renfermant quand ils sont fertiles des thèques claviformes, octospores; sporidies ovales, uniseptées, incolores puis teintées jaunâtres. — CC. dans les bois en Automne.
1241. **VENT. CIRCINANS**. — *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des *Geranium molle* et *Rotundifolium*. — Groupes de Périthèces couverts de poils courts, renfermant des thèques amples, octospores; sporidies à deux loges, la supérieure plus grande. — AC. — Bois, jardins. — Partout.
1242. **VENT. EXOSPORIODES**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Poa* et de *Festuca*. — Petits groupes de périthèces noirs, à poils courts, divergents, s'affaissant en cupules. Thèques octospores; sporidies fusoïdes, uniseptées. — AR. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Automne.

45^e GENRE. — **ERIOSPHAERIA**. — *Sacc.*

1243. **ERIOS. ALLIGATA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur lattes de chêne exposées à l'air humide. — Très petits périthèces à peine visibles, couverts de poils noirs, placés sur un subiculum

velu, brun. — Thèques cylindriques ; sporidies elliptiques , uni - cloisonnées , 2 gouttelettes. — AR. — St-Lumier. — Automne.

46^e GENRE. — **MELANCONIS.** — *Tul.*

1244. **MEL. STILBOSTOMA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Betulus alba*. — Pustules corticales composées de 6 à 8 périthèces réunis en cercle ; cols en faisceau dont le sommet apparaît comme des points noirs sur un disque blanc. Thèques octospores ; sporidies elliptiques uni - cloisonnées, granuleuses. — AC. — Bois, chantiers.
1245. **MEL. MODONIA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de châtaignier. — Pustules formées par la réunion de 6-8 périthèces ; ostioles courts, disposés en disque ; thèques longues ; sporidies grandes, elliptiques, un peu jaunâtres ; la Conidie *Steganosporium Castaneæ* l'accompagne. — RR. — Bois de la Montagne de Reims.
1246. **MEL. ALNI.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces en cercle, munis de thèques amples , renfermant 8 sporidies elliptiques, resserrées au milieu et terminées aux extrémités par des appendices minces, allongées. — CC. dans les bois. — St-Amand. — Automne, Printemps.
1247. **MEL. THELEBOLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Alnus glutinosa*. — Pustules corticales renfermant 5-7 périthèces ; thèques

fusiformes , contenant 8 sporidies allongées , botuliformes ou droites, granuleuses, terminées par deux appendices filiformes. — AC. — Bois de St-Lumier à St-Amand. — Hiver.

47^e GENRE. — **HERCOSPORA**. — *Tul.*

1248. **HERCOSP. TILIÆ**. *Tul.* — Alb. de l'Est.
— Très commun sur les branches mortes de Tilleul qu'il entoure complètement ; 5-6 périthèces en cercle dont les cols réunis en un seul tube percent l'épiderme ; thèques octospores ; sporidies elliptiques, uni-cloisonnées ; la Pycnide *Hercospora Tiliæ* l'accompagne souvent — Bois, jardins. — Automne, Printemps.

48^e GENRE. — **DIAPORTHE**. — *Nits.*

1249. **DIAP. CARPINI**. *Fuckel.* — Alb. de l'Est.
— A la base des rameaux secs de *Carpinus betulus*. — Périthèces réunis en pustules disposées en lignes et perçant l'épiderme en forme d'étoile. Thèques fusiformes ; sporidies elliptiques allongées, uniseptées, munies de 4 gouttelettes. caractère commun à presque tous les *Diaporthe*.
— AC. — Haies des jardins et dans les forêts.
— Hiver, printemps.
1250. **DIAP. ACERIS**. *Fuckel.* — Alb. de l'Est.
— Sur branches d'*Acer pseudo-platanus*. — Périthèces réunis en pustules circonscrites par une ligne noire ; thèques oblongues-fusiformes, 4 gouttelettes. — CC. — Bois. — Partout. — Printemps.

1251. **DIAP. ONCOSTOMA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Robinia pseudo-acacia*. — Pustules sous-cutanées, disposées en lignes circonscrites par une ligne noire ; périthèces réunis, à cols allongés, un peu divergents ; thèques oblongues ; sporidies fusoïdes. — CC. — Automne, Printemps. — Jardins. — Partout.
1252. **DIAP. STRUMELLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur branches desséchées de *Ribes nigrum*. — Pustules contenant de 10 à 15 Périthèces, disposées en lignes ; ostioles plus ou moins longs ; thèques fusoïdes ; sporidies uni ou triseptées, fusoïdes un peu courbes. — CCC. — Jardins. — Automne, Printemps.
1253. **DIAP. LEIPHÆMA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de chêne. — Pustules à disques pâles ; périthèces peu nombreux ; thèques presque cylindriques ; sporidies distiques, ovales lancéolées. — CCC. — Bois, forêts.
1254. **DIAP. QUERCINA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de chêne. — Pustules éparses, corticales, limitées par une ligne noire, thèques allongées, contenant 8 sporidies distiques, oblongues-lancéolées. — 4 gouttelettes. — CC. — Bois.
1255. **DIAP. FIBROSA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur branches desséchées de *Rhamnus frangula*. — Pustules éparses, entourées à la base par les fibres de l'écorce ; thèques renfermant des sporidies monostiques, elliptiques, courtes ;

2 gouttelettes seulement ; paraphyses fugaces , très longues. — AR. dans les haies à La Chaussée. — Printemps.

1256. **DIAP. DETRUSA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur *Berberis vulgaris*. — Pustules corticales, reposant sur un strôme noir qui entoure le rameau ; thèques fusoïdes ; sporidies elliptiques, 4 gouttelettes ; paraphyses longues, fugaces. — CC. — Hiver, Printemps. — Jardins.

1257. **DIAP. CRASSIUSCULA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux desséchés de *Mahonia*. — Pustules corticales entourées par une ligne noire ; périthèces à ostioles courts , érupents, larges, pézizoïdes ; thèques en massue ; sporidies ovales-oblongues, resserrées au milieu ; 4 gouttelettes. AC. — Jardins. — Hiver. — St-Amand.

1258. **DIAP. SALICELLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Salix alba*. — Périthèces épars, sous-cutanés, adhérents à l'épiderme ; ostioles courts ; thèques en massue ; sporidies distiques, ellipsoïdes-courbes, sans gouttelettes. — CCC. — Bords des eaux. — St-Amand. — Automne.

1259. **DIAP. SYNGENESIA** (?). *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Rhamnus frangula*. — Périthèces sous-cutanés, peu apparents au dehors, se rapprochant de l'espèce voisine ; thèques fusoïdes ; sporidies longues, étroites, resserrées au milieu, un peu courbes ; 4 gouttelettes écartées. — AR. — La Chaussée. — Hiver.

1260. **DIAP. TALEOLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les jeunes rameaux du chêne. — Pustules corticales, peu apparentes extérieurement; périthèces 5-8 contenant des thèques presque cylindriques; sporidies monostiques, munies de 4 appendices filiformes dont deux aux extrémités et deux au centre en forme de croix. — AR. — St-Amand, St-Lumier. — Automne.
1261. **DIAP. GALERICULATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Fagus sylvatica*. — Pustules corticales, blanchâtres; périthèces agrégés en cercles; thèques fusoïdes, tronquées supérieurement, contenant 6 sporidies elliptiques fusoïdes, munies de 2 appendices ciliées. — AR. — St-Amand, Aulnay. — Printemps.
1262. **DIAP. PULLA.** *Nits.* — Alb. de l'Est. —
— Sur tiges de *Solanum dulcamara* et sur *Hedera helix*. — Périthèces enfoncés dans le ligneux; ostioles éruptifs, spiniformes, traversant un strôme noir, superficiel; thèques entourées de paraphyses, renfermant 8 sporidies elliptiques-oblongues, 4 gouttelettes. — AC. — Printemps.
1263. **DIAP. CRYTICA.** *Nits.* — Alb. de l'Est. —
Sur tiges sarmenteuses dénudées de *Lonicera periclymenum*. — Strôme grisâtre, parsemé de petits points noirs, ostioles des périthèces incrustées dans le bois; thèques claviformes contenant 6-8 sporidies elliptiques; 4 gouttelettes. — AC. — Haies des jardins, parcs, etc. — Automne. — St-Amand, Soulanges.

1264. **DIAP. CONORUM.** *Niessl.* — Alb. de l'Est.
— Sur cônes de *Pinus sylvestris*. — Périthèces épars, sphériques, peu nombreux ; thèques claviformes ; sporidies distiques, oblongues, resserrées au milieu, 4 gouttelettes. — CC. — Bois de pins. — Bassu, Lisse, etc. — Hiver.
1265. **DIAP. OCCULTA.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur cônes de *Pinus sylvestris*. — Diffère du précédent par l'ostiole très allongé des périthèces et par ses sporidies munies aux extrémités d'appendices très courts. — AC.
1266. **DIAP. NIGRELLA.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur vieilles tiges d'*Eryngium campestre*. — Périthèces incrustés dans un strôme noirâtre, superficiel ; sporidies fusoïdes, assez larges ; 4 gouttelettes. — AR. — Bords des chemins. — St-Amand.
1267. **DIAP. ORTHOCERAS.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — A la base des tiges d'*Achillea millefolium*. — Aspérités superficielles, dues à la présence des ostioles coniques des périthèces incrustés dans le ligneux ; thèques claviformes ; sporidies distiques, fusiformes ; 4 gouttelettes. — AC. le long des chemins herbus. — St-Lumier. — Printemps.
1268. **DIAP. LINEARIS.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges sèches de *Solidago virga aurea*. — Périthèces disposés en ligne ; ostioles courts, saillants ; thèques claviformes ; sporidies fusiformes, resserrées au milieu ; 4 gouttelettes. — AC. — St-Amand, Lisse. — Automne.

1269. **DIAP. EUPHORBIAE.** *Cooke.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges d'*Euphorbia cyparissias*. — Périthèces épars, 6-8 sous l'épiderme noirci et formant tache sur la tige ; thèques claviformes ; sporidies fusoïdes. — AR. — St-Amand. — Le long des chemins herbus. — Printemps.
1270. **DIAP. VINCAE.** *Cooke.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges desséchées de *Vinca major*. — Strômes noirâtres formant des taches irrégulières ; périthèces dont les ostioles sont saillants, coniques ; thèques claviformes ; sporidies fusoïdes, resserrées au milieu ; 4 gouttelettes. — R. dans les Jardins. — Printemps.
1271. **DIAP. INÆQUALIS.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges et racines mortes de *Genista prostrata* ; groupes épars de périthèces disposés en cercle, déchirant l'épiderme ; thèques octospores et paraphyses fugaces, très longues ; sporidies monostiques semblables à celles de *Diap. fibrosa*. — AR. — Lisse, Bassu. — Sapinières. — Printemps.
1272. **DIAP. VEPRIS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Rubus fruticosus*. — Périthèces en lignes avec ostioles coniques dirigés en tous sens ; thèques claviformes ; sporidies un peu courbes, resserrées au milieu. — AC. — St-Amand. — Automne.
1273. **DIAP. ROSTELLATA.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Rubus fruticosus*. — Diffère de l'espèce précédente par ses périthèces superficiels, munis de cols allongés et par ses spores

oblongues terminées à chaque extrémité par un appendice court, spiniforme. — AR. — St-Lumier. — Printemps.

1274. **DIAP. LIRELLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Spiræa ulmaria*. — Taches elliptiques ayant l'apparence des *Leptostroma*, recouvrant 4 à 6 périthèces, sphériques, un peu aplatis, contenant des thèques claviformes, octospores; sporidies baculiformes, droites; 4 gouttelettes. — AR. — Bords du Fion. — St-Amand.
1275. **DIAP. CERASI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux de *Cerasus avium*. — Pustules corticales contenant 5-8 périthèces; thèques claviformes; sporidies distiques-fusiformes, acuminées; 4 gouttelettes. — AR. — Printemps. — St-Amand.
1276. **DIAP. RESECANS.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa vulgaris*. — Strôme noir, cortical, logeant les périthèces épars, incrustés dans le bois; ostioles courts; thèques claviformes; sporidies acuminées, oblongues; paraphyses fugaces; 4 gouttelettes. — AC. dans les jardins. — Printemps. — St-Amand.
1277. **DIAP. ALNEA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux secs d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces sous-cutanées, à peine visibles, épars, noirs, à nucleus blanc; thèques octospores; sporidies didymes, resserrées à la cloison. — AC. — St-Lumier. — Bois. — Été, Automne.
1278. **DIAP. RYCKHOLTII.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — A la base des rameaux secs de *Symphori*

carpon. — Pustules sous-cutanées composées de 5-6 périthèces ; thèques octospores ; sporidies elliptiques-oblongues, un peu acuminées, distiques ; 4 gouttelettes. — Paraphyses fugaces, longues et larges. — AC. — Jardins. — Hiver.

1279. **DIAP. CORNI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de *Cornus sanguinea*. — Strômes noirs sous-cutanés ; périthèces en groupes ellipsoïdes ; sporidies distiques, fusoides ; 4 gouttelettes. — AC. — Soulanges, Ablancourt. — Printemps.

1280. **DIAP. LASCHII.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Evonymus Europæus*. — Strôme noir, étendu, sous-cutané, traversé par les ostioles des périthèces épars, logés dans le bois ; sporidies ovales-oblongues, non resserrées à la cloison ; 4 gouttelettes. — La *Spermogonie Rhoma foveolaris* croît à la surface de l'épiderme qui recouvre le strôme. — AR. — Ablancourt. — Printemps.

1281. **DIAP. PUTATOR.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sous l'écorce des rameaux de *Populus nigra*. — Périthèces confluents, elliptiques, incrustés dans le bois ; thèques claviformes ; sporidies elliptiques, allongées ; 4 gouttelettes. — St-Amand. — Bois. — C. — Hiver.

1282. **DIAP. EPILOBII.** *Cooke.* — Alb. de l'Est. -- Sur tiges mortes d'*Epilobium hirsutum*. — Périthèces sphériques, épars, traversant un strôme à peine coloré ; thèques avec paraphyses ;

- sporidies fusoïdes, resserrées au milieu ; 4 gouttelettes. — AC. — Printemps. — Bords du Fion.
1283. **DIAP. STRIÆFORMIS.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Epilobium spicatum*. — Groupes de périthèces distincts, disposés en ligne sous l'épiderme légèrement teinté ; thèques cylindriques ; sporidies monostiques, ovoïdes-oblongues. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Été.
1284. **DIAP. PARDALOTA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Convallaria multiflora*. — Petites taches grises, irrégulières, formées par des strômes minces, contenant de 6 à 8 périthèces ronds, aplatis ; thèques octosporos ; sporidies elliptiques-oblongues ; 4 gouttelettes. — AC.
1285. **DIAP. BECKAUSII.** *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Viburnum opulus*. — Strôme noirâtre, étendu, sous-cutané, traversé par les ostioles des périthèces nombreux, plongés dans le bois ; thèques octosporos ; très longues paraphyses, fugaces ; sporidies étroites, non resserrées ; 4 gouttelettes. — AR. — Automne. — Bois de St-Amand.
-

SECT. V. — **PHÆODIDYMÈES.** — *Sacc.*

49^e GENRE. — **DIDYMOSPHERIA.** — *Sacc.*

1286. **DIDYM. GENISTÆ** (*Spartii* ?) *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges et racines de *Genista*

prostrata. — Strôme noirâtre, mince ; périthèces épars, sphériques ; thèques cylindriques avec paraphyses ; sporidies elliptiques, brunes, uni-septées, monostiques. — AC. — Bassu, Soulanges. — Automne.

1287. **DIDYM. DIPLOSPORA.** *Rehm.* — Alb. de l'Est. — Sur les sarments de *Rubus fruticosus*. — Périthèces sous-cutanés, hémisphériques, noirs, luisants ; l'épiderme qui les recouvre est noirci ; thèques cylindriques ; sporidies monostiques, brunes-olivâtres. — AC. — St-Lumier, Soulanges ; — Printemps.

1288. **DIDYM. ACERINA.** *Rehm.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux secs d'*Acer platanoides*. — Périthèces sous-cutanés, hémisphériques, aplatis ; thèques cylindriques ; sporidies monostiques, elliptiques-allongées, brunes. — AC. — Bois de St-Amand. — Printemps, automne.

50^e GENRE. — **AMPHISPHERIA.** — *Cés.*

1289. **AMPH. UMBRINA.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de chêne ; Périthèces sous-cutanés ; thèques cylindriques avec paraphyses filiformes, libres ; sporidies fuligineuses, brun-pâle. — AC. — St-Amand. — Automne, hiver.

1290. **AMPH. PSEUDO-UMBRINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ulmus campestris*. — Périthèces sous-cutanés, épars, sphériques ; thèques cylindriques ; paraphyses indécises, muqueuses ; sporidies monostiques, brunes, elliptiques. — AC. — Soulanges, St-Amand. — Printemps.

1291. **AMPH. PUSIOLA.** *Karsten.* — Alb. de l'Est.
— Sur bois de Chêne dénudé. — Groupes de
périthèces sphériques, très petits, luisants, entourés
de poils noirs qui leur semblent étrangers ;
nucleus blanc ; thèques cylindriques ; sporidies
elliptiques, allongées, brunes. — RR. — Bois
de Sermaize. — Été.

1292. **AMPH. POSIDONIÆ.** *Cés.* — Alb. de l'Est.
— Inscrit dans notre catalogue pour mémoire.
— Cette plante m'a été communiquée par M.
Marcilly, Inspecteur des forêts à Châlons-sur-
Marne. Je copie ici textuellement la notice
dont j'ai accompagné le dessin de mon album,
après examen. Cette espèce croît sur les tiges
radicantes du *Posidonia oceanica* végétant encore
au fond de la mer ; l'échantillon a été récolté
en 1874, dans la mer d'Eza près de Monaco.
Les souches brunes, luisantes, écailleuses du
Posidonia sont couvertes çà et là de périthèces
dimidiées, hémisphériques, noirs, à ostiole papilli-
forme ; les thèques et les sporidies sont très
développées ; ces dernières ont la forme des
Diplodia ; les périthèces croissent au milieu de
concrétions maritimes diverses, coraux, etc.

51^e GENRE. — **DELITSCHIA.** — *Auersw.*

1293. **DELITS. AUERSWALDII.** *Fuckel.* — Alb.
de l'Est. — Sur les crottes de lièvre. — Péri-
thèces à demi émergés, noirs, sphériques avec
un col épais plus ou moins proéminent ; thèques
amples ; sporidies brunes, grandes, biloculaires,

entourées d'un limbe muqueux. — Est accompagné par *Delitschia minuta*. — RR. — Sapinières de Soulanges. — Printemps.

1294. **DELITS. MINUTA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur la même station que la précédente espèce et possédant les mêmes caractères. -- Se distingue par ses dimensions trois fois plus petites ; sporidies des *Diplodia* entourées d'un limbe fugace.

52^e GENRE. — **OTTHIA.** — *Nits.*

1295. **OTTH. POPULINA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Populus nigra* et *pyramidalis*. — Pustules contenant de 15 à 20 périthèces globuleux, agglomérés ; thèques cylindriques ; paraphyses fugaces ; sporidies monostiques, didymes, brunes. — AC. — St-Amand, St-Lumier. — Printemps.

1296. **OTTH. BRUNAUDIANA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Ribes rubrum*. — Pustules de substance vert-noirâtre, renfermant de nombreux périthèces globuleux, noirs, érum-pents par une fente transversale de l'épiderme ; thèques cylindriques ; sporidies ovoïdes-oblongues, septées. — Espèce accompagnée souvent par *Diplodia ribis*. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

53^e GENRE. — **MELANCONIELLA.** — *Sacc.*

1297. **MEL^{la}. SPODIÆA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de *Carpinus betulus*. — Groupes

en cercles de périthèces sphériques, aplatis, thèques claviformes, octospores ; sporidies brun-clair, biloculaires, elliptiques, munies de deux grosses sporules et, à chaque extrémité, d'un court appendice incolore, hémisphérique. — RR. — Bois de Sermaize. — Automne.

54^e GENRE. **VALSARIA**. — *De Not.*

1298. **VALS. INSITIVA**. *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Rhamnus frangula* et de *Cytisus laburnum*. — Périthèces sous-cutanées, agglomérés sur un strôme noir, plus ou moins étendu ; thèques presque cylindriques, entourées de paraphyses ; sporidies monostiques, incolores puis brunes, biloculaires ; 2 gouttelettes ; l'état conidien *Coniothyrium insitivum*, croît sur le même strôme. — AC. — St-Amand, La Chaussée, etc. — Printemps.
1299. **VALS. CINCTA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Hêtre et de Frêne. — Pustules en disques, rangées en lignes, entr'ouvrant l'épiderme, renfermant des groupes de périthèces ovoïdes ; thèques cylindriques avec paraphyses ; sporidies brunes, elliptiques, biloculaires. — AC. — Bois. — St-Lumier, Aulnay. — Printemps. — *Melogramma rubricosa* de Plowright.
1300. **VALS. NIESSLII**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — sur écorce de *Betulus alba*. — Périthèces nombreux dans un strôme ovale, sous-cutané,

munis d'ostioles allongés, émergents ; thèques claviformes ou cylindriques ; sporidies biloculaires, incolores puis brunes. — AR. — St-Amand ; Cense des Prés. — Printemps.

SECT. VI. — **PHÆOPHRAGMIÈES.** — *Sacc.*

55^e GENRE. — **MASSARIA.** — *De Not.*

1301. **MASS. FÆDANS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les branches et rameaux d'*Ulmus campestris*. — Groupes de 6-8 périthèces sous-cutanés, sphériques, réunis en cercle, émettant au dehors des sporidies brunes qui tachent l'épiderme ; thèques très amples avec paraphyses continues ; sporidies pyriformes à 2 cloisons, brunes, entourées d'un limbe muqueux. — AC. — Bois. — Automne, printemps.
1302. **MASS. PUPULA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux secs d'*Acer pseudo-platanus*. — Périthèces épars, sous-cutanés, arrondis, aplatis. Thèques larges surtout au sommet ; sporidies brunes, oblongues-claviformes, à 3 cloisons ; limbe muqueux. — La conidie *Steganosporium pyriforme* l'accompagne. — AC. — Bois. — St-Amand. — Printemps.
1303. **MASS. INQUINANS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Acer campestris*. — Périthèces sous-cutanés, rejetant une masse de sporidies noires qui tachent l'épiderme comme les stylospores, thèques grandes avec paraphyses

filiformes ; sporidies à 3-6 cloisons, fusiformes, brunes. — CC. — Bois. — Hiver, printemps. — Très voisin de *Mass. gigaspora*.

1304. **MASS. ULMI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ulmus campestris*. — Périthèces sphériques, sous-cutanés ; thèques larges avec paraphyses ; sporidies distiques, fusoides, brunes, à 4 cloisons, plus petites que celles de *Mass. inquinans*. — CC. — St-Amand. — Bois. — Hiver.

1305. **MASS. FAGI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Fagus sylvatica*. — Périthèces faisant irruption au dehors par de petites fentes ; thèques allongées ; paraphyses muqueuses ; sporidies fusoides à 3 cloisons, brunes, entourées d'un limbe. — La conidie *Steganosporium fagi* habite le même support. — AC. — St-Amand, Aulnay. — Bois. — Printemps.

1306. **MASS. RUBI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments de *Rubus fruticosus*. — Périthèces sous-cutanés, épars ; thèques accompagnées de longues paraphyses ; sporidies brunes, fusiformes, à 5-6 cloisons et entourées d'un limbe. — RR. — St-Lumier. — Printemps.

1307. **MASS. VOMITARIA.** *B. et C.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce d'*Acer*. — Périthèces sphériques, sous-cutanés ; thèques amples avec paraphyses muqueuses ; sporidies brunes, pyriformes, 2 cloisons ; limbe apparent dans les jeunes sporidies. — Reims. — Communiqué par le Dr Jolicœur. — Hiver.

1308. **MASS. MACROSPORA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux de *Fagus sylvatica*. — Périthèces en groupes peu nombreux, sphériques, entourés de l'état conidien *Sporidesmium Vermiforme*; thèques et paraphyses d'égale grandeur; sporidies fusoïdes à 3 cloisons, incolores puis fuligineuses; limbe mucilagineux. — CC. surtout la Conidie. — Printemps. — Aulnay, St-Amand.

56^e GENRE. — **LEPTOSPHERIA.** — *Cés.*

1309. **LEPT. DOLIOLUM.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Angelica sylvestris*. — Périthèces épars, superficiels, noirs, entourés de la base au sommet de plis concentriques; thèques allongées; sporidies submonostiques, fusiformes, droites, à 3 cloisons; teinte jaunâtre. — CCC. — Bords des eaux. — Printemps.
1310. **LEPT. SUFFULTA.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges desséchés de *Melampyrum pratense*. — Groupes de périthèces conoïdes, à base aplatie avec plis concentriques; se rapproche de l'espèce précédente; thèques oblongues; paraphyses filiformes, continues; sporidies fusiformes à 3 cloisons, jaune-olive. — AR. — Bois de Sermaize. — Été.
1311. **LEPT. OLERICOLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Brassica oleracea*. — Périthèces irréguliers, difformes, noirs-luisants; thèques cylindriques; sporidies submonosti-

ques, fusiformes à 3 cloisons, jaunâtres ou café au lait étant mûres. — AC. — Jardins. — Accompagné par *Phoma lingam*.

1312. **LEPT. APARINES.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur tige de *Galium mollugo* et *aparines*. — Périthèces épars, sphériques, s'affaissant en cupules ; thèques cylindriques ; sporidies elliptiques allongées, à 3 cloisons un peu resserrées, jaunâtres. — AC. — Bords des bois. — Automne.

1313. **LEPT. ACONITI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Aconitum napel.* — Périthèces épars, sphériques ou conoïdes ; thèques en massue allongée inférieurement ; sporidies distiques, fusiformes, arquées, à 3 cloisons, olives ou brunes. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

1314. **LEPT. VAGABUNDA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Seseli montanum* et sur *Cornus sanguinea* ; — Périthèces épars, sous-cutanés ; thèques allongées ; paraphyses noduleuses ; sporidies brunes, fusoïdes-aiguës, à 3 cloisons. — AR. — St-Lumier, St-Amand. — Printemps.

1315. **LEPT. OGILVIENSIS.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Picris* et de *Senecio*. — Périthèces épars ; thèques en massue, allongées ; paraphyses simples, septées ; sporidies lancéolées, à 5 cloisons ; vert-d'eau clair. — AC. — St-Amand, Lisse. — Automne.

1316. **LEPT. MACULANS.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — A la base des tiges desséchées d'*Erysimum*

alliariae. — Périthèces sphériques, épars sur une tache noire qui entoure le support ; thèques en massue, allongées ; sporidies fusiformes-lancéolées à 5 cloisons, jaune-miel. — AC. — Le long des haies à St-Amand. — Printemps.

1317. **LEPT. MODESTA.** *Karsten.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges desséchées d'*Eupatorium* et d'*Achillæa millefolium*. — Périthèces épars, sous-cutanés, conoïdes ; thèques en massue ; sporidies distiques ; fusiformes-allongées, aiguës, à 5 cloisons ; cellule médiane noduleuse renflée. — CC. — St-Lumier, Soulanges. — Printemps.

1318. **LEPT. AGNITA.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Eupatorium cannabinum*. — Périthèces épars, sphériques, sous-cutanés ; thèques en massue ; sporidies fusiformes allongées, à 6 cloisons. — CC. — Bois. — St-Lumier, St-Amand. — Printemps.

1319. **LEPT. ACUTA.** *Karsten.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Urtica divica*. — Périthèces sous-cutanés puis libres, en forme de cônes aigus ; thèques en massue ; sporidies jaunâtres, fusiformes-allongées, à 6-10 cloisons. — CCC. — Jardins, haies. — Partout.

1320. **LEPT. EUSTOMA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Phragmites communis*. — Périthèces sous-cutanés, très petits, aplatis ; thèques amples, entourées de paraphyses ; sporidies fusoïdes, courbes, olivâtre-clair, à 3 cloisons. — C. — Printemps. — Aulnay, St-Amand.

1321. **LEPT. ARUNDINACEA.** *Sacc.* --- Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Phragmites communis*; — Groupes de 6 à 10 périthèces disposés à la base du chaume et près des nœuds, elliptiques; thèques en massue; sporidies droites, étroites, allongées, à 3 cloisons, jaune-miel. — CC. — Bords des eaux. — Partout. — Hiver-printemps.
1322. **LEPT. TYPHARUM.** *Karsten.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes de *Typha latifolia*. — Périthèces épars, cachés dans le parenchyme; ostiole à peine visible au dehors; thèques cylindriques ou en massue; sporidies un peu jaunâtres, fusoides à 3 cloisons. — CC. — St-Lumier, Soulanges, etc. — Printemps.
1324. **LEPT. JUNCINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Juncus conglomeratus*. — Périthèces sous-cutanés, ronds, aplatis, disposés en lignes; thèques courtes, renflées; sporidies fusoides à 3 cloisons; loge médiane plus large. — AC. — Lieux marécageux. — St-Amand. Lisse. — Été.
1324. **LEPT. NIGRANS.** *Cés.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et gaines de *Dactylis glomerata* — Périthèces sous-cutanés, distincts, hémisphériques, entourés de filaments bruns rampants; thèques renfermant 8 sporidies distiques, fusoides, allongées, jaunâtres, à 5 cloisons, l'avant-dernière loge renflée. — CC. — Bois. — St-Amand. — Printemps.
1325. **LEPT. RUSCI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et rameaux de *Ruscus aculeatus*.

— Périthèces épars ; thèques claviformes ; paraphyses de même grandeur ; sporidies distiques, elliptiques-oblongues, à 3 cloisons ; jaune-miel. — AR. — Bois de Sermaize. — Automne.

1326. **LEPT. CULMIFRAGA.** Cés. — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Bromus asper*. — Périthèces disposés en lignes, à demi émergés ; thèques allongées ; sporidies distiques, fusoïdes, longues, à 6-8 cloisons, jaune-citron. — AC. — Printemps. — Bois de St-Amand à St-Lumier.

1327. **LEPT. RIPARIA.** Sacc. — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Juncus communis*. — Périthèces sous-cutanés, en groupes épars ; thèques ovoïdes entourées de paraphyses pleines de gouttelettes ; sporidies fusoïdes oblongues, un peu courbes, à 5 cloisons ; jaune-verdâtre. — AR. — Entre St-Amand et Lisse. — Automne.

1328. **LEPT. PLANIUSCULA.** Cés. — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Solidago-virga aurea*. — Périthèces disposés en lignes, ronds, aplatis ; thèques en massue allongée ; sporidies brun-pâle, fusoïdes, courbes, à 5 cloisons. — AR. — Entre St-Amand et Aulnay. — Printemps.

1329. **LEPT. STELLARIÆ.** Ch. R. — Alb. de l'Est. — Sur les tiges anciennes de *Stellaria media* mélangées aux tiges vivantes. — Périthèces sphériques, noirs, un peu aplatis, épars ; thèques en massue ; paraphyses filiformes, très longues ; sporidies fusiformes, allongées, aiguës à 3 cloisons, faiblement jaunâtres. — AR. — St-Amand. — Printemps.

1330. **LEPT. BERBERIDIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes rameaux de *Berberis vulgaris* vivants. — Périthèces situés près des fascicules d'épines, épars, sous-cutanés, aplatis lenticulaires; thèques claviformes enveloppées par les paraphyses; sporidies fusoïdes-oblongues, à 3 cloisons, olive-clair. — AR. — Récolté dans mon jardin. — St-Amand. — Printemps.

1331. **LEPT. LEMOINII.** *Ch. R.* — *Leptosphaerites*. Bull. Soc. bot. de Fr. 1880. — Cette sphériacée, l'un des plus anciens représentants de la mycologie, a été trouvée dans les environs de Reims par le Dr Lemoine qui me l'a communiquée pour en faire l'analyse. J'ai constaté son habitat sur une *Monocotyledonnée!* de l'époque tertiaire, incrustée dans un fragment d'argile à lignite dont j'ai soulevé avec soin les lamelles pour le mettre à jour; je l'ai nommé alors *Leptosphaerites* à cause de sa station spéciale; l'examen microscopique m'a donné la preuve la plus évidente de la conservation intacte de ses organes de reproduction. — Périthèces noirs, hémisphériques, à ostiole court, renfermant des sporidies fusoïdes, brunes, un peu courbes, à 3 cloisons; *Spermogonies* avec spermaties (bâtonnets) disposées en chapelet.

Quand je fis hommage de ce précieux spécimen au Museum, lors de la Session mycologique de 1887, M. le professeur Bureau reconnut que notre espèce, dont les organes de reproduction s'étaient si bien conservés, était un

témoignage frappant de la grande vitalité des sporidies capables de résister à la destruction après tant de siècles écoulés et que, malgré son ancienneté, une place devait lui être réservée dans le Genre d'espèces vivantes *Leptosphaeria* que nous adoptons aujourd'hui.

57^e GENRE. — **CLYPEOSPHAERIA**. — *Fuckel*.

1332. **CLYP. NOTARISII**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est.

— Sur sarments de *Rubus fruticosus*. — Périthèces sous-cutanés; ostiole peu saillant entouré d'une tache noire en forme de disque ou de bouclier; thèques cylindriques; paraphyses filiformes; sporidies brunes, lancéolées-oblongues, courbes, à 3 cloisons.

Var. Robiniae. *Ch. R.* — Disque moins apparent; sporidies plus petites. — **AR.** — St-Lumier, St-Amand. — Automne.

58^e GENRE. — **CHAETOSPHAERIA**. — *Tul.*

1333. **CHÆT. PHÆOSTROMA**. *Fuckel*. — Alb. de

l'Est. — Récolté sur une planche depuis longtemps placée dans une cave. — Groupe peu nombreux de Périthèces petits, noirs, astomes, entourés de poils à la base; thèques en massue renflée, fugaces; paraphyses simples; sporidies elliptiques-oblongues à 3 cloisons, les deux loges médianes brunes, les deux extrêmes hyalines. — **RR.** — St-Amand. — Hiver.

1334. **CHÆT. CALLIMORPHA**. *Sacc.* — Alb. de

l'Est. — Sur sarments de *Rubus*. — Périthèces

très petits, sphériques, au milieu d'un coussinet noirâtre de poils rigides ; thèques claviformes ; sporidies fusoïdes, munies de 3 cloisons et de 4 gouttelettes, à peine teintées. — RR. — St-Amand. — Hiver.

59^e GENRE. — **MELANOMMA**. — *Nits*.

1335. **MELAN. PULVISPYRIUS**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Corylus avellana*. — Groupes très nombreux de périthèces petits, sphériques, noirs, ressemblant à des grains de poudre ; thèques cylindriques ; sporidies légèrement teintées, oblongues, monostiques à 3 cloisons. — AC. — St-Amand, Soulanges, etc. — Printemps.

1336. **MEL. VILE**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur écailles de Noyer. — Périthèces plus petits que dans l'espèce précédente, épars ; thèques cylindriques ; paraphyses filiformes, bifurquées au sommet ; sporidies brun-clair, oblongues à 3 cloisons. — R. — St-Amand. — Printemps.

60^e GENRE. — **TREMATOSPHERIA**. — *Fuckel*.

1337. **TREM. FRAXINI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de *Fraxinus excelsior*. — Périthèces incrustés dans le bois, noirs. sphériques ; ostioles courts, conoïdes ; thèques en massue terminées par un long pédicelle ; paraphyses simples ; sporidies oblongues-cylindriques, courbées, brun-clair, à 5-6 cloisons, dis-

tiques, noircissant l'épiderme autour de l'ostiole.
— Bois de St-Amand. — RR. — Printemps.

61^e GENRE. — **SPORORMIA**. — *De Not.*

1338. **SPOR. INTERMEDIA**. *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Récolté sur tige d'*Allium cœpa*, dans le voisinage du fumier de cheval. — Périthèces sphériques, superficiels, noirs; thèques subcylindriques; sporidies distiques, parallèles, composées de 4 articles brun-verdâtre qui se désagrègent facilement. — AR. — St-Amand. — Été.

1339. **SPOR. OVINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur crottes de brebis. — Périthèces petits, à demi émergés: ostiole conique; thèques subcylindriques entourées de paraphyses ténues; sporidies distiques, à 4 segments, brun-verdâtre. — CC. — Champs, pâturages. — St-Amand. — Automne.

62^e GENRE. — **AGLAOSPORA**. — *De Not.*

1340. **AGL. PROFUSA**. *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Robinia*. — Pustules elliptiques, contenant 2 à 5 périthèces circonscrits à la base par une ligne noire; thèques cylindriques à 4 sporidies brunes, elliptiques oblongues, droites, à 3 cloisons et 4 grosses spores. — CC. — Jardins. — Printemps.

63^e GENRE. — **PSEUDOVALSA**. — *Cés.*

1341. **PS. VALS. LANCIFORMIS**. *Cés.* — Alb. de

l'Est. — Sur branches et rameaux de *Betulus alba*. — Pustules verdâtres, tronquées au sommet, contenant 3-6 périthèces ; thèques cylindriques ; sporidies brunes, obtuses, à 5 cloisons ; paraphyses fugaces, longues. — CC. — Bois, haies. — St-Amand. — Printemps.

1342. **PS. VALS. BERKELEYI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux d'*Ulmus campestris*. — Périthèces disposés en cercles sous l'épiderme ; thèques oblongues ; sporidies brunes, distiques, elliptiques-oblongues, à 3 cloisons, munies à chaque extrémité d'un appendice hyalin assez long, recourbé. — AR. — Soulanges, St-Amand. — Printemps.

1343. **PS. VALS. AUCTA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces 5-6 en cercles, à cols convergents ; thèques oblongues - ovales, sessiles ; paraphyses fugaces ; sporidies elliptiques - oblongues, brun-clair, à cloison et plusieurs gouttelettes ; appendices très courts aux extrémités. — AR. — St-Amand. — Printemps.

1344. **PS. VALS. HAPALOCYSTIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de Platane. — Pustules hémisphériques, renfermant 5-6 périthèces à ostioles courts ; thèques ovales ; sporidies agglomérées, brunes, elliptiques à 2 cloisons, terminées par deux appendices hyalins en forme de coin. — RR. — Ablancourt. — Jardins. — Hiver.

1345. **PS. VALS. KICKXII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.

— Sur rameaux de Platane oriental. — Périthèces disposés en cercles comme ceux des *Valsa* ; thèques amples, courtes, contenant 4 sporidies fuligineuses, elliptiques-allongées, à 5 cloisons. munies à chaque extrémité d'un assez long appendice, cylindrique, hyalin. — AR. — Ablancourt. — Jardin du château. — Hiver.

64^e GENRE. — **THYRIDARIA.** — *Sacc.*

1346. **THYR. INCRUSTANS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Sumac amaranthe*. — Périthèces nombreux, agglomérés en pustules ; ostioles larges, noirs, saillants, entourés d'un cercle rouge foncé tomenteux ; thèques cylindriques, paraphyses nombreuses ; sporidies monostiques, brunes, oblongues, à 3 cloisons un peu resserrées. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

1347. **THYR. AILANTHI.** *Rehm.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ailanthus glandulosa*. — Périthèces 8-10 rouge-brun, plongés dans un strôme valsiforme, brunâtre, tomenteux ou brun-rouge. Thèques cylindriques ; sporidies brunes, oblongues, à 3 cloisons. — La Pycnide *Coniothyrium ailanthi* l'accompagne. — RR. — Jardin du château d'Ablancourt. — Printemps.

65^e GENRE. — **MELOGRAMMA.** — *Tul.*

1348. **MELOG. VAGANS.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et troncs de *Carpinus betulus*.

— Périthèces 10-15, réunis dans des pustules rondes, aplaties, disposées en lignes ; ostioles courts, saillants ; thèques en massue ; sporidies distiques, fusiformes, étroites, courbes, à 3 cloisons et à 4 sporules. — CC. Dans les forêts et les haies de charmille. — Hiver.

SECT. VII. — **HYALOPHRAGMIEES.** — *Sacc.*

66^e GENRE. — **MASSARINA.** — *Sacc.*

1349. **MASS. EBURNEA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de Platane. — Périthèces sous-cutanés, épars, hémisphériques ; thèques claviformes ; sporidies incolores, oblongues-fusoïdes, uniseptées, resserrées à la cloison, 4 sporules, entourées d'un limbe muqueux ; paraphyses sinueuses. — AR. — Ablancourt, Vitry-la-Ville. — Automne, printemps.
1350. **MASS. CORNI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Cornus sanguinea*. — Périthèces épars, sous-cutanés ; thèques amples entourées de paraphyses sinueuses. indécises ; sporidies distinctes, à 3 cloisons, 4 gouttelettes oblongues-fusoïdes ; limbe peu apparent. — AC. — St-Amand. — Printemps.
1351. **METAS. OCELIATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Hypericum perforatum*. — Périthèces sous-cutanés, brunissant l'épiderme ; thèques claviformes entourées de paraphyses

simples, courtes ; sporidies sub-monostiques fusoides, 2 septées, resserrées aux cloisons, à 3 gouttelettes. — AR. — Printemps. — St-Lumier. St-Amand.

1352. **METAS. SÆPINCOLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Rosa canina*. — Périthèces épars, sous-cutanés ; thèques cylindriques ; sporidies elliptiques-oblongues, monostiques, 3-4 septées. — CC. — Dans les haies et broussailles. — St-Amand, etc. — Automne.

1353. **METAS. CORTICOLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Prunus domesticus*. — Périthèces sous-cutanés ; thèques cylindriques, 3-4 septées, elliptiques-oblongues, présentant quelquefois une cloison longitudinale. — AR. — St-Amand, Aulnay. — Automne.

1354. **METAS. CINEREA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Salix capræa*, près des bourgeons. — Thèques cylindriques ; sporidies monostiques, 4 septées, déprimées vers le centre. AR. — St-Amand. — Printemps.

1355. **METAS. VINCÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Vinca major*. — Périthèces épars, entourant la tige, sous-cutanés ; thèques claviformes ; sporidies fusoides, un peu courbes, étroites, aiguës, à 3 cloisons. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

1356. **METAS. COCCODES.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Phragmites communis*. — Pustules grisâtres, allongées, disposées en ligne, renfermant de 5 à 15 périthèces à nucleus

blanc ; thèques claviformes ; paraphyses simples ; sporidies distiques, fusiformes, à 3 cloisons. — AC. — St-Amand. — Printemps.

1357. **METAS. GEI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Geum urbanum* desséchées. — Périthèces sous-cutanés, épars ; thèques claviformes ou cylindriques ; paraphyses septées ; sporidies mono-distiques, fusoïdes, chloro-hyales, à 3 cloisons. — AR. — St-Amand, St-Lumier. — Printemps.

68^e GENRE. — **CERIOSPORA.** — *Niessl.*

1358. **CERIOSP. XANTHA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments de *Clematis vitalba*. — Périthèces nichés dans l'écorce, à demi erumpents, groupés pyriformes, à cols allongés ; thèques cylindriques ; sporidies distiques, fusoïdes, un peu teintées jaunâtres en vieillissant, courbes, uniseptées, resserrées à la cloison, munies à chaque extrémité d'un appendice hyalin, filiforme. — AR. — Soulanges, St-Amand. — Printemps.

69^e GENRE. — **SPHÆRULINA.** — *Sacc.*

1359. **SPH^{na}. INTERMIXTA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Rosa canina*. — Périthèces épars, sous-cutanés, noircissant l'épiderme, sous forme de petits disques luisants ; thèques sans paraphyses, ovales-oblongues, disposées en rosette ; sporidies pyriformes, à 3-4 cloisons. hyalines.

Var. Corni. Sur rameaux de *Cornus sanguinea*.
— Thèques et sporidies plus développées que celles du type. — AC. — St-Amand, Aulnay.
— Printemps.

70^e GENRE. — **HYPOSPILA.** — *Fries.*

1360. **HYP. PUSTULA.** *Karsten.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles mortes de Chêne. — Périthèces brun-clair, amphigènes, formant des pustules coniques sous-épidermiques; Thèques claviformes; sporidies distiques, fusoides, incolores, à 3 cloisons et à 2-4 sporules. — AC. — Automne, printemps. — Bois de St-Amand.

71^e GENRE. — **LASIOSPHÆRIA.** — *Cés.*

1361. **LASIOSPH. RHACODIUM.** *Cés.* — Alb. de l'Est. — Sur écaillés de bois pourri. — Périthèces superficiels, ovoïdes, noirs, couverts de poils concolores dressés, placés sur un subiculum de poils bruns, longs, rampants, partant de la base du périthèce; thèques cylindriques, sporidies vermiculaires, munies de 6-8 cloisons et gouttelettes. — CC. — Lieux humides des bois et jardins. — Printemps.
1362. **LASIOSPH. SPERMROIDES.** *Cés.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs et bois pourrissants. — Périthèces simples, ovoïdes, glabrescents, groupés, noirs; ostiole papilliforme; thèques cylindriques; sporidies monostiques, botuliformes. — CCC. — Partout. — Automne, printemps.

1363. **LASIOSPH. CAUDATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de Pin sylvestre. — Périthèces ovales ou pyriformes, noirs, couverts de poils très courts. — La conidie *Fuckelina microspora* les accompagne et forme un subiculum noir autour d'eux ; thèques cylindriques ; sporidies sub-fusiformes , un peu courbes. — AR. — St-Amand. — Printemps.
1364. **LASIOSPH. CRINITA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois humides tournées vers le sol. — Les Périthèces sont sphériques, couverts de poils noirs, courts, raides ; ils croissent aussi dans le voisinage du support et constituent la Var. *Terrestris* ; thèques cylindriques ; sporidies vermiculaires à 5-6 gouttelettes. — CC. — Partout.
1365. **LASIOSPH. SULFURELLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles pourrissantes de Peuplier. — Périthèces ovoïdes ou coniques , recouverts d'un duvet de filaments jaune-soufre ; ostiole noir oblique ; thèques cylindriques ; paraphyses simples ; sporidies vermiculaires, munies d'appendices filiformes aux deux extrémités. — RR. — Bois entre St-Lumier et St-Amand. — Été.
1366. **LASIOSPH. OVINA.** *Cés.* — Alb. de l'Est. — Sur les bois pourris, humides. — Périthèces groupées, ovoïdes, couverts d'un duvet blanc d'où émerge un ostiole noir , court. Thèques cylindriques ; sporidies distiques, vermiculaires. — CC. — Automne, printemps. — Partout.

72^e GENRE. — **ENCHNOSPILÆRIA**. — *Fuckel*.

1367. **ENCHN. PINETORUM**. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de Pin sylvestre. — Périthèces coniques ou pyriformes, noirs, superficiels, couverts de poils courts, rigides; thèques cylindriques; sporidies fusiformes, étroites, jaunâtres, à 3 cloisons. — Diffère beaucoup de *Lasio-sph. caudata* qu'elle accompagne souvent. — RR. — St-Amand. — Bois. — Automne.

73^e GENRE. **MELOMASTIA**. — *Nits.*

1368. **MELOM. FRIESII**. *Nits.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Fraxinus* et de *Hedera helix*. — Périthèces épars, base incrustée dans le bois, sommet conique, noir, luisant; thèques cylindriques; paraphyses filiformes; sporidies monostiques, oblongues, à 2 cloisons. — CC. — Automne, printemps. — Partout.

74^e GENRE. — **ZIGNOELLA**. — *Sacc.*

1369. **ZIGN. OVOIDEA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois dénudé des branches de *Corylus avellana*. — Périthèces ovoïdes ou coniques, épars; thèques claviformes entourées de paraphyses; sporidies fusiformes, distiques, à 3 cloisons et 4 sporules incolores. — AR. — Automne. — St-Amand.

75^e GENRE. **CERATOSPHERIA.** — *Niessl.*

1370. **CERAT. LAMPADOPHORA.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur racines et troncs pourris d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces groupées, à demi incrustés dans le bois, la partie supérieure amincie en un long col flexueux ; thèques allongées ; sporidies fusoïdes, étroites, longues, aiguës aux deux extrémités, à 8-10 cloisons, incolores. — CC. — Bois de St-Amand. — Automne, Printemps.
-

SECT. VIII. — **DICTYOSPORÉES.** — *Sacc.*

76^e GENRE. — **PLEOMASSARIA.** — *Speg.*

1371. **PLEOM. SIPARIÆ.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Betula alba*. — Périthèces sous-cutanées, épars, arrondis-déprimés, tomenteux ; thèques simples, paraphyses sinueuses ; sporidies brunes, distiques, oblongues, à 5-7 cloisons-murales. entourées d'un cercle mucilagineux. — La pycnide est le *Prosthemium betulinum*. — CC. — Bois de St-Lumier, St-Amand. — Automne.

77^e GENRE. — **PLEOSPORA.** — *Rab.*

1372. **PLEOSP. VULGARIS.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Euphorbia Gerardiana*. — Périthèces épars, sous-cutanés, hémisphériques

puis affaîssés ; thèques claviformes ; paraphyses simples ; sporidies murales, distiques, à 5 cloisons transversales et une longitudinale jaune-citron. — AR. — Chemin de St-Amand à Dampierre-sur-Moivre. — Automne.

1373. **PLEOSP. MEDIA.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Scabieuse* des jardins. — Périthèces épars, déprimés, bruns, noirâtres ; thèques amples ; sporidies jaune-d'or, ellipsoïdes-ovales, murales, à 3-5 cloisons transversales et une longitudinale ; paraphyses septées. — AC. — Printemps.

1374. **PLEOSP. HERBARUM.** *Rabh.* — Alb. de l'Est. — Sur les plantes herbacées, notamment *Asparagus officinalis*. — Périthèces épars, sous-cutanés, aplatis ; thèques amples ; sporidies monostiques ou distiques, jaune-d'or, murales, 7 cloisons transversales et 2 longitudinales. — La Spermogonie est le *Phoma herbarum*. — CCC. — Partout.

1375. **PLEOSP. LEGUMINUM.** *Raben.* — Alb. de l'Est. — Sur les gousses de *Vicia sativa*, *Phaseolus*, etc. — Périthèces épars, hémisphériques ; thèques larges, contenant de 6 à 8 sporidies jaune-miel, elliptiques-ovales, murales, 8 à 12 cloisons transversales et 3-4 longitudinales. — CC. — Jardins. — Partout.

1376. **PLEOSP. SYRINGÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur la face inférieure des feuilles de *Syringa vulgaris*. — Périthèces épars, hémisphériques ; thèques amples ; sporidies ovales-

oblongues, obtuses, murales, sub-monostiques, jaunes. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

1377. **PLEOSP. SAMARÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les samares d'*Acer platanoides*. — Périthèces peu nombreux, épars, hémisphériques. Thèques amples; sporidies ovales, grandes, murales, jaune-d'or. — CC. — Bois de St-Amand. — Printemps.

1378. **PLEOSP. SOCIALIS.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur scape d'*Allium vineale*. — Périthèces sous-cutanées, épars; thèques cylindriques; sporidies sub-monostiques à 5 cloisons transversales et une longitudinale jaunes, brunissantes, ellipsoïdes, oblongues; paraphyses très grandes. — AC. — Soulanges, St-Amand. — Été.

1379. **PLEOSP. INFECTORIA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes des graminées, du Seigle principalement. — Périthèces disposés en lignes parallèles, 5-6, globuleux; thèques cylindriques; sporidies murales, 5 cloisons transversales, ovoïdes-oblongues, jaune-d'or puis brunes. — CC. — Printemps, Été. — Champs. — Partout.

1380. **PLEOSP. VAGANS.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de Blé. — Périthèces hémisphériques, fibrilleux à la base; thèques cylindriques; sporidies fusoïdes, à 5 cloisons transversales et une longitudinale jaune-d'or. — AC. — Été.

1381. **PLEOSP. ALLII.** *Ces.* — Alb. de l'Est. —
Sur les tiges de l'*Allium cepa* et *porrum*. —
Périthèces épars, sphériques à ostiole conique ;
thèques amples ; paraphyses courtes, septées ;
sporidies murales, ovales, jaune-d'or ;
7 cloisons transversales et 4-5 longitudinales. —
CC. — Jardins. — Printemps.
1382. **PLEOSP. JUNCII.** *Pass.* — Alb. de l'Est. —
Sur chaumes de *Juncus communis*. — Périthèces
épars, sphériques ; thèques amples ;
paraphyses noduleuses, septées ; sporidies elliptiques,
amincies aux extrémités, murales, resserrées au milieu ;
7-8 cloisons ; brunes puis opaques. — AR. — Bords des ruisseaux de
Lisse à Saint-Amand. — Hiver.

78^e GENRE. — **PYRENOPHORA.** — *Fries.*

1383. **PYREN. RELICINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les chaumes du Seigle après l'hiver. —
Périthèces éruptives, hémisphériques, surmontés de quelques poils noirs, septés, dressés ;
thèques amples ; sporidies elliptiques-oblongues,
jaune-miel, à 3 cloisons entourées d'un cercle
muqueux. La conidie *Vermicularia relicina*
l'accompagne souvent. — CC. — Printemps.
1384. **PYREN. PELLITA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les tiges mortes de *Papaver somniferum*
envahi déjà par l'état conidien *Brachycladium*
penicillatum. — Périthèces globuleux,
munis de quelques poils, placés au milieu d'un
coussinet formé par la conidie. Thèques cylin-

driques ; paraphyses bifurquées au sommet ; sporidies monostiques, ovoïdes ou fusoïdes, à 3 cloisons transversales et une longitudinale. Vert-d'eau clair, puis brunes. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

79^e GENRE. — **CAPRONIA**. — *Sacc.*

1385. **CAPR. JUNIPERI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Bull. Soc. Bot. de Fr. 188. spec. nov. — Récolté sur branches et racines dénudées de *Juniperus communis* jonchant la terre, dans les bois de Pins entre Aulnay et Soulanges. — Printemps. — Périthèces épars, ovales ou hémisphériques, noirs, hispides, très petits, munis à la base de filaments bruns, septés ; thèques larges, ovales, contenant 16 spores murales, brun-clair, à 3 cloisons transversales et 2 longitudinales ovoïdes. — Diffère de *Cap. sexdecemspora* par le nombre des cloisons des spores et par la station.

80^e GENRE. — **TEICHOSPORA**. — *Fuckel.*

1386. **TEICH. TAPHRINA**. *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameau dénudé de Peuplier. — Périthèces épars, glabres, base incrustée dans le bois, sommet hémisphérique, thèques cylindriques ; sporidies oblongues-ovales, jaune-miel puis brunes. — AR. — Bois de St-Amand. — Printemps.
1387. **TEICH. ORDUCENS**. *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur *Fraxinus*, dans les cicatrices des

rameaux tombés à terre. — Périthèces groupés, superficiels ovoïdes noirs, glabres ; thèques cylindriques ; paraphyses filiformes ; sporidies ellipsoïdes, à 5-7 cloisons transversales et une longitudinale. Jaune-foncé puis brunes. — CC. — Bois de Lisse, St-Amand, etc. — Automne, printemps.

81^e GENRE. — **PLEOSPHERIA**. — *Speg.*

1388. **PLEOSPH. PILOSELLA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Pinus sylvestris*, dans les sinus formés par les insectes. — Périthèces ovoïdes, noirs, épars, couverts de poils hispides ; thèques très amples ; sporidies ovoïdes-oblongues, murales, 8-10 cloisons transversales vert-glaucue puis brunes. — AR. — Soulanges. — Printemps.

82^e GENRE. — **RHAMPHORIA**. — *Niessl.*

1389. **RAMPH. BUXI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Bull. Soc. bot. de Fr. 1887. — Sur tige morte de *Buxus*, dans les fentes de l'écorce. — Périthèces groupés distincts, noirs, glabres, sphériques, surmontés d'un long col flexueux ou dressé ; sporidies elliptiques, murales à 3 cloisons transversales brun-clair. — RR. — St-Amand. — Jardins. — Automne.

83^e GENRE. — **CUCURBITARIA**. — *Gray's.*

1390. **CUCURB. BERBERIDIS**. *Gray's.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de *Berberis*

vulgaris. Périthèces groupées dans les tentes de l'écorce, sphériques ridées, s'ouvrant en étoile au sommet; thèques cylindriques; sporidies sub-monostiques, ellipsoïdes, resserrées au milieu, à 8-9 cloisons murales, jaunes puis brunes. — CC. — Jardins. — Printemps. — Partout.

1391. **CUCURB. LABURNI.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Cytisus laburnum*. — Périthèces globuleux, rugueux, noirs, réunis en un strôme compact; thèques cylindriques; sporidies elliptiques, fusoïdes, à 5-7 cloisons murales, monostiques, jaunes puis brunes. — CCC. — Jardins. — Automne, printemps.

1392. **CUCURB. ELONGATA.** *Grev.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Robinia pseudacacia*. — Périthèces noirs, globuleux, cespiteux, sur un strôme noir, étendu; thèques cylindriques; sporidies monostiques, ovales-oblongues, brunes murales à 5-7 cloisons. — CCC. — Jardins. — Printemps.

1393. **CUCURB. ULMICOLA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ulmus campestris*. — Groupes de 5-6 périthèces globuleux, noirs, rugueux entourés par l'épiderme; thèques cylindriques; paraphyses muqueuses; sporidies sub-monostiques, elliptiques, resserrées au milieu à 8-10 cloisons murales, jaune-miel puis brunes. — La conidie *Sporodesmium ulmicolum* l'accompagne. — AR. — St-Amand, Aulnay, etc. — Printemps.

1394. **CUCURB. COLUTEÆ.** *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Colutea arborescens*. — Périthèces globuleux, noirs, cespiteux ; thèques cylindriques ; sporidies jaunes puis brunes, à 5 cloisons transversales et une longitudinale. CC. — Jardins, printemps.
1395. **CUCURB. CORONILLÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Coronilla Emerus*. — Considéré par Fuckel comme une variété de *Cucurb. Elongata*. — AC. — Jardins.
1396. **CUCURB. RHAMNI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de *Rhamnus frangula*. — Périthèces agrégés 6-8 sur un strôme noir ; thèques cylindriques entourées de paraphyses sporidies ovoïdes-oblongues, à 5-6 cloisons murales, brun - clair ; la partie inférieure n'a qu'une seule cloison souvent incolore. — R. — La Chaussée, dans les haies. — Printemps.
1397. **CUCURB. NAUCOSA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ulmus campestris*. — Périthèces sous-cutanés, astômes, peu nombreux ; thèques cylindriques ; sporidies ovoïdes-oblongues, à 4-5 cloisons murales, jaunes puis brunes. — AR. — St-Amand. — Printemps. — Sur le même support j'ai récolté la pycnide *Diplodia Ulmi*, le *Camarosporium cruciatum* macrostyplospore et la conidie *Sporidesmium Ulmicolum*.
1398. **CUCURB. ROSÆ.** *Wint.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Rosa canina*. — Périthèces globuleux ; noirs, rugueux, placés sur un strôme étendu, noirâtre ; thèques cylindriques ; spori-

dies oblongues-fusoïdes, monostiques à 3-4 cloisons transversales et 1 longitudinale olive-clair. — AR. — Lisse. — St-Amand. — Hiver.

1399. **CUCURB. MAHONIAE.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Mahonia aquilifolium* déjà envahis par *Diaporthe crassiuscula*. — Périthèces groupés sous l'épiderme déchiré et placés sur un strôme noir, étendu, sphériques, tuberculeux. Thèques cylindriques; sporidies jaunes puis brunes, ovales-oblongues, resserrées au milieu, à 6-8 cloisons murales. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Hiver.

1400. **CUCURB. STAPHYLEAE.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Staphylea primata*. — Tubercules sous-cutanés, arrondis ou allongés, renfermant de 5 à 10 périthèces disposés en cercles ou en lignes; thèques cylindriques entourées de paraphyses simples, très longues; sporidies monostiques, ellipsoïdes, incolores puis brunes, à 5 cloisons transversales et 1 longitudinale. Les mêmes périthèces contiennent aussi une forme spermogonienne à basides arborescentes portant des petites spermaties (*Dendrophoma*). — RR. — St-Amand. — Jardins. — Hiver.

1401. **CUCURB. RIBIS.** *Niessl.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Ribes rubrum*. — Périthèces noirs, sub-sphériques, puis déprimés, réunis en groupes sous l'épiderme déchiré; thèques cylindriques; sporidies monostiques, ovales, brunes, olivâtres, murales à 5 cloisons

transversales et 1-2 longitudinales. — St-Amand — Jardins. — Printemps.

1402. **CUCURB. SPARTII.** Cés. — Alb. de l'Est. — Sur tiges et rameaux de *Sarothamnus scoparius*. — Périthèces sphériques, épars ou disposés en lignes et placés sur un strôme noir, mince; thèques cylindriques entourées de paraphyses sinueuses; sporidies monostiques, brunes, murales, à 3-5 cloisons transversales, resserrées au milieu. — AR. — Prés d'Epernay, sur la lisière de la forêt. — Automne.

84^e GENRE. — **THYRIDIUM.** — Sacc.

1403. **THYR. PHILADELPHI.** Ch. R. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Philadelphus coronarius*. — L'épiderme soulevé laisse voir les périthèces agglomérés, sub-astomes, s'affaissant en cupule, réunis dans un strôme brun, mince, ellipsoïde, byssoïde; thèques cylindriques; sporidies monostiques, elliptiques, murales, à 5-7 cloisons transversales et une longitudinale. — Le *Camarosporium macrosporum* de Berk. l'accompagne. — R. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

85^e GENRE. — **FENESTELLA.** — Tul.

1404. **FENEST. PRINCEPS.** Tul. — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Betula alba*, *Alnus glutinosa*, *Carpinus*. — Périthèces réunis en pustules valseiformes; thèques amples, claviformes; sporidies distiques, jaunes puis brunes, elliptiques, amin-

cies aux deux extrémités enfin munies de deux apicules hyalins, à 3 cloisons principales et de nombreuses cloisons intermédiaires transversales et longitudinales. — AC. — St-Amand, St-Lumier. — Printemps.

1405. **FENEST. MACROSPORA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux secs de *Corylus* et de *Fagus*. — Périthèces réunis en un strôme valsiforme, logé dans l'écorce ; thèques cylindriques ; sporidies sub-monostiques, jaunes puis brunes. elliptiques-oblongues, murales, didymes par une cloison médiane très accentuée, terminées par un mucron très court. — R. — Communiqué par le Dr Jolicœur de Reims. — Automne.

1406. **FENEST. VESTITA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Ribes aureum* et de *Juglans regia*. — Périthèces 10-15 disposés en cercles ; ostioles réunis en disque tronqué ; thèques cylindriques ; sporidies monostiques, elliptiques, murales, à 5 cloisons transversales brunes, verdâtres. — AR. — St-Amand. — Printemps.

SECT. IX. — **SCOLECOSPORÉES.** — *Sacc.*

86^e GENRE. — **OPHIOBOLUS.** — *Riess.*

1407. **OPHIOB. PORPHYROGONUS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Angelica sylvestris*. — Périthèces sphériques puis déprimés, à ostiole conique, placés sur une tache de l'épiderme

rouge-pourpre ; thèques sub-cylindriques ; sporidies filiformes, incolores puis jaunâtres, remplies de gouttelettes. — CCC. — Bords des eaux. — St-Amand. — Printemps.

1408. **OPHIOB. ACUMINATUS.** *Duby.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes des *Carduus* et *Cirsium*. — Périthèces épars. ovoïdes, à ostiole conique, allongé, éruptent ; thèques cylindriques ; sporidies jaunâtres, filiformes. — CC. — Partout. — Printemps.

1409. **OPHIOB. HYPERICI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Hypericum perforatum*. — Périthèces épars, peu nombreux, petits ; ostiole conique ; thèques claviformes, amincies en pointe à la base ; sporidies hyalines, remplies de gouttelettes, filiformes. — AC. — St-Amand, St-Lumier. — Bois. — Printemps.

1410. **OPHIOB. ACONITI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Aconit napel*. — Périthèces rugueux, velus, roussâtres ; ostiole noir ; thèques cylindriques ; sporidies filiformes, jaunâtres. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

1411. **OPHIOB. CAMPTOSPORUS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Teucrium chamaedrys* desséchée. — Périthèces épars, à demi-émergés ; ostiole conique ; thèques claviformes ; sporidies baccillaires, très recourbées, septées-noduleuses avec renflement d'une cellule vers le milieu, jaunâtres. — AC. — St-Amand, Soulanges. — Printemps.

1412. **OPHIOB. EUSPORUS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Origanum vulgare*. — Périthèces épars, très petits ; ostiole court ; thèques claviformes ; sporidies baccillaires munies de 14 à 16 cloisons et sporules ; les deux cellules médianes sont renflées. — AC. — Le long des chemins. — Été, automne. — St-Amand, etc.
1413. **OPHIOB. AFFINIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tige de *Mentha rotundifolia*. — Périthèces épars, aplatis ; ostiole conique ; thèques claviformes ; sporidies baccillaires, à 5-6 cloisons ; la cloison médiane resserrée. — AC. — Aulnay-l'Aître, Lisse. — Printemps.
1414. **OPHIOB. FRUTICUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Ononis spinosa*. — Périthèces épars, sous-cutanés ; ostioles courts, éruptifs ; thèques sub-cylindriques ; sporidies baccillaires, jaunâtres, septées. — CC. — Le long des chemins herbus. — Soulanges. — Printemps.
1415. **OPHIOB. GRAMINIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Agrostis stolonifera*. — Périthèces presque superficiels, glabres, coniques, épars ; thèques cylindriques ; sporidies filiformes, remplies de gouttelettes. — AC. — Bords des champs humides. — Printemps.
1416. **OPHIOB. CULMORUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Phragmites communis*. — Périthèces ovoïdes, fuligineux, mous, incrustés dans une tache noire près du Rhizome ; thèques claviformes ; paraphyses rameuses au sommet ; spo-

ridies baccillaires, remplies de gouttelettes. — AR. — St-Lumier. — Fossés humides. — Automne.

1417. **OPHIOB. ENCRYPTUS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et gaines de *Carex glauca*. — Périthèces ovoïdes, nichés sous l'épiderme au milieu d'un feutrage de filaments bruns; ostiole très petit; thèques fusoides-allongées; sporidies linéaires-courbes, munies de gouttelettes; paraphyses très longues. — AR. entre St-Amand et Bassu. — Automne.

1418. **OPHIOB. GALII.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Galium mollugo*. — Périthèces sphériques, petits, épars, peu nombreux; thèques cylindriques renfermant des sporidies incolores, disposées en spirales, entre-croisées en forme de treillis. — Se rapproche d'*Ophio. helicosporus*. — R. — St-Amand. — Printemps.

1419. **OPHIOB. MELIOLÆOIDES.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Bull. Soc. Bot. de Fr. (pour mémoire). — Périthèces pyriformes, velus, grisâtres, à ostiole noir, entourés de faisceaux de filaments noirs, septés, dressés comme ceux des *Meliola*. Thèques cylindriques; sporidies filiformes, continues. — Cette espèce m'a été communiquée par le Dr Roussel qui l'avait reçue de M. Veillard botaniste à la Nouvelle-Calédonie.

1420. **OPHIOB. HERPOTRICHUS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de Seigle. — Périthèces ovales, couverts de longs poils bruns, septés, apprimés en descendant et rampants

ensuite sur le support ; thèques fusoïdes ; sporidies filiformes, remplies de gouttelettes. —

CC. — En Hiver et au Printemps. — Champs.

1421. **OPHIOB. CHÆTOPHORUS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Glyceria aquatica* et de *Carex*. — Périthèces ovoïdes, à large ostiole ; gris-noirâtres, mous, couverts de longs poils raides, septés, divergents ; thèques cylindriques ; sporidies filiformes, munies de gouttelettes. — AC. — Bords des eaux. — St-Amand. Lisse, etc. — Printemps, Automne.

87^e GENRE. — **LINOSPORA.** — *Fuckel.*

1422. **LINOSP. CAPREÆ.** — *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Salix capræa*. — Périthèces noirs, disposés en lignes le long des nervures, recouverts par de petites taches brunes de l'épiderme, rondes ou anguleuses, sorte de pseudo-strômes ; ostioles proéminents, allongés, recourbés ; thèques cylindriques, sporidies filiformes. — AC. — St-Amand. — Hiver-Printemps.

1423. **LINOSP. POPULINA.** *Schrot.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Populus tremula*. — Périthèces nichés dans le parenchyme, recouverts par des taches noires ou pseudo-strômes anguleux, aplatis, sub-astomes ; thèques cylindriques terminées en un pédicelle aminci ; sporidies filiformes. — AR. — Bois de St-Amand. — Printemps.

88^e GENRE. — **DILOPHIA**. — *Sacc.*

1424. **DILOPH. GRAMINIS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *graminées*. — Nous ne possédons que la pycnide *Dilophospora graminis* sur les épis de blé. — Bull. de la Soc. des Sc. de Vitry-le-François. — RR. — Mais a été très commun et nuisible aux céréales pendant trois années consécutives à St-Amand, St-Lumier, Lisse, etc. — Fin de l'Été. — Avant les moissons.

89^e GENRE. — **OPHIOCERAS**. — *Sacc.*

1425. **OPHIOC. CORNI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameau dénudé de *Cornus sanguinea*. — Périthèces groupés, peu nombreux, sphériques, noirs, surmontés d'un ostiole très long, flexueux; thèques cylindriques; sporidies filiformes, remplies de gouttelettes. — RR. — Trouvé une seule fois à Soulanges. — Bords du canal.

90^e GENRE. — **SILLIA**. — *Karsten.*

1426. **SILLIA. FERRUGINEA.** *Karsten.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Corylus avellana*. — Périthèces 15-20 réunis dans un strôme disciforme, entouré par l'épiderme de substance jaune-d'ocre, ferrugineuse; ces périthèces sont ovoïdes, à ostioles allongés, érumpents; thè-

ques fusiformes ; sporidies bacillaires, amincies aux extrémités, munies de 6-7 gouttelettes. — RR. — Ablancourt. — Printemps.

91^e GENRE. — **CRYPTOSPORA.** — Tul.

1427. **CRYPT. SUFFUSA.** Tul. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Alnus glutinosa*. — Périthèces 8-10 groupés en pustule sous l'épiderme, noirs, aplatis. Thèques en massue renflée, contenant 8 sporidies cylindriques, courbes, hyalines. La conidie est le *Cryptosporium Neesii*. — CC. — Dans les bois, au printemps. — St-Amand.
1428. **CRYPT. CORYLINA.** Fuckel. — Alb. de l'Est. — A la base des rameaux de *Corylus avellana*. — Périthèces 10-15 sphériques, surmontés de longs cols égaux, réunis en pustule. Thèques fusoides, aiguës aux extrémités ; sporidies linéaires, septées. — CC. — Bois, Jardins. — Hiver, printemps.
1429. **CRYPT. BETULÆ.** Tul. — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Betula alba*. — Périthèces réunis en cercle, 5-8 dans une pustule en strôme elliptique, cortical ; thèques en massue, amincies en pointe, tronquées au sommet ; sporidies baculiformes, continues, hyalines. — AC. — Bois de St-Amand. — Printemps.
1430. **CRYPT. QUERCUS.** Ch. R. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Quercus*. — Périthèces 4-6 réunis en cercle dans une pustule valsiforme, entourée par l'épiderme ; ostioles courts, érupents sur le disque ; thèques

cylindriques, obtuses, à 3-5 cloisons, incolores, granuleuses. — Des conidies grandes, brunes, pédicellées, à 5-6 cloisons (*Coryneum*), naissent sur le même support. — R. — Hiver. — St-Amand.

APPENDICE. — *Sacc.*

Sphériacées qui n'ont pu être introduites avec certitude dans la classification.

1431. **SPHÆRIA. RENIFORMIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Betula alba*. — Périthèces sous-cutanés, groupés mais distincts, hémisphériques puis aplatis, noirs, rugueux, à ostiole papilliforme ; théques (0,03) très petites, en massue tronquées au sommet, simulant les spores d'une hyménomycète, disposées en rosette, renfermant chacune 4-6 sporidies allantoides ou réniformes, continues, incolores ; sans paraphyses. — Les caractères de cette espèce lui assignent une place dans le Genre *Calosphaeria*, près de *Cal. minima*.

1432. **SPHÆRIA. DICHÆNOIDES.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tige morte et moussue de *Rosa canina*. — Périthèces agglomérés en groupes formant des taches rugueuses, noires. Ces périthèces sont elliptiques, aplatis supérieurement et munis d'une fissure longitudinale comme celle des *Hysteriacées*, placés sur un coussinet tomenteux, brun (*Alitosporium*) ;

thèques claviformes ; paraphyses simples ou peu rameuses ; sporidies elliptiques-oblongues, uni-cloisonnées, resserrées au milieu, incolores, renfermant 4 sporules, semblables à celles des *Diaporthe*. — RR. — Récolté en Automne, à St-Amand, dans les broussailles des bois de pins.

3^e FAM. **Hypocréacées**. — *De Not.*

Périthèces presque charnus, céracés, membraneux, la plupart de couleur rouge ; ostiole arrondi.

SECT. I. — **HYALOSPORÉES**. — *Sacc.*

1^{er} GENRE. — **NECTRIELLA**. — *Sacc.*

1433. **NECTR**^{lla}. **RESINÆ**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Bull. Soc. Bot. de Fr. 1882. — Sur la résine de *Pinus sylvestris*. — Périthèces ovoïdes, glabres, orangés. groupés 4-6, très petits ; Thèques en massue (0^{mm},066) ; sporidies distiques, elliptiques-oblongues, continues, incolores (0^{mm},011). — RR. — Bois de pins à St-Amand, Printemps. — Cette forme thécasporée n'avait jamais été observée ; la spermogonie (*Nectria Resinæ*. Fr.) *Phomopsis cucurbitula* ? *Sacc.* est extrêmement commune.

1434. **NECTR**^{lla}. **ROUSSELLIANA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Buxus sempervirens* mortes, exposées à l'humide. — Péri-

thèces globuleux, jaunes-orangés ou verdâtres, couverts au sommet et à la base de poils blancs ; thèques claviformes ou fusoïdes ; sporidies elliptiques, oblongues, continues, incolores. — L'état conidien *Volutella buxi* l'accompagne. — AR. — St-Amand, Bassuet. — Printemps.

2^e GENRE. — **ELEUTHÉROMYCÉS**. — *Fuckel*.

1435. **ELEUTHER. SUBULATUS**. *Fuckel*. — Jusqu'à présent nous ne possédons de cette espèce que la Spermogonie *Sphaeronema subulatum* et l'état conidien *Isaria brachiata*.

3^e GENRE. — **POLYSTIGMA**. — *Fuckel*.

1436. **POLYST. RUBRUM**. *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles mortes de *Prunus spinosa* après l'hiver. — Strômes orbiculaires ou taches brunes extérieurement, rougeâtres à l'intérieur, renfermant 8-10 périthèces ; thèques claviformes ; sporidies ovales, incolores, continues. — R. — St-Amand, Gravelines. — Printemps. — En Automne les strômes sont rouges-pourpres et contiennent les spermogonies, *Polystigmia rubra*.

SECT. II. — **PHÆOSPORÉES**. — *Sacc*.

4^e GENRE. — **MELANOSPORA**. — *Corda*.

1437. **MELAN. VERVECINA**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur morceau de bois pourri. — Péri-

thèces globuleux, bruns, mous. diaphanes, recouverts de filaments blancs issus d'un subiculum brun ; ostioles bruns, très longs, glabres, terminés par une houppe de filaments blancs qui retiennent les sporidies à leur sortie du col ; thèques larges-obovales ; sporidies brunes, distiques, ellipsoïdes-aiguës. — RR. — Printemps.

1438. **MELAN. CAPRINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Salix caprea*. — Périthèces réunis en petit groupe à la surface du bois dénudé, teinté rouge-pourpre, petits, globuleux, couverts de poils blanchâtres et munis d'un très long ostiole brun, dressé, laissant échapper les sporidies ; thèques indécises ; sporidies ellipsoïdes, brunes. — RR. — Bords de la Marne à La Chaussée. — Été.

1439. **MELAN. ZOBELII.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur le disque de *Peziza* (*Sepultaria*) *arenaria*. — Communiquée par mon ami Boudier. — Périthèces pyriformes, mous, noirâtres ; thèques obovales ; sporidies ellipsoïdes ou en amande, incolores puis brunes, distiques. — RRR. — Automne.

1440. **MELAN. VITRÆA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le chapeau d'un *Bolet* en décomposition. — Périthèces très nombreux, blancs-jaunâtres, globuleux, à ostiole allongé, formé de fibres longitudinales qui s'écartent en éventail au sommet ; les Périthèces sont remplis d'une masse de thèques cylindriques, sans paraphyses, con-

tenant chacune 8 sporidies monostiques, incolores, elliptiques. — RR. — Récolté à Sermaize, en Automne.

1441. **MELAN. PARASITICA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur la carapace d'un hanneton (*Melanolontha vulgaris*). — Périthèces globuleux, noirs, munis d'un long col flexueux brun, à demi enfouis dans un subiculum blanc-filamenteux, couvert de conidies incolores; thèques pyriformes ou ovales; sporidies agglomérées, brunes, cylindriques très courtes. — Espèce remarquable communiquée par M. Boudier. — Printemps.
-

SECT. III. — **HYALODIDYMÉES.** — *Sacc.*

5^e GENRE. — **HYPOMYCES.** — *Tul.*

1442. **HYPOM. LATÉRITIUS.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur les lamelles de *Lactarius deliciosus*. — Périthèces rouges puis bruns, ovoïdes, issus d'un mycelium blanchâtre qui recouvre les lamelles, thèques cylindriques; sporidies fusiformes-acuminées, incolores ou jaunâtres, uni-septées. — AC. — Bois de pins. — St-Amand. — Automne.
1443. **HYPOM. AURANTIUS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur les tubes de *Polyporus versicolor* et *adultus*. — Périthèces nombreux, ovoïdes, rouges-orangés, à demi plongés dans un subiculum rose ou rouge-clair tapissant la face inférieure du Polypore. Thèques cylindriques; spo-

ridies fusoïdes, acuminées, incolores, uniseptées.
— L'appareil conidien *Diplocladium majus*. Sacc.
l'accompagne.

Les formes secondaires des autres *Hypomyces*
sont inscrites dans le Catalogue, à la place qui
leur est assignée par leurs caractères particu-
liers.

6^e GENRE. — **NECTRIA**. — *Fries*.

1444. **NECTR. CINNABARINA**. *Fries*. — Alb. de
l'Est. — Sur troncs d'*Acer*, de *Fraxinus*, etc.
— Périthèces 10-15 sphériques, rugueux, rouge-
cinabre, cespiteux sur un strôme hémisphérique
rosé; thèques claviformes; sporidies oblongues-
elliptiques, incolores, uniseptées, distiques. —
CC. — Partout. — Le *Tubercularia vulgaris*
est son appareil conidien.
1445. **NECTR. SINOPICA**. *Fries*. — Alb. de l'Est.
— Sur sarments d'*Hedera helix*. — Périthèces
sphéroïdes, glabres, rouges, réunis 10-15 sans
strôme; thèques cylindriques, sub-monostiques;
munies de gouttelettes. — CC. — Automne. —
Conidie *Tubercularia sarmentorum*.
1446. **NECTR. DESMAZIERI**. *De Not.* — Alb.
de l'Est. — Sur rameaux de *Buxus semper-
virens*. — Périthèces 10-15, roses ou rougeâtres,
ovales, cespiteux sur un strôme jaunâtre; thèques
cylindriques; sporidies elliptiques, monostiques,
uniseptées, incolores. — Conidie *Tubercularia
versicolor*. — CC. — St-Amand. — Jardins.
Printemps.

1447. **NECTR. DISCOPHORA.** *Mont.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Alnus glutinosa*. — Envoi de M. Boudier. — Au Printemps. — Périthèces globuleux, glabres, rouges-bruns, tronqués au sommet en disque, à large ostiole noirâtre; thèques cylindriques; sporidies fusoïdes, incolores, uniseptées, monostiques. — RR.
1448. **NECTR. STILBOSPORA.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de *Fagus sylvatica*. — Périthèces ovoïdes, rouge-carmin, groupés et cespiteux sur les tubercules de *Fusisporium carneum*; thèques cylindriques, sporidies elliptiques; incolores, uniseptées à 2 gouttelettes. — R. — Bois de St-Amand et à Vitry-le-François, sur les chantiers du Canal. — Printemps.
1449. **NECTR. BRASSICÆ.** *Ell.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Brassica oleracea* pourrissantes. — Périthèces réunis en groupes, mais distincts, rouges-bruns, rugueux, sphériques; thèques claviformes; sporidies distiques, elliptiques - allongées, uniseptées, resserrées au milieu, incolores. — AR. — St-Amand. — Jardins. — Automne.
1450. **NECTR. PALUDOSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. Sur feuilles d'*Iris pseudo acorus* pourries sur l'humus des marais, à St-Lumier. — Périthèces globuleux, glabres, couleur de chair, épars; thèques claviformes; sporidies allongées-fusoïdes, un peu courbes, uniseptées, incolores. — AR. — Automne.
1451. **NECTR. SANGUINEA.** *Fries.* — Alb. de

l'Est. — Sur troncs cariés de *Juglans*, d'*Acer* etc. — Périthèces groupés, ovoïdes, mous, sanguins ou incarnats ; thèques claviformes ou cylindriques, paraphyses simples ; sporidies distiques et monostiques, elliptiques, uniseptées à 2 sporules. — CC. — St-Amand. — Automne, printemps.

1452. **NECTR. EPISPHERIA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Parasite sur *Diatrype stigma*, *Hypoxylon*, etc. — Périthèces ovoïdes puis affaîssés, glabres, rouge-sanguin, épars ; thèques cylindriques ; sporidies incolores, elliptiques, uniseptées. — CC. — St-Amand, Aulnay, etc. — Hiver, printemps.

1453. **NECTR. FUCKELII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur scutelles du *Parmelia* croissant sur les troncs de Noyer. — Périthèces ovoïdes, rouges, à demi immergés dans le tissu lichénoïde ; thèques claviformes ; sporidies incolores, fusoides uniseptées, distiques. — AC. — Automne, printemps. — St-Amand.

1454. **NECTR. PUNCTUM.** *Boudier.* — Alb. de l'Est. — Communiqué par M. Boudier et inscrit pour mémoire. — Croît sur les feuilles de *Jungermannia*. — Remarquable par ses périthèces très petits, ovoïdes, *noirs-velus* ; thèques cylindriques ; sporidies elliptiques oblongues, uniseptées. — RRR. — Printemps.

1455. **NECTR. COCCINEA.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce d'*Ulmus campestris*, placé dans les fissures. — Périthèces ovoïdes, d'un rouge-

vif, réunis sur un strôme un peu convexe, rosé ;
thèques cylindriques ; sporidies monostiques,
incolores, elliptiques, uniseptées, 2 gouttelettes.

— CC. — St-Amand, Printemps.

1456. **NECTR. DELICATULA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Helleborus jætidus*.

— Périthèces épars, très petits, orangés-pâles, mous ; thèques claviformes ; sporidies fusoïdes, un peu courbes, allongées, munies de 4 gouttelettes, uniseptées. — R. — Jardins. — Été. — St-Amand.

1457. **NECTR. SOLANI.** *Reinke.* — Alb. de l'Est.

— Sur tiges mortes de *Solanum tuberosum*. — Périthèces rouges-rosés, ovoïdes, plongés dans un subiculum blanc-villeux, glabres mais entourés près de l'ostiole, par une couronne de poils blancs ; thèques claviformes ; sporidies incolores, elliptiques-allongées, uni-septées, à 4 gouttelettes, distiques. — RR. — St-Amand. — Printemps.

1458. **NECTR. DAHLIÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est.

— Sur tiges pourrissantes de *Dahlia*. — Périthèces globuleux, bruns-rougeâtres puis noirs, réunis en groupe mais distincts ; thèques claviformes entourées de paraphyses muqueuses ; sporidies incolores, remplies de gouttelettes, elliptiques-allongées, un peu courbes. — Récolté dans mon jardin en hiver. — Quelques périthèces étaient recouverts par des conidies blanches portées sur des basides à 1-2 cloisons, que j'ai nommées *Oospora nectriæcola*. *Ch. R.* — RR.

7^e GENRE. — **HYPOCREA**. — *Fries*.

1459. **HYPOCR. OLIVACEA**. *C. et Ell.* — Alb. de l'Est. — Sur l'écorce de *Pinus sylvestris*. — Strôme sub-globuleux, de couleur olive, ponctué par les ostioles des périthèces sphériques logés à la périphérie du tubercule ; thèques cylindriques ; sporidies elliptiques, uniseptées composées de deux articles qui, en se désagrégeant, simulent 16 sporidies dans la thèque. — RR. — St-Amand. — Automne, par les temps humides.
1460. **HYPOCR. RIGENS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs abattus de *Pinus sylvestris*. — Strômes noirs-verdâtres, hémisphériques ou aplatis-sinueux ponctués à la surface ; périthèces blanchâtres, sous-jacents ; thèques cylindriques filiformes, incolores, simulant 16 cellules séparées. — AC. — St-Amand. — Hiver, Printemps.
1461. **HYPOCR. GELATINOSA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Pinus sylvestris* et *Abies*. — Strômes tuberculeux, irrégulièrement arrondis, jaune-nankin, ponctués, substance blanche ; périthèces périphériques, mous ; thèques cylindriques, très longues ; sporidies bi-loculaires, caractères des espèces précédentes. — AR. — Automne, Printemps.

8^e GENRE. — **LETENDRÆA**. — *Sacc.*

1462. **LETENDR. EUROTIoidES**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Bull. Soc. bot. de Fr. 1881, sous

le nom de *Nectria helminthicola*. Ch. R. — Sur les tiges mortes de *Ribes rubrum*, et *Symphoricarpos*. — Périthèces glabres, jaunes-pâles, ovoïdes, groupés à la base des filaments d'*Helminthosporium appendiculatum* son appareil conidien; thèques claviformes, entourées de paraphyses simples; sporidies elliptiques, brunes, uniseptées, resserrées à la cloison, 2 gouttelettes. — AR. — St-Quentin-les-Marais, St-Amand. — Automne, Printemps.

SECT. IV. — **PHRAGMOSPORÉES**. — *Sacc.*

9^e GENRE. — **CALONECTRIA**. — *De Not.*

1463. **CALONECT. RICHONI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Bull. Soc. bot. de Fr. sous le nom de *Nectria mellinæ*. Mont. Sur tiges mortes de *Salix capræa* et de *Symphoricarpos*. — Périthèces sphériques puis déprimés, roses ou rougeâtres puis jaune-miel, mous, épars, renfermant des thèques fusoïdes, sans paraphyses; sporidies tristiques, cylindracées un peu courbes, incolores, munies de 3-5 cloisons. — R. — Soulanges, St-Amand. — Printemps.

10^e GENRE. — **GIBBERELLA**. — *Sacc.*

1464. **GIBB^{la}. PULICARIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur l'écorce des rameaux de *Sambucus nigra* et sur *Solanum dulcamara*. — Périthèces 15-20,

sphériques puis aplatis en cupule, noirs, rugueux, insérés sur un strôme tuberculaire brun ; thèques oblongues-fusiformes : sporidies incolores, elliptiques-fusoïdes, triseptées, resserrées aux cloisons. — CC. — St-Amand. Ablancourt. — Hivers doux, printemps. — Conidie *Fusarium sambucinum*.

1465. **GIBB^{la}**. **SAUBINETII**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*, près des nœuds. — Périthèces groupés 15-20, ovoïdes, noirs-bleus, rugueux, sphériques puis affaîssés ; thèques oblongues-lanceolées ; sporidies distiques, fusiformes, un peu courbes, tri-septées. — AC. — Bords des eaux. — St-Amand. — Printemps.

1466. **GIBB^{la}**. **ACERVALIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Salix caprea*. — Périthèces ovoïdes, bruns, rugueux, groupés ou épars sur l'écorce ; thèques claviformes ; sporidies elliptiques-oblongues, 2-3 septées. — La forme thécasporée AR. — La spermogonie *Phoma acervalis* plus commune. — St-Amand. — Automne.

1467. **GIBB^{la}**. **AGGLOMERATA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes et humides de *Vinca major*. — Périthèces sub-sphériques, glabres, noirs-bleus, épars ; thèques claviformes ; sporidies distiques, elliptiques-oblongues, munies de 2 cloisons. — AR. — Jardins. — Printemps. — St-Amand.

11^e GENRE. — **PLEONECTRIA**. — *Sacc.*

1468. **PLEON**. **LAMYI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Berberis vulgaris*. — Périthèces

rouges-orangés ; sporidies muriformes hyalines.
— RR. — Reims. — Communiqué par le Dr Jolicoeur.

12^e GENRE. — **THYRONECTRIA**. — *Sacc.*

1469. **THYR. PATAVINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur branches de Noyer. — Périthèces globuleux, verdâtres, épars sur un strômediscoïde ; sporidies hyalines, muriformes à 10 cloisons transversales. — St-Amand. — Printemps. — RR.
1470. **THYR. PYRROCHLORA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Acer campestre*. — Périthèces globuleux, 10-20 pulvérulents, verdâtres au sommet, substance pourpre ; ostiole noir ; sporidies hyalines, murales. — St-Amand. — Automne. — RR.
-

SECT. V. — **SCOLECOSPORÉES**. — *Sacc.*

13^e GENRE. — **OOMYCES**. — *B. et Br.*

1471. **OOMYC. CARNEO-ALBUS**. *B. et Br.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Festuca nemoralis*. — AR. — Bois de St-Amand. — Périthèces ovoïdes, surface à papilles blanchâtres, ostioles noirs ; thèques cylindriques ; sporidies filiformes, cloisonnées, articles se désagrégeant. — Automne. — Printemps.

14^e GENRE. — **CLAVICEPS**. — *Tul.*

1472. **CLAV. PURPUREA**. *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur grains de *Secalis*, *Avena*, *Triticum*, etc. — St-Amand, Ablancourt, etc. — CC. — Fin de l'Eté. — Conidie *Sphacelia purpurea*.

15^e GENRE. — **CORDICEPS**. — *Link.*

1473. **CORD. MILITARIS**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur *larves* d'Insectes. — Bois de St-Amand. — Automne. — Périthèces périphériques, rouges-orangés, sur un strôme claviforme. — AC. — Conidie *Isaria farinosa*.
1474. **CORD. OPHIOGLOSSOIDES**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur *Elaphomyces granulatus*. — Strômes allongés terminés par un capitule cylindrique, obtus, verdâtres, puis bruns, enfin noirâtres. — AR. — Bois de la Montagne de Reims. — Automne.
1475. **CORD. CAPITATA**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur *Elaphomyces granulatus*. — Strômes élevés, capitule globuleux, jaunâtres-noircissants; sporidies filiformes se désagrégeant en articles cylindriques. — Bois de Verzy, Verzenay. — RR. — Printemps.

16^e GENRE. — **EPICHLÖE**. — *Tul.*

1476. **EPICHL. TYPHINA**. *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Phleum pratense* et *Dactylis*.

qu'il entoure près des nœuds dans une longueur de 4 à 6 centimètres. — CC. — Dans les bois et les prairies. — Fin de l'Eté. — Partout. — Conidie *Sphacelia typhina*.

4^e FAM. — **Dothidéacées**. — *Nits*.

Périthèces formés par la substance du strôme dans lequel ils sont plongés ; ostiole papilliforme.

1^{er} GENRE. — **MAZZANTIA**. — *Mont*.

1477. **MAZZ. GALII**. *Mont*. — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Galium aparine*. — RR. — environs de Reims. — Communiqué par le Dr Jolicœur. — Hiver.

2^e GENRE. — **PHYLLACHORA**. — *Nits*.

1478. **PHYLL. ULMI**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Ulmus campestris*. — Bois de St-Amand, etc. — Hiver, automne. — Conidie *Septoria ulmi*.
1479. **PHYLL. GRAMINIS**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Fétuque*. — Dans les bois de St-Amand. — CC. — Automne, hiver.
1480. **PHYLL. POPULI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Populus cordifolia*. — AR. — St-Lumier. — Espèce ambiguë, consulter le Rec. 9, page 12.

1481. **PHYLL. JNCI.** *Fuckel.* — Sur chaumes de *Juncus communis*. — CC. — Dans les fossés humides. — St-Amand, Lisse. — Automne.

3^e GENRE. — **SCIRRHIA.** — *Nits.*

1482. **SCIRRH. RIMOSA.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*. — CCC. — Bords des eaux. — St-Amand, Soulanges, Vanault-les-Dames, etc. — Hiver, printemps.

4^e GENRE. — **PLOWRIGHTIA.** — *Sacc.*

1483. **PLOWR. RIBESIA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux arides de *Ribes rubrum*. — CCC. — Jardins. — Partout. — Conidie *Podosporium ribis*. — Hiver, printemps.

1484. **PLOWR. INSCULPTA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments de *Clematis vitalba*. — AR. — Soulanges. — Automne.

1485. **PLOWR. MORBOSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux pourrissants de *Prunus domestica*. — R. — Entre Lisse et St-Amand. — Automne.

5^e GENRE. — **DOTHIDEA.** — *Sacc.*

1486. **DOTH. SMILACICOLA.** *In. Grév.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Smilax laurifolia*. — Serres. — RR. — Printemps.

1487. **DOTH. PUCCINIOIDES.** *Tul.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Buxus sempervirens*. — Jardins à St-Amand. — Hiver-Printemps.

6^e GENRE. — **ROPOGRAPHUS**. — *Fuckel*.

1488. **ROPOGR. FILICINUS**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Pteris aquilina*. — Bois de la Montagne de Reims. — AR. — Hiver.
-

5^e FAM. — **Microthyriacées**. — *Sacc*.

Périthèces membraneux ou charbonneux, dimidiés, scutiformes ; tissu à fibres rayonnantes.

1^{er} GENRE. — **MICROTHYRIUM**. — *Desm*.

1489. **MICR. MICROSCOPICUM**. *Desm*. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles mortes de *Buxus sempervirens*. — Hiver-Printemps. — St-Amand. — AR. — Haies, jardins.
1490. **MICR. Visci**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux secs de *Viscum album*, après l'hiver, en compagnie de *Camarosporium visci* et d'*Anthostomella visci*. — RR. — Printemps. — Ablancourt. — Espèce nouvelle.
1491. **MICR. PLATANI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Platanus orientalis*. — AR. — Soulanges, dans le parc du château. — Voir Recueil 10, p. 29. — Espèce nouvelle.
-

6^e FAM. — **Lophiostomacées.** — Sacc.

Périthèces charbonneux, adnés à la base, incrustés ;
ostiole comprimé, s'ouvrant en fente.

1^{er} GENRE. — **LOPHIOTRICHIA.** — Richon.

1492. **LOPH. VIBURNI.** Ch. R. — Alb. de l'Est.
— Bull. soc. Bot. de Fr. 1885. — Sur ramilles
de *Viburnum Lantana*. — RR. — Soulanges.
— Printemps. — Sacc. add. au Vol. IV. p. 254.

2^e GENRE. — **LOPHIOSPHAERA.** — Trév.

1493. **LOPH^{ra}. FUCKELII.** Sacc. — Alb. de l'Est.
— Sur tiges mortes de *Rubus fruticosus*. — AC.
— St-Lumier, St-Amand. — Ostiole comprimé ;
sporidies hyalines, fusoïdes, uniseptées. — Hiver.
1494. **LOPH^{ra}. DONACIS.** Ch. R. — Alb. de l'Est.
— Sur chaumes d'*Arundo donaci* desséchés, cul-
tivé dans les jardins. — Sermaize. — Printemps.

3^e GENRE. — **LOPHIOTREMA.** — Sacc.

1495. **LOPH^{ma}. CRENATUM.** Sacc. — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Prunus domestica* et
Viburnum opulus. — CC. — Ostioles comprimés, en
forme de crête. — Hiver, printemps. — Partout.
1496. **LOPH^{ma}. EPILOBII.** Ch. R. — Alb. de l'Est.
— d'*Epilobium molle et Roseum*. — Printemps.
— St-Amand, bords du Fion. — Rec. 12, p. 15.

4^e GENRE. — **LOPHIOSTOMA.** — *Ces.*

1497. **LOPH^{ma}. QUADRINUCLEATUM.** *Karst.* — Alb. de l'Est. — Sur branches dénudées de Peuplier, en Automne. — Bois de St-Amand, etc. — CC.
1498. **LOPH^{toma}. CESPITOSUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Crataegus oxyacantha*. — Printemps. — St-Amand, St-Lumier. — C.
1499. **LOPH^{toma}. ARUNDINIS.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*. — CC. — Bords des eaux. — Partout. — Hiver, Printemps.
1500. **LOPH^{toma}. EXCIPULIFORME.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur écorces de Peuplier d'Italie. — Printemps-Été. — CC. — Partout. — Périthèces gros, émergés, à larges ostioles. — Sur *Genista prostrata*. Var. — Collines de Bassu.
1501. **LOPH^{toma}. INSIDIOSUM.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Ononis spinosa* et sur *Erysimum alliaria*. — AC. — Soulanges, Aulnay. — Sporidies olivâtres, à 5 cloisons et terminées par 2 apicules. — Automne, Printemps.

5^e GENRE. — **LOPHIDIUM.** — *Sacc.*

1502. **LOPHID. COMPRESSUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Salix caprea*, de *Cornus sanguinea*, etc. — CCC. — Bois, haies. — Partout. — Printemps, Hiver.

1503. **LOPHID. POPULI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Commun sur branches dénudées de Peuplier.
— Toute l'année, notamment au printemps. —
Bois de St-Amand, Soulanges, etc.
-

7^e FAM. — **Hystériacées.** — *Corda.*

*Périthèces oblongs ou linéaires, coriaces ou charbon-
neux. Ouverture en fente qui parcourt
toute la longueur du périthèce.*

1^{er} GENRE. — **SCHIZOTHYRIUM.** — *Desm.*

1504. **SCHIZ. PTARMICÆ.** *Desm.* — Alb. de l'Est.
— Sur les tiges et feuilles encore vertes d'*Achillæa
ptarmica.* — En Automne. — AC. dans les
prairies humides de Soulanges.

2^e GENRE. — **AULOGRAPHUM.** — *Lib.*

1505. **AULOGR. JUNCINUM.** *Lib.* — Alb. de l'Est.
— Sur chaumes de *Juncus communis* desséché.
— AC. — Entre Lisse et St-Amand dans les
fossés humides. — Automne. — Thèques larges
renfermant 4 sporidies uniseptées. — Automne,
hiver.

3^e GENRE. — **GLONIUM.** — *Miehl.*

1506. **GLON. PYGMÆUM.** *Karsten.* -- Alb. de
l'Est. — Sur branches dénudées de *Juniperus*

communis. — AC. dans les plantations de Pins sylvestres, entre St-Amand et Soulanges. — Printemps.

4^e GENRE. — **HYSTERIUM**. — *Tod.*

1507. **HYSTER. ANGUSTATUM**. *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments de *Rubus fruticosus*. — AC. — St-Lumier, Soulanges. — Printemps.

5^e GENRE. — **DICHÆNA**. — *Fries.*

1508. **DICHÆN. STROBILINA**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur cônes de *Pinus sylvestris*. — AC. — Bois de pins. — St-Amand, Soulanges. — Hiver-Printemps.

6^e GENRE. — **GLONIOPSIS**. — *De Not.*

1509. **GLON^{psis}. BIFORMIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur lattes de Chêne exposées à l'air libre. — Palissades, vignes. — CCC. — Jardins. — Toute l'année. — Partout.

7^e GENRE. — **HYSTEROGRAPHIUM**. — *Corda.*

1510. **HYSTER. FRAXINI**. *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux de *Fraxinus excelsior*. — CCC. — Bois. — Printemps, hiver. — Partout.
1511. **HYSTER. SYRINGÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa vulgaris*. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Printemps. — Très voisin du précédent.

8^e GENRE. — **HYPODERMA.** — *D. C.*

1512. **HYPOD. VIRGULTORUM.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments de *Rubus fruticosus*. — AC. — Dans les haies, les broussailles des forêts. — Sermaize, St-Amand. — Automne.

9^e GENRE. — **LOPHODERMIMUM.** — *Chev.*

1513. **LOPH^{mium}. HYSTERIOIDES.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Crataegus oxyacantha* tombées à terre, après l'hiver. — Dans les bois de pins, entre St-Amand et Bassu. — AR.
1514. **LOPH^{mium}. PINASTRI.** *Chev.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de cônes de *Pinus sylvestris*. — CC. dans les plantations de Pins, après l'hiver. — St-Amand, Soulanges.
1515. **LOPH^{mium}. CULMIGENUM.** *Chev.* — Alb. de l'Est. — Sur gaine des chaumes des *Graminées*, *Poa*, *Festuca*. etc. — AC. — Bois humides de St-Lumier, Lisse, etc. — Automne, Été.
1516. **LOPH^{mium}. ARUNDINACEUM.** *Chev.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Calamagrostis*, d'*Arundo phragmites*. — AC. — Bords des ruisseaux. — St-Amand, Soulanges, etc. — Automne.
1517. **LOPH^{mium}. CARICINUM.** *Duby.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Carex glauca*. — CC. dans les bois humides et dans les bois de Pins. — Dans cette dernière station il est assez souvent accompagné de *Myrothecium caricis*. — Automne. — St-Amand.

10^e GENRE. — **LOPHIUM**. — *Fries*.

1518. **LOPHIUM. MYTILINUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur le bois mort et les cônes de Pin sylvestre. — Espèce ressemblant à une moule en miniature. — CC. — Soulanges, etc. — Printemps, Automne.

11^e GENRE. — **COLPOMA**. — *Vallroth*.

1519. **COLP. QUERCINUM**. *Wallr.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les rameaux et petites branches de Chêne vertes que sa présence fait périr. — Dans tous les bois. — Hiver. — Partout.

12^e GENRE — **OSTROPA**. — *Fries*.

1520. **OSTR. CINEREA**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Prunus spinosa* et *domestica*. — AR. — Dans les bois et broussailles de Soulanges, St-Amand, Lisse, etc. — Hiver-Printemps.

13^e GENRE. — **ROBERGEA**. — *Desm.*

1521. **ROBERG. UNICA**. *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur *Fraxinus Excelsior*, sur *Lonicera xylosteum*. et *Viburnum opuli*. — AR. — Bois de St-Amand. — Printemps.

14^e GENRE. — **ACROSPERMUM**. — *Tode*.

1522. **ACROSP. COMPRESSUM**. *Tode*. — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mourantes des grandes herbes, *Urtica*, *Cirsium arvense*, etc. — CC. —

Automne et Été, par les temps humides. — St-Amand, etc.

1523. **ACROSP. GRAMINUM.** *Lib.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes et sur les feuilles des *Graminées*, *Poa*, *Festuca*, etc. — CC. — Automne-Printemps. — Partout.

15^e GENRE. — **GODRONIA.** — *Ch. Richon.*

1524. **GODR. MUHLENBECKII.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*. — RR. — Se présente sous deux aspects. — 1^o La forme thécasporée, avec thèques claviformes ; sporidies filiformes, remplies de gouttelettes ; paraphyses simples ; 2^o la forme spermogonienne, renfermant des spermaties aculéiformes, septées, en faisceaux. — Bul. soc. Bot. de France.
-

3^e DIVISION.

FUNGI NONDUM PERFECTI.

1^{re} FAM. — **Sphéropsidéés.** — Lév.

Périthèces privés de thèques, contenant des sporules portées par des basides plus ou moins manifestes.

SECT. I. — **HYALOSPORÉES.** — Sacc.

Sporules continues, hyalines.

1^{er} GENRE. **PHYLLOSTICTA.** — Pers.

1525. **PHYLL^{ta}. ACUPARIÆ.** Sacc. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles mourantes de *Sorbus acuparia*. — Automne-Hiver. CC. — Jardins. — St-Amand.

1526. **PHYLL^{ta}. RUBICOLA.** Rabb. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Rubus cæsius*, *Depazea areolata* de Fuckel ? — L'état conidien *Calloria ruborum* l'accompagne. — AC. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Automne.

1527. **PHYLL**^{ta}. **ROSÆ**. *Kickx*. — Alb. de l'Est.
Sur feuilles de *Rosa Bengalîs* et *Rosa maialis*
encore vertes. — Jardins. — St-Amand. — AR.
1528. **PHYLL**^{ta}. **CYTISI**. *Desm.* — Alb. de l'Est.
— Sur la face supérieure des feuilles de *Cytisus*
laburnum. — CC. — Jardins et parcs. — Sou-
langes, Ablancourt. — Automne.
1529. **PHYLL**^{ta}. **ACERIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles d'*Acer campestre*. — CC. dans
les bois, à la fin de l'Été. — Partout.
1530. **PHYLL**^{ta}. **VULGARIS**. *Desm.* — Alb. de
l'Est. — Sur les feuilles encore vertes de *Loni-*
cera Xylosteum. — CC. — Automne. — St-Amand,
Ablancourt.
1531. **PHYLL**^{ta}. **SYMPHORICARPI**. *West.* — Alb.
de l'Est. — Sur feuilles de *Symphoricarpos*. —
CC. — Jardins. — St-Amand. — Automne.
1532. **PHYLL**^{ta}. **SAMBUCICOLA**. *Kalch.* — Alb. de
l'Est. — Sur feuilles de *Sambucus ebulus* encore
vertes. — Accompagne souvent le *Septoria ebuli*.
— CC. — Automne. — Lisse, St-Amand.
1533. **PHYLL**^{ta}. **SYRINGÆ**. *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles encore vertes de *Syringa vulgaris*.
— CC. en Été. — Jardins. — St-Amand, etc.
1534. **PHYLL**^{ta}. **LIMBALIS**. *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Buxus sempervirens*. — CC.
— Automne. — Jardins. — St-Amand.
1535. **PHYLL**^{ta}. **BUXINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Buxus sempervirens*. — Jar-
dins. — Automne. — Plus commun que le pré-
cédent. — Partout.

1536. **PHYLL^{ta}. MAHONIAE.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles vertes de *Mahonia aquifolius*.
— Jardins. — St-Amand. — Printemps. — Me paraît être un *Macrophoma* par la forme.
1537. **PHYLL^{ta}. BERBERIDIS.** *Rabb.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles vertes de *Berberis vulgaris*.
— AR. — Aulnay-l'Aître. — Automne. — En compagnie du *Leptothyrium ribis*.
1538. **PHYLL^{ta}. ALNIGENA.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Alnus glutinosa*. — AR.
— Entre Lisse et St-Amand. — Bois. — Automne, fin de l'Été.
1539. **PHYLL^{ta}. CORYLI.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles vertes du *Corylus avellana*. — AC. à la fin de l'Été. — Jardins, parcs. — St-Amand. — Sporules se rapprochant de celles des *Macrophoma*.
1540. **PHYLL^{ta}. CARPINI.** *Schultz.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles mortes de *Carpinus betula*. — AC. dans les charmilles, jardins. — Printemps. — Sporules grosses (0^{mm},015). — St-Amand.
1541. **PHYLL^{ta}. QUERCUS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Quercus* desséchées. — AC. dans les bois. — Printemps. — Partout. — Sporules cylindriques.
1542. **PHYLL . BRASSICÆ.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles languissantes de *Brassica oleracea*.
— CCC. — Jardins. — Automne. — Partout.
1543. **PHYLL^{ta}. DIANTHI.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Dianthus barbatus*. — CC.

dans les jardins. — St-Amand. — Automne. — Sporules cylindriques. courbes.

1544. **PHYLL**^{ta}. **ANGELICÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Angelica sylvestris*. — CCC. en Automne, au bord des rivières. — St-Amand, Ablancourt.

1545. **PHYLL**^{ta}. **ATRIPLICIS**. *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Atriplex hastata*. — CCC. — Automne. — Champs, jardins. — Partout.

1546. **PHYLL**^{ta}. **ALISMATIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Sagittaria* et d'*Alisma plantago*. — CC. — Lieux marécageux. — Automne. — La Chaussée, Togny.

1547. **PHYLL**^{ta}. **PERSICÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Persica vulgaris*. — CC. — Jardins. — Automne. — St-Amand, etc.

1548. **PHYLL**^{ta}. **LIGUSTRINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Ligustrum vulgare*. — CC. — Automne. — Haies des jardins, bois. — St-Amand.

1549. **PHYLL**^{ta}. **TRIFOLII**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Trifolium repens*. — Dans le voisinage du *Polythrincium Trifolii*, dont il est sans doute la spermogonie. — Sporules ovales. 0^{mm},0028^{mm}.

1550. **PHYLL**^{ta}. **TREMULÆCOLA**. *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Populus tremula*. — AC. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Automne-Hiver. — Sporules courbes, cylindriques. — C'est le *Depazea Tremulæcola* *Sacc.*

1551. **PHYLL**^{ta}. **FRAXINICOLA**. *Curr.* — Alb. de

l'Est. — Sur feuilles de *Fraxinus excelsior*. — CC. dans les bois de St-Amand. — Fin de l'Été.

1552. **PHYLL^{ta}. PODAGRARIÆ.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Ægopodium podagraria*. — AC. — Bois de St-Amand. — Automne. — *Phoma* selon Sacc.

2^e GENRE. — **PHOMA.** — *Fries.*

1553. **PHOMA LABURNI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur pédoncules des gousses de *Cytisus laburnum*. — AC. en hiver dans les jardins. — St-Amand, etc. — Les sporules longues, fusiformes, courtement pédicellées en font un *Macrophoma*.
1554. **PHOMA PSEUDO. ACACIÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — *Phoma Oncostoma* de Thüm. — Sur rameaux de *Robinia pseudo-acacia*. — CC. — Au printemps. — Jardins. — St-Amand, Ablancourt, etc. — Spermogonie de *Diaporthe oncostoma*.
1555. **PHOMA FUCKELII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Carpinus*. — Accompagne le *Caelosphaeria Fuckelii* dont il est la Spermogonie. — AC. — Haies en charmilles, jardins. — St-Amand. — Printemps. — (*Dendrophoma*).
1556. **PHOMA RYCKHOLTII.** *Sacc.* -- Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Symphoricarpos*. — Accompagne le *Diaporthe Ryckholtii* dont il est la Spermogonie. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Été.
1557. **PHOMA LONICERÆ.** *Cooke.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Lonicera Xylosteum*.

- AC. — Jardins. — Printemps. — Ablancourt. St-Amand. — Spermogonie d'*Anthostoma Xylostei*.
1558. **PHOMA RAMEALIS.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts d'*Evonymus Europæus*; sur le bois dénudé. — Taches entourées d'une ligne noire, couvertes de phoma. — CC. — Bois d'Aulnay-l'Aître. — Automne, printemps.
1559. **PHOMA DETRUSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux dénudés de *Berberis vulgaris*. CC. dans les jardins. — St-Amand. — Spermogonie de *Cucurbitaria berberidis*.
1560. **PHOMA PITHYOPHILA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur aiguilles de *Pinus Sylvestris*. — CC. en Automne et en hiver. — Bois de Pins. — St-Amand. — C'est le *Sphæronema Pithyophylum* de Corda.
1561. **PHOMA PERSICÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux de *Persica vulgaris*. — AR. — Jardins. — Printemps. — — St-Amand, etc.
1562. **PHOMA COOKEI.** *Pirotta.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes sarments secs de *Vitis vinifera*. — En hiver.—CC. — St-Amand. - Jardins.— Partout.
1563. **PHOMA DEPRESSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce croît sur les jeunes rameaux desséchés de *Syringa vulgaris*. — Elle doit être rapportée au *Melanostroma fusaroides* de Sacc. — CC. — Jardins. — St-Amand.
1564. **PHOMA SYRINGINA.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa vulgaris* dénudés. — AC. Jardins. — Printemps. — St-Amand. — Sporules cylindriques, fusiformes.

1565. **PHOMA RHOIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et pétioles de *Rhus typhinum*. — C. — Jardins. — St-Amand. — Hiver-Printemps.
1566. **PHOMA CORNI.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. Sur rameaux de *Cornus sanguinea*. — C. au printemps. — Dans les bois, parcs, etc. — Partout. — Les basides des sporules sont disposées en rosette et courbées en crochet.
1567. **PHOMA PULLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Hedera helix*. — Aspect d'une *hysteriacée*. — CC. — Sur le tronc des arbres envahis depuis longtemps par le Lierre. — CC. — Printemps. — St-Amand, etc.
1568. **PHOMA OPULI.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Viburnum opuli*. — AC. dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps.
1569. **PHOMA PROTRACTA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Acer campestre*, en compagnie de *Didymosphæria acerina*. — CC. — Dans les bois. — St-Lumier, Lisse, etc. — Printemps.
1570. **PHOMA RADULA.** — *B.* et *Br.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Platanus orientalis*. — AR. — Printemps. — Vitry-la-Ville, Ablancourt.
1571. **PHOMA JUGLANDINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Juglans*. — Accompanye souvent le *Cytisporina heteracantha*. — CC. — St-Amand, St-Lumier. — Hiver.
1572. **PHOMA ACERVALIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches dénudées de *Salix caprea*. —

AR. en hiver. — St-Amand. — Spermogonie de *Gibberella acervalis*.

1573. **PHOMA LIGUSTRINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Ligustrum vulgare*. — AC. — Haies, jardins. — St-Amand. — Printemps.

1574. **PHOMA OBLONGUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes et desséchées d'*Ulmus campestris*. — AR. — St-Amand. — Printemps. — Spermogonie de *Diaporthe Eres*.

1575. **PHOMA PICEA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tige morte d'*Hypericum perforatum*. — C. Bois de St-Amand. — Printemps. — Sporules cylindriques à 4 gouttelettes.

1576. **PHOMA TAXI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et tigelles de *Taxus baccatus*. — CC. — Jardins. — Printemps. — Anlnay-l'Aître, St-Amand. — Suivant Saccardo c'est un état jeune de *Diplodia taxi*.

1577. **PHOMA HYSTERELLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges et feuilles de *Taxus baccatus*. — AR. — St-Amand. — Jardins. — Hiver. — Les sporules sont bien différentes de celles de *Ph. Taxi*. Leur forme est arrondie-ovale, elles ont un court pédicelle et sont granuleuses. — C'est sans doute la Spermogonie de *Physalospora gregaria*.

1578. **PHOMA PETIOLORUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur pétioles des feuilles de *Juglans* mortes, après l'hiver. — AC. — St-Amand. — Apparence d'un *Hypoderma*.

1579. **PHOMA MIRBELII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Buxus sempervirens*. — AR.
— Jardins. — St-Amand. — Printemps.
1580. **PHOMA MERVISEQUA.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur les nervures des feuilles de chêne.
— AR. — St-Amand. — Après l'hiver. — Appa-
rence d'un *Sclerotium punctum*.
1581. **PHOMA LINGAM.** *Desm.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges de *Brassica oleracea* desséchées et
sur les plantes herbacées en général. — CCC.
— Jardins. — St-Amand.
1582. **PHOMA ALBICANS.** *Rob. et Desm.* — Alb.
de l'Est. — Sur tiges de *Chicoracées*. — Jar-
dins. — Printemps. — C.
1583. **PHOMA LONGISSIMA.** *West.* — Alb. de
l'Est. — Sur tiges d'*Ombellifères* et de *Chéno-
podées*. — CC. — Jardins, champs. — Partout.
— Automne. Printemps.
1584. **PHOMA COMPLANATA.** *Desm.* — Alb. de
l'Est. — Sur tiges d'*Urtica dioica*, de *Chæro-
phyllum Temulum*. — CCC. — Jardins, bois,
etc. — Partout. — Printemps.
1585. **PHOMA CAULOGRAPHIA.** *Dur. et Mont.* —
Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Ombelli-
fères*, notamment *Chærophyllum Temulum*. --
Haies, bois. — St-Amand. — CC. — Printemps.
1586. **PHOMA PHLOGIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges desséchées de *Phlox des Jardins*,
après l'hiver. — CC. — St-Amand.
1587. **PHOMA STRIÆFORMIS.** *Dur. et Mont.* —
Alb. de l'Est. — Sur les tiges et tigelles de

- Dipsacus sylvestris*. — AC. — Bois, lieux incultes, jardins, etc. — Partout.
1588. **PHOMA SPIREÆ**. *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Spiræa Ulmaria*. — AR. — Bords du Fion. — Printemps.
1589. **PHOMA HERBARUM**. *West.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges des grandes herbes. — CCC. — Partout. — Automne, Printemps.
1590. **PHOMA BACCILLARIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Aconit napel*. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Printemps. — Sporules cylindriques munies de 4-6 gouttelettes.
- 1591 **PHOMA EPILOBII**. *Preuss.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Epilobium augustifolium*. — AC. — Lieux humides des bois de Lisse, St-Lumier. — Hiver.
1592. **PHOMA ÆNOTHERÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Ænothera biennis* — Au Printemps. — Jardins. — St-Amand. — AR. — Sporules avec courtes basides pyriformes.
1593. **PHOMA ÆNOTHERELLA**. *Sacc.* Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Ænothera biennis*. — Hiver. — Jardins. — AR. — St-Amand. — Sporules sans basides apparentes et sans gouttelettes.
1594. **PHOMA NEBULOSA**. *Mont.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Althæa Malva*. — AC. — Jardins. — Printemps. — St-Amand.
1595. **PHOMA VINCÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur pétioles et feuilles de *Vinca major*. — AR. — Jardins. St-Amand. — Printemps.

1596. **PHOMA LEGUMINUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur gousses de *Phaseolus*, de *Cytisus*, etc. — CC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.
1597. **PHOMA LAGENARIÆ.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur les fruits de la *Coloquinte* en décomposition. — Jardins. — AC. — St-Amand.
1598. **PHOMA UVICOLA.** *B. et C.* — **North. ameri.** — Alb. de l'Est. — **Black-rot. des Américains.** — Sur les grains de raisins des treilles. — N'a pas encore été observé dans le vignoble de Champagne. — St-Amand. — RR. — Fin de l'Été.
1599. **PHOMA STROBILIGENA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les cônes du *Pin d'Autriche*. — *Spermogonie* de *Diatrype occulta*. — AC. — Printemps. — Soulanges, Ablancourt.
1600. **PHOMA GLANDICOLA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les glands du chêne, en compagnie du *Discosia Glandicola*. — AC. — Hiver-Printemps. — St-Amand.
1601. **PHOMA JUGLANDIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur péricarpe de *Juglans*. — Après l'hiver. — CC. — St-Amand, Lisse.
1602. **PHOMA ORNITHOGALI.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles d'*Ornithogalum umbellatum*, en compagnie d'*Heterosporium Ornithogali*. — AC. à St-Amand, dans les bois, au mois de Mai.
1603. **PHOMA CONVALLARIÆ.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles mortes de *Convallaria maïalis*. — Sporules cylindriques, renflées aux

extrémités. — Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — En Été. — CC.

1604. **PHOMA DAHLIÆ**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges pourrissantes de *Dahlia Variabilis*. — Après l'hiver. — CC. — St-Amand. — Printemps.

1605. **PHOMA PODAGRARIÆ**. *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Ægopodium podagraria*. — CC. à St-Amand, mais rare ailleurs. — Été-Automne. — Dans les bois aux abords du Fion.

3^e GENRE. — **AOSPHÆRIA**. — *Berk.*

1606. **AOSPHÆRIA PINEA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les écailles pourrissantes du *Pinus sylvestris* tombées à terre en Automne. — Printemps. — C. — St-Amand, etc. — (*Sphaeronema* des auteurs.)

4^e GENRE. — **DENDROPHOMA**. — *Sacc.*

1607. **DENDROPHOMA PRUINOSA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Viburnum Lantana*. — Dans les bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps. — AR. — Aspect d'un *Cytispora*.
1608. **DENDROPHOMA THERRYANA**. *Sacc.* et *Roum.* — Alb. de l'Est. — Sur glands de chêne tombés à terre au printemps. — Bois de St-Amand, La Chaussée. — AC.

5^e GENRE. — **MYCOGALA**. — *Rost.*

1609. **MYCOGALA PARIETINUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes de *Graminées* et

sur les vieux murs humides. — AC. — Été.
— St-Amand. — Sporule sphérique, tuberculeuse,
jaunâtre.

6^e GENRE. — **SPHÆRONEMA**. — *Fries*.

1610. **SPHÆRONÆMA DECORTICANS**. *Lév.* —
Voir le *Cytisporina heteracantha*. Sacc. — Sper-
mogonie d'*Eutypa heteracantha*. Sacc. — Sur
rameaux secs de Noyer. — Automne. — St-
Amand. — AR.

1611. **SPHÆRONÆMA PILIFERUM**. *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Commun sur les écailles de
Chêne humides à l'air libre. — Dans les bois,
chantiers, etc. partout et toute l'année. — *Conio-
thyrium longirostrum*. Ch. R.)

1612. **SPHÆRONÆMA PITHYUM**. *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur écaille de *Pinus sylvestris*. —
Spermogonie de *Ceratostoma piliferum*. Var.
pinastri. — C'est l'*Aposphaeria pinea* de Sacc.
— AC. — St-Amand. — Printemps.

1613. **SPHÆRONÆMA CONICUM**. *Fr.* — Alb.
de l'Est. — Sur branches dénudées et écailles
de bois d'*Alnus glutinosa* humides. — Péri-
thèces velus, à papilles blanches, couronnés par
un globule de sporules ovales. — AR. — St-
Amand. — Printemps.

7^e GENRE. — **ASTEROMA**. — *D. C.*

1614. **ASTEROMA HYPERICI**. *Lasch.* — Alb. de
l'Est. — Sur les tiges sèches d'*Hypericum per-
foratum*. — Périthèces situés au centre de fila-

ments septés, rayonnants ; sporules elliptiques.
— AR. — Printemps. — St-Amand. — Bords
des chemins.

1615. **ASTEROMA ROBERGII.** *Desm.* — — Alb.
de l'Est. — Dans l'intérieur des tiges d'*Althea*
rosea et des *Ombellifères*. — C'est le *Dendrina*
pulla de Fries. — AC. — Jardins. — St-Amand.
— Hiver-Printemps.

1616. **ASTEROMA VERNICOSUM.** *Fuckel.* — Alb.
de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Angelica sylves-*
tris. — Bords des rivières. — St-Amand, St-
Lumier, La Chaussée. — CC. — Printemps.

1617. **ASTEROMA RETICULATUM.** *Chev.* — Alb.
de l'Est. — *Convallaria polygonatum*. — Fibrilles
radiées entremêlées de périthèces pezizoïdes. —
Bois de St-Lumier, Aulnay. — AR. — Été.

1618. **ASTEROMA. ZEÆ.** *West.* — Alb. de l'Est,
— Sur tiges pourries de *Zea maialis*. — Péri-
thèces hémisphériques, filaments rayonnants à la
base. — Aulnay-l'Aître. — AR.

8^e GENRE. — **CICINNOBOLUS.** — *Cesati.*

1618 bis. **CICINNOBOLUS CESATI.** *Sacc.* — Sur
Senecio vulgaris. — Parasite sur *Oidium Erysi-*
phoides. — Automne. — Champs d'Aulnay-l'Aître.
— RR.

9^e GENRE. — **VERMICULARIA.** — *Fries.*

1619. **VERMICULARIA COMPACTA.** *C. et E.* —
Alb. de l'Est. — Sur jeunes sarments morts de

vigne. — Dans les Jardins. — St-Amand. — AC. — Hiver. — Sporules grandes, un peu courbes.

1620. **VERMICULARIA ERYNGII.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Croît abondamment sur les tiges mortes d'*Eryngium campestri.* — Automne-hiver. — Partout.

1621. **VERMICULARIA LILIACEARUM.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Lilium album* desséchées. — Jardins. — St-Amand. — AC. — Sporules elliptiques des *Phoma.*

1622. **VERMICULARIA CULMIFRAGA.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les chaumes de seigle exposés à l'humide en hiver. — Spermogonie de *Pleospora relicina.* — CC. — St-Amand.

1623. **VERMICULARIA GRAMINICOLA.** *West.* — Alb. de l'Est. — A la base des chaumes de *Briza media* et sur les feuilles radicales. — AR. — St-Amand, Aulnay-l'Aître. — Hiver-printemps.

10^e GENRE. — **DOTHIORELLA.** — *Sacc.*

1624. **DOTHIORELLA POPULEA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux morts de *Populus Italica.* — Voir *Dothischiza populea.* — CC. — Automne. — St-Amand.

1625. **DOTHIORELLA ADVENA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de Hêtre et de Frêne. — Spermogonie de *Botryosphaeria advena.* — AC. — Souvent mélangé avec l'état thécasporé. — Bois de St-Amand. — Printemps.

1626. **DOTHIORELLA GLANDULOSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur *Ailanthus glandulosa*. — Branches et rameaux morts. — Accompagne le *Valsa glandulosa*, dont il est la spermogonie. — RR. — Parc d'Ablancourt. — Hiver.

11^e GENRE. — **RABENHORSTIA.** — *Fries.*

1627. **RABENHORSTIA TILIÆ.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Tilia Europæa*, qu'il envahit complètement. ainsi que *Hercospora Tiliæ*, son état ascophore. — CCC. — Jardins. — Parcs. — Hiver, printemps. — Partout.

12^e GENRE. — **PLACOSPHERIA.** — *Sacc.*

1628. **PLACOSPHERIA ONOBRYCHIDIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles languissantes d'*Onobrychis sativa*. — CCC. à la fin de l'Eté. — Champs. — St-Amand, Lisse, etc.

13^e GENRE. — **FUSICOCCUM.** — *Corda.*

1629. **FUSICOCCUM KUNZEANUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux secs de *Carpinus betulina*, en compagnie de *Diaporthe carpini*. — Spermaties fusiformes, grandes ; courtes basides. — AC. — Haies, jardins. — St-Amand. — Printemps.

14^e GENRE. — **PYRENOCHAETA**. *Sacc.*

1630. **PYREN. BERBERIDIS**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux dénudés de *Berberis vulgaris*. — Périthèces couronnés de poils noirs, spermaties à basides arborescentes. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Hiver.
- 1630 bis. **PYREN. BROMI** *Ch. R.* — Sur gaines de *Bromus asper*. — R. — St-Amand.

15^e GENRE. — **CYTOSPORA**. — *Erhenb.*

1631. **CYTOSPORA ROSARUM** *Grev.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Rosa canina*. — Sous épidermique. — Sa présence est dévoilée par les *Cirrhes jaunes* qui paraissent au dehors. — CC. — Bois, haies. — Partout. — Hiver.
1632. **CYTOSPORA RUBESCENS** *Sr.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de *Cerasus avium*. — Spermogonies à *Cirrhes rouges*. — CC. — Bois, Jardins. — Hiver, printemps. — Partout.
1633. **CYTOSPORA VITIS** *Mont.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments morts de *Vitis vinifera*. — Spermogonie de *Valsa vitis*. — CCC. — Fagots de vignes exposés à l'humide. — Printemps.
1634. **CYTOSPORA CHYSOSPERMA** *Sr.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de Peuplier. — *Cirrhes* jaune-orange très longs, spermo-

- gonie de *Valsa nivea*. — CCC. — Hiver, printemps. — St-Amand.
1635. **CYTOSPORA MACROBASIS** Sacc. — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Salix caprea*. — Spermatis portées sur des Basides arborescentes. — Doit être la spermogonie de *Cenangium salignum*. — AR. — Lisse, Bassu. — Automne.
1636. **CYTOSPORA ATRO-NITENS** Chev. — Alb. de l'Est. — Sur écorce de branches de Peuplier et sur tiges de *Rosa canina*. — Péri-thèces hémisphériques, luisants. — CC. — Bois de St-Amand. — Hiver, printemps.
1637. **CYTOSPORA FUGAX** Sr. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Salix caprea*. — CCC. — Printemps. — Partout. — Spermogonie de *Valsa salicina*.
1638. **CYTOSPORA INCARNATA** Sr. — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux de Peuplier. — Cirrhes rose - incarnat ; sporules fusiformes. — AC. — Bois de St-Amand. — Hiver, Automne.
1630. **CYTOSPORA PLATANI** Ch. R. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Platanus orientalis*. — AR. — Bords du Canal à Ablancourt. — Printemps.
1640. **CYTOSPORA LEUCOSPERMA** Sr. — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de Chêne. — Spermogonie de *Valsa Leiphæmia*. — CC. — Bois de La Chaussée, St-Amand, etc. — Hiver, Printemps.

SECT. II. — **PHÆOSPORÉES.** — *Sacc.*

16^e GENRE. — **SPHÆROPSIS.** — *Lév.*

1641. **SPHÆROPSIS Visci.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles et rameaux de *Viscum album*.
— Jadis *Diplodia visci*. — L'absence de cloison
en fait un *Sphaeropsis*. — CCC. — Sur toutes
les feuilles tombées. — Soulanges, La Chaussée,
etc. — Hiver-Printemps.

17^e GENRE. — **CONIOTHYRIUM.** — *Corda.*

1642. **CONIOTHYRIUM OLIVACEUM.** *Bon.* — Alb.
de l'Est. — Sur les sarments de *Hedera helix*
— Bois de St-Amand. — AC. — Hiver.
1643. **CONIOTHYRIUM INSITIVUM.** *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur rameaux de *Berberis vulgaris*
et d'*Ulmus campestris*. — Pycnide de *Valsaria*
insitiva. — CC. — Jardins, bois. — St-Amand.
— Printemps.
1644. **CONIOTHYRIUM FUCKELII.** *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur sarments de *Rubus fruticosus*.
— AC. — St-Amand. — Printemps.
1645. **CONIOTHYRIUM LABURNI.** *Ch. R.* — Alb.
de l'Est. — Sur branches dénudées de *Cytisus*
laburnum. — AR. — Jardins. — St-Amand. —
Hiver.

1646. **CONIOTHYRIUM ULMEUM.** *Karst.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ulmus campestris*, envahis par *Caelosphaeria cupularis*. — AR. — Printemps.
1647. **CONIOTHYRIUM POPULI ?** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de Peuplier. — Sous-cutané. — Sporules brunes munies d'une gouttelette. — RR. — St-Lumier.
1648. **CONIOTHYRIUM CONCENTRICUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Jucca gloriosa*. — Croît en zones concentriques. — CCC. — Jardins. — St-Amand. — Hiver.
1649. **CONIOTHYRIUM SYLVATICUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tige morte d'*Euphorbia sylvatica*. — Bois de la montagne de Reims. — RR. — Automne.
-

SECT. III. — **PHÆODIDYMÉES.** — *Sacc.*

18^e GENRE. — **DIPLODIA.** — *Fries.*

1650. **DIPLODIA TILIÆ.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur branche de *Tilia Europæa* qu'il envahit complètement. — CC. — Parcs et jardins. — Ablancourt, Aulnay-l'Aître. — Printemps.
1651. **DIPLODIA SUBTECTA.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Acer campestre*. — Pycnide de *Didymosphaeria*. — CC. — Bois de St-Amand. — Automne et Printemps.

1652. **DIPLODIA ÆSCULI.** *Lév.* — Alb. de l'Est.
— Sur jeunes rameaux d'*Æsculus*. — Périthèces
4-5 réunis. — C. — St-Lumier, Ablancourt, etc.
— Printemps.
1653. **DIPLODIA VITICOLA.** *Desm.* — Alb. de
l'Est. — Sur sarments de *Vitis vinifera* desséchés. — Périthèces disposés en lignes. — CC.
— Pycnide de *Valsa Vitis*. — Vignes et jardins.
— Partout. — Hiver et Printemps.
1654. **DIPLODIA BAMULICOLA.** *Desm.* — Alb.
de l'Est. — Sur rameaux d'*Evonimus Europeus*.
— Disposé en ligne. — Bois de St-Amand à
St-Lumier. — AR. — Hiver et Printemps.
1655. **DIPLODIA FRANGULÆ.** *Fuck.* — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Rhamnus frangula*.
— Pycnide de *Cucurbitaria rhamni*. — C. — La
Chaussée. — Printemps.
1656. **DIPLODIA RUDIS.** *Desm.* — Alb. de l'Est. —
Sur branches de *Cytisus laburnum*. — C. — Parcs
et jardins. — Hiver et Printemps. — Partout.
1657. **DIPLODIA PETIOLORUM.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur les pétioles des feuilles de *Juglans*.
— Après l'hiver. — St-Amand, Soulanges. — CC.
1658. **DIPLODIA ROSÆ.** *B. et C.* — Alb. de l'Est.
— Sur tige de *Rosa canina*. — Bois et brous-
sailles. — Partout. — Hiver et Printemps.
1659. **DIPLODIA CRATÆGI.** *West.* — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Crataegus Oxyacantha*.
— CC. au Printemps. — St-Amand, etc.
1660. **DIPLODIA HEDERICOLA.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur les feuilles mortes d'*Hedera helix*.

— Forme de larges taches grises. — AC. au Printemps. — St-Amand. — Sur les murs envahis par le lierre.

1661. **DIPLODIA LONICERÆ.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Lonicera Xylostei*. — Pycnide d'*Amphisphaeria Xylostei*. — AC. — Haies et jardins. — Ablancourt, La Chaussée. — Automne.

1662. **DIPLODIA SAMBUCINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le *Sambucus nigra*. — Rameaux dénudés, disposés en lignes. — C. — Printemps, — St-Amand, etc.

1663. **DIPLODIA RIBIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — R. — Sur branches de *Ribes rubrum*. — Les Périthèces ne contiennent que des *Stylospores* incolores qui ne brunissent qu'après leur sortie. — Jardins. — St-Amand. — Été.

1664. **DIPLODIA MICROSPORA.** *B. et C.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Viburnum opulus*. — En compagnie du *Phoma opuli*. — AR. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps.

1665. **DIPLODIA INQUINANS.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et troncs du *Fraxinus excelsior*. — CC. — Dans les bois. — Partout. — Hiver et Printemps.

1666. **DIPLODIA LILACIS.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur les jeunes branches de *Syringa vulgaris*, mortes avant l'hiver. — C. — Printemps. — Jardins. — St-Amand, etc.

1667. **DIPLODIA MELÆNA.** *Lév.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Ulmus campestris*. — Pycnide

de *Cucurbitaria naucosa*. — CC. au Printemps.
— St-Amand, Soulanges.

1668. **DIPLODIA MORI**. *West*. — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux de *Morus alba*. — Périthèces
très petits. — R. — Automne et Printemps.
— Vitry-le-Brûlé.

1669. **DIPLODIA POPULINA**. *Fuck*. — Alb. de
l'Est. — Sur écailles de Peuplier. — Pycnide
d'*Otthia populina*. — Lieux humides des bois,
après l'hiver. — R. — St-Amand.

1670. **DIPLODIA. HEDERÆ**. *Fuckel*. — Alb. de
l'Est. — Sur feuilles et tiges d'*Hedera helix*. —
AR. au Printemps. — St-Amand.

1671. **DIPLODIA STAPHYLÆ**. *Sacc*. — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Staphylea pinnata*.
— AR. — Jardins. — St-Amand. — Hiver.

1672. **DIPLODIA CARPINI**. *Sacc*. — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux de *Carpinus*. — Périthèces en
groupe sur l'épiderme noirci. — Stylospores
incolores étant jeunes, bruns et cloisonnés à la
maturité. — AC. — St-Amand. — Printemps.

1673. **DIPLODIA CORYLI**. *Fuck*. — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux de *Corylus avellana*. — Pycnide
d'*Otthia coryli*. — AC. — Printemps. — St-Amand.

1674. **DIPLODIA FAGINEA**. *Fr*. — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux de *Fagus sylvatica*. — Pycnide
de *Cucurbitaria macrospora*. — C. — Aulnay-
l'Aître. — Printemps. — Les périthèces de cette
espèce sont réunis en groupe de 15 à 20.

1675. **DIPLODIA BETULÆ**. *West*. — Alb. de
l'Est. — Sur écorce de *Betula alba*. — Péri-

thèces de 5 à 10. — Pycnide de *Cucurbitaria conglobata* de Fuckel. — AR. — Printemps. — St-Lumier.

1676. **DIPLODIA JUNIPERI.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Juniperus communis*. — Dans les plantations de Pins sylvestres. — AC. — Printemps. — Soulanges.

1677. **DIPLODIA SAPINEÆ.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs de Pins sylvestres. — Les stylospores sont ordinairement grosses et privées de cloison. — AR. — Automne. — St-Amand.

1678. **DIPLODIA TAXI.** *de Not.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges et feuilles de *Taxus baccata*, disposé en ligne. — C. au printemps, dans les jardins. — St-Amand, La Chaussée.

1679. **DIPLODIA ILICIS.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles et les jeunes branches de *Houx*, mortes et tombées à terre avant l'hiver. — C. — Printemps. — Bois de Sermaize.

1680. **DIPLODIA GENISTÆ.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Genista prostrata*. — Pycnide de *Didymosphaeria Genistæ*. — R. — Lieux incultes près de Bassu.

1681. **DIPLODIA ABROTANI.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Artemisia Abrotanum*. — R. dans les jardins à St-Amand. — Automne et hiver.

1682. **DIPLODIA VINCÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Vinca major* qui ont été envahies pendant l'été par *Puccinia Vincæ*. — R. — St-Amand. — Hiver.

19^e GENRE. — **DIPLODIELLA**. — *Karsten*.

1683. **DIPLODIELLA FIBRICOLA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches dénudées de *Populus Pyramidalis*. — Périthèces presque astomes, stylospores fusoides, à une ou deux cloisons. — R. — Printemps. — St-Amand.

1684. **DIPLODIELLA JUNCII**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes de *Juncus communis*. — R. — Fossés humides entre St-Amand et Lisse. — Hiver.

20^e GENRE. — **BOTRYODIPLODIA**. — *Sacc.*

1685. **BOTRYODIPLODIA JUGLANDICOLA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les branches mortes du Noyer en compagnie du *Cytispora heteracantha*. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Automne.

SECT. IV. — **HYALODIDYMÈES**. — *Sacc.*

21^e GENRE. — **ASCOCHYTA**. — *Lib.*

1686. **ASCOCHYTA PHILADELPHI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles encore vertes de *Philadelphus coronarius*. — AC. en Automne dans les jardins à St-Amand.

1687. **ASCOCHYTA THLASPIDIS**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tige et feuilles de *Thlaspi per-*

foliatum. — CC. dans les lieux incultes. — En Été. — St-Amand, Lisse. — Sporules grandes 0^m,014.

1688. **ASCOCHYTA AMPELINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les jeunes sarments de vigne coupés nouvellement. — Stylospores incolores munies d'une cloison à la maturité. — C. dans les jardins au Printemps. — Partout.

1689. **ASCOCHYTA SORBI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles mourantes de *Sorbus aucuparia* dans les jardins. — St-Amand. — Automne. — CC.

1690. **ASCOCHYTA CLEMATIDINA**. *Thum.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Clematis vitalba*. — A la surface des taches noires de *Eurichora clematidina*. — R. — Ablancourt, bords du canal. — Automne.

22^e GENRE. — **DARLUCA**. — *Cast.*

1691. **DARLUCA FILUM**. *Cast.* — Alb. de l'Est. — Variété *Rumicum*. *Ch. R.* — Sur pustules d'*Uredo rumicum*. Parasite des tiges de *Rumex acetosa*. — AR. — Jardins. — En Été. — St-Amand. — Variété *Clinopodii*. *Sacc.* — Sur *Puccinia clinopodii*. — Parasite des feuilles de *Clinopodium vulgare*. — R. — Aulnay-l'Aître. — Automne.

1692. **DARLUCA VAGANS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Salix caprea* envahies par *Podosporium caprearum*. — RR. — Entre Lisse et Bassu. — Automne.

23^e GENRE. — **DIPLODINA.** — *West.*

1693. **DIPLODINA. SALICIS.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux de *Salix babylonica.* — AR.
— Jardins à St-Amand. — Printemps.
1694. **DIPLODINA ANTIRRHINI.** *Ch. R.* — Alb.
de l'Est. — Sur les capsules d'*Antirrhinum*
majus. — RR. — Jardins. — St-Amand. —
Printemps.
1695. **DIPLODINA. MINIMA.** *Ch. R.* — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Ligustrum vulgare.*
— Stylospores couleur café au lait. — R. —
St-Amand. — Printemps.
-

SECT. V. — **PRAGMOSPORÉES.** — *Sacc.*

24^e GENRE. — **HENDERSONIA.** — *Berk.*

1696. **HENDERSONIA SARMENTORUM.** *West.* —
Alb. de l'Est. — Sur sarment de vignes jeunes.
— CC. — Dans les jardins au Printemps. —
Partout.
1697. **HENDERSONIA FIEDLERI.** *West.* — Alb.
de l'Est. — Sur rameaux de *Cornus sanguinea.*
— Sporules longuement pedicellées. — C. dans
les bois. — St-Lumier, St-Amand. — Printemps.
1698. **HENDERSONIA SYRINGÆ.** *Fr.* — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux de *Syringa vulgaris.* —
Pycnide de *Diaporthe resecans.* — AC. dans les
jardins. — St-Amand. — Printemps.

1699. **HENDERSONIA LONICERÆ.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Lonicera caprifolium*. — AR. — Jardins à St-Amand. — Printemps.
1700. **HENDERSONIA PHRAGMITIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*. — Espèce très petite. — R. — Fossés humides à St-Lumier. — Hiver.
1701. **HENDERSONIA RUBI.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur les sarments de *Rubus fruticosus*. — CC. au Printemps. — St-Lumier, Lisse.
1702. **HENDERSONIA SALICINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — (Var. *Biseptata*. Ch. R.) — Sur les rameaux de *Salix caprea*. — Sporules olive clair 2 cloisons. — AR. — St-Amand. — Printemps.
1703. **HENDERSONIA FOLIORUM.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Fagus sylvatica*. — Périthèces très petits. — R. — Bois de St-Amand. — Printemps.
1704. **HENDERSONIA ACONITI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur pétiole des feuilles d'*Aconit*. — Sporules brunes, à court pédicelle. — R. — Jardins à St-Amand. — Hiver.
1705. **HENDERSONIA HYPERICI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tige d'*Hypericum perforatum*. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps.
1706. **HENDERSONIA JUNIPERI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Juniperus communis*, en compagnie de *Diplodia juniperi*. — R. — Sapinière de St-Amand. — Au Printemps.
1707. **HENDERSONIA LIGUSTRI.** *Ch. R.* — Alb.

de l'Est. — Sur branches de *Ligustrum vulgare*.
— Périthèces sous-cutanés émettant des masses
de sporules. — AR. — St-Amand. — Au
Printemps.

1708. **HENDERSONIA. PLATANI.** *Ch. R.* --
Alb. de l'Est. — Sur branches de Platane. —
Périthèces disposés en rosette. — R. — Ablan-
court. — Printemps.

1709. **HENDERSONIA. LABURNI.** *West.* — Alb.
de l'Est. — Sur rameaux de *Cytisus laburnum*.
— Sporules très petites. — C. — Jardins. —
Printemps. — Partout.

1710. **HENDERSONIA CULMICOLA.** *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur chaumes de *Festuca ovina*. —
Sporules olive-clair cylindriques, 7 cloisons. —
R. — St-Amand. Printemps.

1711. **HENDERSONIA ARUNDINACEA.** *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Sur *Arundo phragmites*. —
Sporules cylindriques, fusiformes : 3 cloisons. —
R. — Fossés du château d'Aulnay-l'Aître. —
Automne.

1712. **HENDERSONIA ARUNDINIS.** *Lib.* — Alb.
de l'Est. — Sur *Phragmites communis*. — Péri-
thèces sous-cutanés, munis de poils bruns à la
base. — AR. — St-Lumier. — Printemps.

1713. **HENDERSONIA DEMAZIERI.** *Mont.* — Alb.
de l'Est. — Sur rameaux de *Platanus orien-
talis*. — Périthèces en rosette, sporules grandes
brun-clair. — R. — Ablancourt, le long du
canal. — Printemps.

25^e GENRE. — **CRYPTOSTICTIS**. — *Fuckel*.

1714. **CRYPTOSTICTIS CYNOSBATI**. *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Sur feuilles mortes du *Rosier*
à cent feuilles. — Périthèces épars sur des
taches brunes, sporules terminées par deux cils
très longs. — R. — Jardins. — St-Amand. —
Automne.

1715. **CRYPTOSTICTIS HYSTERIOIDES**. *Fuck.*
— Alb. de l'Est. — Sur jeunes sarments de
vigne secs. — Disposé en ligne près des bour-
geons. — Sporules à 4 loges, les deux extrêmes
hyalines, garnies d'une arête. unique supérieu-
rement. — R. — St-Amand. — Printemps.

26^e GENRE. — **PROSTHEMIUM**. — *Kunze*.

1716. **PROSTHEMIUM BETULINUM**. *Kunze.* —
Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts du Bou-
leau. — Périthèces sous-cutanées, sporules brunes,
ovoïdes allongées, disposées en faisceau sur un
pédicelle hyalin. — C. — Bois de St-Lumier.
— Printemps.

27^e GENRE. — **STAGONOSPORA**. — *Sacc.*

1717. **STAGONOSPORA CÆSPITOSA**. *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Sur rameaux dénudés de
Sambucus nigra. — Sporules fusiformes bi et
tri-septées. — C. dans les haies à St-Amand.
— Printemps.

1718. **STAGONOSPORA GRAMINELLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Phragmites* notamment à la base. — Sporules cylindriques un peu courbes, munies de 4-6 gouttelettes. — R. — St-Amand. — Été.
1719. **STAGONOSPORA DOLOSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaume d'*Arundo Phragmites*. — Périthèces disposés en lignes. Sporules très grandes, fusiformes pluricloisonnées. — C. — Bords des eaux à St-Amand. — Printemps.
1720. **STAGONOSPORA VEXATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur *Arundo Phragmites*. — Même disposition que la précédente espèce, mais sporules cylindriques recourbées. — C. — Bords des eaux à St-Amand. — Printemps.
-

SECT. VI. — **DICTYOSPORÉES.** — *Sacc.*

28^e GENRE. — **CAMAROSPORIUM.** — *Schulz.*

1721. **CAMAROSPORIUM ROBINIÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Robinia pseudo-acacia*. — Pycnide de *Cucurbitaria elongata*. — C. au printemps, dans les jardins à St-Amand.
1722. **CAMAROSPORIUM XYLOSTEI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes tiges de *Lonicera Xylosteon*. — Conidies d'*Amphishaeria Xylostei*. — AR. — Jardins et parcs. Ablancourt et Soulanges. — Printemps.

1723. **CAMAROSPORIUM MACROSPORUM.** *Sacc.*
— Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de
Philadelphus Coronarius. — R. — Jardins. —
St-Amand. — Automne. — Pycnide de *Diaporthe*
landeghemiae.
1724. **CAMAROSPORIUM VISCI.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur tiges et feuilles de *Viscum album*
en compagnie du *Diplodia Visci*. — R. — Sou-
langes, Aulnay-l'Aître. — Automne, printemps.
1725. **CAMAROSPORIUM CRUCIATUM.** *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Sur petits rameaux secs d'*Ulmus*
campestris. — AC. au printemps. — Bois à St-
Amand. — Sporules arrondies, à cloisons dis-
posées en croix.
1726. **CAMAROSPORIUM PICASTRUM.** *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Sur tiges et racines dénudées.
de *Juniperus communis*. — R. — Plantations
de Pins sylvestres à Soulanges. — Automne.
1727. **CAMAROSPORIUM CORONILLÆ.** Var. **Colu-**
tæ. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les pédon-
cules des fruits vésiculeux du *Colutea arborescens*.
AC. — Jardins. — Printemps. — St-Amand.
1728. **CAMAROSPORIUM BERBERIDIS.** *Ch. R.* —
Alb. de l'Est. — Sur rameaux encore verts de
Berberis vulgaris. — AR. — Jardins et parcs
à St-Amand et Aulnay-l'Aître. — Automne, Hiver.

29^e GENRE. — **DICHOMERA.** — *Cooke.*

1729. **DICHOMERA TILIÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur branches mortes de Tilleul. — Pustules

sous-cutanées, rangées en lignes ; sporules mures, brunes uni-biseptées. — R. — Jardins à Ablancourt. — Printemps.

SECT. VII. — **SCOLECOSPORÉES.** — *Sacc.*

Sporules allongées. filiformes.

30^e GENRE. — **SEPTORIA.** — *Fries.*

1730. **SEPTORIA CYTISI.** *Desm.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles languissantes de *Cytisus laburnum*. — CC. — Automne. — Soulanges, St-Amand.
1731. **SEPTORIA RUBI.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Rubus Cæsius* encore vertes, inséré au milieu de taches blanches, rondes, bordées de brun pourpre. — CC. dans les bois.
— Partout. — Automne.
1732. **SEPTORIA CRATÆGI.** *Kickx.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Cratægus Oxyacantha*.
— CC. mais rarement fertile. — Haies, bois à St-Amand. etc. — Automne.
1733. **SEPTORIA PIRICOLA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles vivantes du Poirier, au centre d'une tache grise, bordée de brun.
— Sporules aculiformes, courbes. — Jardins.
— en Automne. — Partout.
1734. **SEPTORIA HEDERÆ.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — C. sur feuilles d'*Hedera helix*, au centre d'une tache blanche avec bordure brune.
— Printemps. — St-Amand.

1735. **SEPTORIA RIBIS.** *Desm.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Ribes rubrum*. — Spermogonie de *Sphaeria ribis* (Fuckel). — C. — Jardins à St-Amand. — Automne.
1736. **SEPTORIA CORNICOLA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles vertes de *Cornus sanguinea*; inséré sur taches brunes, à contours violacés — C. Dans les haies et bois à St-Amand. — Été.
1737. **SEPTORIA XYLOSTEI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Lonicera Xylosteon*. inséré sur de petites taches blanches, qui brunissent en détruisant les feuilles. — Sporules aculéiformes, à 4-5 cloisons. — AR. — Jardins à St-Amand. — Automne.
1738. **SEPTORIA VIBURNI.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Viburnum opulus*. — Taches rondes, rouge-vineux, centre gris-brun. — C. dans les bois à St-Lumier, Soulanges. — En Été.
1739. **SEPTORIA SALICIS.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Salix viminalis*, à la face inférieure, peu apparente. — Spermogonie de *Sphaerella salicina*. AC. — St-Amand, Lisse. — Automne.
1740. **SEPTORIA POPULI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Populus nigra*. — CC. en Automne. — Partout.
1741. **SEPTORIA CAULINCOLA.** Var. **Ebuli.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Sambucus ebulus*, formant des taches grises, poin-

tillées par les périthèces. — Sporules aculéiformes sans cloison apparente. — R. — Aulnay-l'Aître. — Printemps.

1742 **SEPTORIA. STELLARIÆ.** *Rob. et Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Stellaria media*, inséré au bas de la tige. — C. au Printemps, sur le bord des chemins. — St-Amand. — Printemps.

1743. **SEPTORIA. FICARIÆ.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Ranunculus ficaria*, au centre de taches blanches, entourées d'une zone brune. — C. dans les bois au Printemps. — St-Amand, etc.

1744. **SEPTORIA SEDI.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Sedum téléphium*. — Périthèces anguleux, sur taches grises. — C. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — En Automne.

1745. **SEPTORIA. PODAGRARIÆ.** *Lasch.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Ægopodium Podagraria*, encore vertes. — C. Bois de St-Amand. — R. ailleurs. — Automne.

1746. **SEPTORIA. PETROSELINI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles vivantes du Persil, les parties envahies sont décolorées. — C. au printemps. — Jardins à St-Amand.

1747. **SEPTORIA HERACLEI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les deux côtés des feuilles d'*Heracleum spondylium*. — C. dans les bois, prairies. — Fin de l'été. — Partout.

1748. **SEPTORIA CALYSTEGIÆ.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Convolvulus sepium*

languissantes. — Périthèces à peine visibles, sporules relativement grandes. — C. à St-Amand. — En Automne.

1749. **SEPTORIA. STACHYDIS.** *Rob. et Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Stachys sylvatica*, rarement fertile. — Sporules aculéiformes petites. — C. dans le bois à St-Amand. — En Eté.

1750. **SEPTORIA VIRGAUREÆ,** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles languissantes de *Solidago virgaureæ*. — C. en Automne, dans les bois. — Partout.

1751. **SEPTORIA. POLYGONORUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Polygonum Persicaria*, paraît des deux côtés de la feuille, sur taches pourprées noirâtres. — C. — Bords des eaux. — A l'Automne. — Partout.

1752. **SEPTORIA. CANNABIS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles vertes de *Cannabis sativa*. — AC. en Automne. — Lisse, St-Amand.

1753. **SEPTORIA MERCURIALIS.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Mercurialis annua* encore vertes. — C. en Automne. — Champs et jardins. — Partout.

1754. **SEPTORIA ARI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Arum maculatum*. — Taches jaunâtres, irrégulières, sporules sans cloisons apparentes. — AC. — Bois de St-Amand. — Au Printemps.

1755. **SEPTORIA SCILLÆ.** *West.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Muscari Comosum*, languissantes. — C. au printemps dans les champs et bois à St-Amand.

1756. **SEPTORIA HUMILI.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de Houblon. — Les Périthèces
sont très nombreux et décolorent à peine la
feuille. — AR. — Bois et jardins. — Au printemps
à St-Amand.
1757. **SEPTORIA ALLIORUM.** *West.* — Alb. de
l'Est. — Sur feuilles d'*Allium Porum.* — CC.
— Printemps, Eté. — Dans les jardins. — Par-
tout.
1758. **SEPTORIA. CHÆLIDONII.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur feuilles vertes de *Chælidonium*
majus. — C. en Eté. — St-Amand. — Le long
des haies.
1759. **SEPTORIA ANAGALLIS.** *Ch. R.* — Alb. de
l'Est. — Croît au printemps sur les feuilles
inférieures d'*Anagallis*, au centre d'une tache
jaunâtre. — R. -- Champs et jardins à St-
Amand.
1760. **SEPTORIA VERONICA.** *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur les feuilles inférieures des tiges
de *Veronica hæderefolia*, à peine visible à
l'œil nu ; souvent stérile. — Sporules aculéiformes.
— AC. dans les champs au printemps.
— St-Amand.

31^e GENRE. — **PHLÆOSPORA.** — *Wallr.*

1761. **PHLÆOSP. ULMI.** *Wallr.* — Alb. de l'Est.
— A la face inférieure des feuilles d'*Ulmus*
campestris. — Périthèces 5-10 réunis, sporules
pluriseptées. — CC. — En Automne. — Bois
de St-Amand.

32^e GENRE. **RHABDOSPORA**. — *Mont.*

1762. **RHABD. HELLEBORINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes d'*Helleborus viridis* qu'elle noircit par l'abondance de ses périthèces, à nucléus rose. — AR. — Printemps. — Soulanges.

33^e GENRE. — **SPHÆROGRAPHIUM**. — *Sacc.*

1763. **SPHÆR. MICROPORÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de *Prunus spinosa*. — Spermogonie de *Cenangium Prunastri*, qu'il entoure sur le même support. — AR. — Ablancourt. — Printemps.
1764. **SPHÆR. SERIATUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Bouleau. — Périthèces en cupules, disposés en lignes. Sporules en crochet. — AC. — Hiver et Printemps. — Partout.
1765. **SPHÆR. COLUTEÆ**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes rameaux de *Colutea arborescens*. — R. dans les jardins de St-Amand. — Hiver.
1766. **SPHÆR. CORYLI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Corylus avellana*. — Périthèces à long col, simples ou réunis en faisceau, sporules fusoïdes au sommet de basides arborescentes. — RR. — Automne. — La Chaussée, bords de la Marne.
1767. **SPHÆR. SYRINGÆ**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa Vulgaris*. — Péri-

thèces sphériques, ressemblant à ceux du Genre *Diplodia*. — Sporules aculéiformes, sur des basides de même longueur réunies en faisceau. — R. — Jardins à St-Amand. — Hiver.

34^e GENRE. — **CORNULARIA**. — *Karsten*.

1768. **CORN. BOUDIERI**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — — Sur écorce de Pin. — Périthèces très petits, allongés, noirs, renflés au sommet et couronnés par un globule de sporules aculéiformes. — RR. — Ablancourt. — Au Printemps. — Bull. Soc. des Sc. de Vitry-le-François.

35^e GENRE. — **DILOPHOSPORA**. *Desm.*

1769. **DILOPH. GRAMINIS**. *Desm.* — Alb. de l'Est. — Envahit les épis de blé et des autres graminées, sous forme de cruste noire. — Sporules cylindriques garnies aux extrémités de plusieurs cils. — Très nuisible aux céréales. — Heureusement devient rare aujourd'hui. — St-Amand, St-Lumier, etc. — Été. — Bull. Soc. des Sc. de Vitry-le-François.

36^e GENRE. — **CYTOSPORINA**. — *Sacc.*

1770. **CYTOS. HETERACANTHA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de branches de Noyer mortes. — Périthèces nombreux, plus ou moins allongés en forme de bouteille, remplis de sporules filiformes courbes. — AC. dans de certaines années. — St-Amand, Lisse et Bassu. — Hiver et Printemps.

37^e GENRE. — **MICROPERA**. — Lév.

1771. **MICROPERA DRUPACEARUM**. Lév. — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes et pourrissantes de *Cerasus avium*. — Groupes de Périthèces allongés, jaunâtres ou rosés. Sporules filiformes, — Pycnide de *Cenangium cerasi*. — C. — Hiver, Printemps. — Partout.
-

2^e FAM. — **Nectroidées**. — Sacc.

SECT. I. — **HYALOSPORÉES**. — Sacc.

Sporules ovoïdes ou globuleuses, hyalines.

1^{er} GENRE. — **POLYSTIGMINA**. — Sacc.

1772. **POLYST^{na}. RUBRA**. Sacc. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles vivantes de *Prunus spinosa* et *Domestica*. — Taches d'un beau rouge pourpre. — Sporules filiformes, bifurquées au sommet. — AC. — Soulanges, St-Amand. — Automne. — Etat thécasporé *Polystigma rubrum*.
-

3^e FAM. -- **Leptostromacées.** — *Sacc.*

SECT. I. — **HYALOSPORÉES.** — *Sacc.*

Sporules ovoïdes-globuleuses, hyalines.

1^{er} GENRE. — **LEPTOTHYRIUM.** — *Kunze.*

1773. **LEPT. SCORODONIÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Teucrium scorodonia*, situé à la base. — Basides et sporules très visibles. — Récolté à Charmont dans les bois de Bâtis, en Automne. — AR.
1774. **LEPT. PROTUBERANS.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les stolons de *Potentilla reptans*. — Pustules elliptiques, noires luisantes, sporules courbes acuminées. — R. — Bois de St-Lumier. — Printemps.
1775. **LEPT. LYCOPI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Lycopus Europeus*. — Péri-thèces noirs, aplatis, irréguliers. Sporules semi-lunaires courbes. — AC. -- Fossés humides, bords du Fion. — Printemps.
1776. **LEPT. BERBERIDIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles mortes de *Berberis Vulgaris*, à la face inférieure. — Péri-thèces hémisphériques, puis affaissés au centre; noirâtres. — R. — A Aulnay-l'Aître, en Automne.

2^e GENRE. — **MELASMIA.** — *Lév.*

1777. **MELASM. ACERINA.** *Lév.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles d'*Acer Pseudo-Platanus*. — Taches
noires, luisantes, arrondies, fendillées, laissant
échapper les sporules. — Spermogonie de *Rhy-*
tisma acerinum. — C. dans les bois. — Fin de
l'Été.

3^e GENRE. — **LEPTOSTROMA.** — *Fries.*

1778. **LEPT. CAPREÆ.** *Lib.* — Alb. de l'Est. —
Sur rameaux morts de *Salix Caprea*. — Péri-
thèces aplatis, elliptiques, dont la partie supé-
rieure se détache avant la maturité des sporules.
— C. — Bois de St-Amand, Lisse, etc. —
Automne et Printemps.
1779. **LEPT. SCIRPINUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est. —
Sur chaumes de *Scirpus lacustris*. — Péri-
thèces scutiformes, elliptiques, noirs striés, spo-
rules cylindriques. — AR. — Fossés humides.
St-Lumier. — Automne.
1780. **LEPT. NITIDUM.** *Wallr.* — Alb. de l'Est.
Sur feuilles mortes d'*Iris Pseudo-acorus*. —
Périthèces noirs, elliptiques rangés en ligne. —
AC. — Bois de St-Lumier. — Automne.
1781. **LEPT. CARICINUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Carex riparia*. — Périthèces
noirs, épars; sporules cylindriques un peu cour-

bes. — C'est la spermogonie de *Lophodermium caricinum*. — C. Lieux humides des bois. — Partout.

1782. **LEPT. PTERIDIS.** *Ehrenb.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Pteris aquilina*. — Périthèces irréguliers, allongés, disposés en lignes longitudinales. Sporules cylindriques courtes. — AC. — Bois de Sermaize. — Automne et Printemps.
1783. **LEPT. SPIRÆÆ.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Spirea Ulmaria*. — Périthèces noirs, épars, de forme irrégulière, rarement fertiles. — C. — St-Amand, bords du Fion. — Printemps.
1784. **LEPT. JUNCACEARUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes de *Juncus communis*. — Périthèces elliptiques, épars. Sporules portées par des basides arborescentes ressemblant à de petites clavaires. — AR. — Fossés humides entre Lisse et St-Amand. Hiver.
1785. **LEPT. RUMICIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes de *Rumex acetosa*. — Périthèces petits, épars. — AR. — Jardins, St-Amand. — Fin d'Automne.

4^e GENRE. — **PIROSTOMA.** — *Fries.*

1786. **PIROST. CIRCINANS.** *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*. — Périthèces très nombreux, groupés en cercle. Sporules incolores assez grandes, piriformes. — CC. — Lieux humides. — Partout. — Au Printemps. — Très souvent stérile.

5^e GENRE. — **DISCOSIA**. — *Lib.*

1787. **DISCOSIA ARTOCREAS**. *Fr.* — Alb. de l'Est. — Variété *Oxyacanthæ*. — Sur les feuilles de *Crataegus oxyacantha* tombées à terre, après l'hiver. — Sporules courbes, munies de 3 cloisons et d'un cil, à chaque extrémité. — Var. — AR. — St-Amand. — Printemps.
1788. **DISCOSIA ALNEA**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur la face supérieure des feuilles encore vertes d'*Alnus glutinosa*. — AC. — En automne, mais rarement fertile. — St-Amand et Lisse.
1789. **DISCOSIA CLYPEATA**. *de Not.* — Alb. de l'Est. — Var *Glandicola*. — Sur glands de Chêne pourrissants. — Groupe peu nombreux, appréciable à la loupe seulement. — Périthèces ronds, noirs, déprimés au centre. Sporules semblables à celles de *Disc. Artocreas*. — R. — Bois de St-Amand. — Printemps.

6^e GENRE. — **ENTOMOSPORIUM**. — *Lév.*

1790. **ENTOM. MESPILI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles mourantes de *Mespilus germanica*, disséminé à la surface de taches vertes puis brunes. — Conidie jaune pâle, à 4 ou 5 lobes, disposés en croix, simulant la forme d'un insecte ; chaque lobe est muni de cils droits, incolores. — AC. — Automne à St-Amand.

7^e GENRE. — **LEPTOSTROMELLA**. — *Sacc.*

1791. **LEPT^{lla}. JUNCINA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Croît au printemps à la base des chaumes
morts de *Juncus acutus* et *glaucus*. — Spo-
rules elliptiques, courbes. — En compagnie de
Anthostomella tomicum. — C. — Été. — Lieux
humides. — St-Amand, Lisse.
-

4^e FAM. — **Excipulacées**. — *Sacc.*

SECT. — **HYALOSPORÉES**. — *Sacc.*

Sporules globuleuses, ovoïdes, hyalines.

1^{er} GENRE. — **GODRONIELLA**. — *Karsten*.

1792. **GODRON. JUNCIGENA**. — *Karst.* — Alb.
de l'Est. — Sur chaume d'*Arundo phragmites*.
— Périthèces épars, hémisphériques, aplatis,
noirs, sillonnés de côtes moins saillantes que
dans le type thécasporé *Godronia* dont il est
la spermogonie. — Spermaties aculéiformes,
courbes, pluriseptées. — RR. — Printemps.

2^e GENRE. — **HETEROPATELLA**. — *Fuckel*.

- 1793 **HETER. LACERA**. *Fuckel*. — Alb. de l'Est.
— Sur tiges de *Linaria striata*. — Périthèces

sphériques, puis cupuliformes, sporules fusiformes, courbes, munies d'arêtes aiguës aux extrémités. — C. — Bois de St-Amand. — Printemps.

1794. **HETER. CHAILLETII.** *Karsten.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Daucus carota*. — Périthèces noirs, striés, affaissés au centre ; sporules linéaires. *Spermogonie d'Heterosphaeria.* — C. — Champs, bois. — Partout. — Automne.

3^e GENRE. — **DOTHICHIZA.** — *Lib.*

1795. **DOTH. POPULINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les rameaux de peuplier. — Tubercules noirs verdâtres, pluricellulaires, contenant des sporules rondes, incolores, portées sur des basides droites. — CC. — Automne. — En temps humides. — Partout.

4^e GENRE. — **DISCELLA.** — *Sacc.*

1796. **DISC^{la}. CARBONACEA.** *B. et Br.* — Alb. de l'Est. — AC. — Sur rameaux de *Salix caprea*. — Périthèces ronds, aplatis, noirs, luisants, nucléus brun ; sporules blanches, uniseptées, elliptiques. — Aulnay-l'Aître. — Automne.

5^e GENRE. — **AMEROSPORIUM.** — *Speg.*

1797. **AMER. CONGREGATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Euphorbia sylvatica*. — Périthèces hémisphériques, noirs, puis en cupules, munis de quelques poils raides ; sporules

fusiformes, allongées, portées sur de longues basides. — RR. — Forêt d'Epernay, — Été.

1798. **AMER. CARICUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de *Carex glauca*. — Périthèces sphériques puis aplatis, couverts de poils noirs raides ; sporules en fuseau, jaunes, puis brunes.
— AR. — Printemps. — De St-Amand à Bassu.

6^e GENRE. — **DINEMASPORIUM.** — *Lev.*

1799. **DIN. GRAMINUM.** *Lév.* — Alb. de l'Est. —
Sur tiges de graminées diverses. — Périthèces en cupules, épars, noirs, couverts de poils raides, à disque blanc, dilaté par l'humide ; sporules cylindriques, munies de deux gouttelettes et d'un long cil à chaque extrémité. — C. — Automne, printemps. — Partout.
1800. **DIN. STRIGOSUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur bois pourri de Pins, vieilles palissades de jardins. — Périthèces noirs, à poils courts, nombreux, disque blanc. — CC. — Automne, printemps. — Partout.
1801. **DIN. PURPURASCENS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de Saule. — De couleur violacée à l'état frais, couvert de poils noirs ; disque rose, très ouvert. Sporules plus courtes que dans les espèces précédentes. — AR. — Bois et jardins à St-Amand. — Automne.

7^e GENRE. — **PILIDIUM.** — *Kunze.*

1802. **PILID. FULIGINOSUM.** *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Salix alba*. — Périthèces

cupuliformes, nombreux, formant des taches arrondies, qui précèdent l'apparition du *Rhytisma maximum* sa forme thécasporée. — Sporules fusiformes, allongées, à 3 cloisons. — R. — Bords de la Marne. — Soulanges. — Automne.

8^e GENRE. — **PLEOSPOROPSIS**. — *Ærst.*

1803. **PLEOS. STROBILINA**. *Auersw.* — Alb. de l'Est. — Situé entre les bractées des Cônes de *Pinus abies*. — Espèce ambiguë suivant *Saccardo* *Uredinée* suivant *Max. Cornu*. — RR. dans la Marne. — Château d'Ablancourt. — Automne.

MÉLANCONIÉES. — *Berk.*

*Champignons privés de Périthèces et de Thèques ;
Conidies portées sur des basides variées, issues
d'un substratum proligère.*

SECT. I. — **HYALOSPORÉES**. — *Sacc.*

*Conidies globuleuses, ovoïdes, ou cylindriques-courtes,
hyalines.*

1^{er} GENRE. — **HAINESIA**. — *Ell.*

1804. **HAIN. RUBI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Rubus cæsius*. — Tubercules discoïdes, rouge-orangé, formés de filaments arbo-

rescents, terminés par des sporules elliptiques courbes. — R. — Bois de St-Lumier. — Fin de l'été.

2^e GENRE. — **GLÆOSPORIUM.** — *Desm.*

1805. **GLÆOS. RIBIS.** *Mont.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Ribes rubrum* languissantes. — Conidies semilunaires, pédicellées. — AC. — Jardins. — Automne. — St-Amand.
1806. **GLÆOS. QUERCINUM.** *Harkn.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Chêne encore vertes. — Tubercules roses, épars; conidies incolores, ovales, pédicellées. — R. — Été. — St-Amand.
1807. **GLÆOS. AMPELOPHAGUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — *Anthracnose.* — Sur rameaux, vrilles, feuilles et fruits de la Vigne. — Sa présence occasionne la mort des tissus. — Groupes de conidies, elliptiques, incolores, situées sur des taches brunes à centre blanc. — Jusqu'alors R. dans la Marne. — Fin de l'été. — Près de Reims.
1808. **GLÆOS. GALLARUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur la galle des feuilles de Chêne. — Amas de conidies, sous l'épiderme noirci. Conidies cylindriques à 6 sporules. — R. — Bois de St-Amand à Aulnay. — Printemps.
1809. **GLÆOS. PHASEOLI.** — *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur gousses et tiges de Haricot. — Amas de conidies, oblongues ovoïdes, pédicellées, recouvert par l'épiderme soulevé; par-

ties soulevées, brunes, munies de quelques poils.
— AC. — Jardins à St-Amand. — Espèce nuisible.

3^e GENRE. — **MYXOSPORIUM.** — *Link.*

1810. **MYXOS. ULMI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'Orme. — Pustules rougeâtres, sous-cutanées, formées de conidies elliptiques, longuement pédicellées; l'épiderme se fend en lanière pour leur livrer passage. — AR. — Automne. — St-Amand.
1811. **MYXOS. DEPLANATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les branches mortes du Charme. — Tubercules verdâtres sous-cutanés. — Conidies incolores cylindriques un peu courbes, pédicellées. — R. — St-Amand. — Printemps.

4^e GENRE. — **MELANOSTROMA.** — *Corda.*

1812. **MELAN. MINUTUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur sarment de *Vigne-Vierge*. — Tubercules noires sous-cutanés à disque blanc. Conidies fusiformes, pédicellées. — R. — St-Amand. — Jardins. — Printemps.
1813. **MELAN. FUSARIOIDES.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa Vulgaris*. — Tubercules hémisphériques, aplatis au sommet, sous-cutanés, de substance noirâtre à disque blanc, à point noir central; conidies incolores, cylindriques, très courtes, disposées en chapelet. — AC. au Printemps. — Jardins à St-Amand.

5^e GENRE. — **CYLINDROSPORIUM**. — *Unger*.

1814. **CYLIND. RANUNCULI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les feuilles de *Caltha Palustris* encore
vertes. — Amas de conidies, cylindriques 4-3
septées. — C. dans les bois au Printemps. —
St-Amand.
1815. **CYLIND. MYOSOTIDIS**. *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur feuilles de *Symphytum officinale*.
— Groupe de conidies, cylindriques, très allon-
gées, disposées en faisceau, de couleur blanche.
— C. en Automne à Soulanges.

6^e GENRE. — **CRYPTOSPORIUM**. — *Corda*.

1816. **CRYPT. NEESII**. *Corda*. — Alb. de l'Est. —
— Sur branches d'*Alnus glutinosa*. — Pustules
sous-cutanées, conidies fusoïdes, recourbées. —
AC. — Bois de St-Amand. — Hiver.

7^e GENRE. — **LIBERTELLA**. — *Desm.*

1817. **LIBERTELLA FAGINEA**. *Desm.* — Alb. de
l'Est. — Sur écorce de Hêtre. — Tubercules
rouges, entourés d'un duvet blanc, formé par
des conidies filiformes. fusoïdes, recourbées,
issues de filaments arborescents. — Conidies de
Nectria gibbera (Fuckel). — C. — Bois. —
Partout.

8^e GENRE. — **NÆMASPORA.** — *Pers.*

1818. **NÆMASPORA MICROSPORA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Hêtre. — Tubercules orangés. sous-cutanés ; conidies cylindriques, arquées, longuement pédicellées. — C. — Bois à Aulnay, etc.

9^e GENRE. — **MELANCONIUM.** — *Link.*

1819. **MELAN. HEDERÆ.** *Pr. F.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments d'*Hedera helix*. — Tubercules noirs, formés de conidies brunes, pédicellées, ovales, noircissant le support. — C. dans les bois au printemps.
1820. **MELAN. JUGLANDINUM.** *Kunze.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et troncs morts de Noyer. — Tubercules noirs, formés de conidies ovoïdes, brunes pédicellées. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.
1821. **MELAN. RAMULORUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux d'*Alnus glutinosa* et de *Carpinus*. — Tubercules noirs, saillants, formés de conidies elliptiques brunes, pédicellées. — CC. — Bois. — Automne, Printemps. — Partout.
1822. **MELAN. SPHÆROSPERMUM.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes d'*Arundo phragmites*. — Amas de Conidies brunes, sphériques.

sans pédicelle apparent, noircissant le support.
— CC. — Printemps. — Bords des eaux. —
Partout.

10^e GENRE. — **THYRSIDIUM**. — *Mont.*

- 1823 **THYRS. BOTRYOSPORUM**. *Mont.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Charme en compagnie de *Melogramma Bulliardi*. — Tubercules noir-mat formés par les faisceaux de filaments rameux du *Thyrsidium*, surmontés chacun par un glomérule arrondi de conidies, brunes sphériques. — R. — Chantiers de Vitry-le-François. — Automne.

11^e GENRE. — **DIDYMOSPORIUM**. — *Nees.*

1824. **DIDYM. CARPINI**. *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Carpinus*. — Pustules noires sous-cutanées, déchirant l'épiderme, formées par des masses de conidies, brunes elliptiques allongées, uniseptées. — AC. — Haies, charmilles, jardins à St-Amand, etc. — Printemps.

12^e GENRE. — **MARSONIA**. — *Fisch.*

1825. **MARSONIA JUGLANDIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Noyer. — Amas de sporules disséminées sur des taches brunes irrégulières composées de conidies incolores semi-lunaires. — AC. — Été, hiver. — Spermogonie de *Gnomonia leptostyla*.
1826. **MARSONIA POTENTILLÆ**. *Fisch.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Potentilla reptans*.

— Conidies sous-cutanées, allongées, biloculaires, lobe supérieur plus large, et recourbé. — Spermogonie de *Stigmatea potentillarum*. — R. — Près de Bassu. — Été.

13^e GENRE. — **STILBOSPORIA**. — Pers.

1827. **STILBOS. ANGUSTATA**. Pers. — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux d'*Acer pseudo-platanus*. — Amas de conidies sous-cutanées, oblongues, brunes, à 3 cloisons. Vient aussi sur *Carpinus*. — Etat conidien de *Pseudo valsa macrospora*. — C. dans les bois. — Automne. Printemps.

1828. **STILBOS. MACROSPERMA**. Pers. — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de Chêne. — Pustules sous-cutanées, formées par des conidies oblongues, ellipsoïdes, brunes, à 3-4 cloisons longuement pédicellées. — AC. — Printemps. — Dans les bois.

1829. **STILBOS. CRATÆGI**. Ch. R. — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Cratægus oxyacantha*. — Conidies oblongues ou piriformes, brun-verdâtre à 3 cloisons. — RR. — Près d'Ablancourt. — Printemps.

14^e GENRE. **CORYNEUM**. — Nees.

1830. **CORYNEUM UMBONATUM**. Nees. — Alb. de l'Est. — Sur branches de Chêne. — Pustules noires, disciformes, placées sur un strome brun. — Conidies fusoïdes 5-8 cloisons, brun-olive. — R. — Bois de Sermaize. — Printemps.

- 1830 bis. **CORYNEUM. KUNZEI.** — Var. **Castanæ.**
Sacc. — Sur rameaux de Châtaignier. — Accom-
pagne le *Melanconis modonia* dont il est la
forme conidienne. — Bois de la montagne de
Reims. — RR.
1831. **CORYNEUM NOTARISIANUM.** *Sacc.* —
Alb. de l'Est. — Sur branches de *Betulus alba* ;
— Amas de conidies, formant des pustules sous-
cutanées, discoïdes ; conidies fusiformes, à 5-6
cloisons, brunes étant mûres. — Etat conidien
de *Pseudo valsa lanciformis*. — AC. — Bois de
St-Lumier. — Printemps.
1832. **CORYNEUM FUSARIOIDES.** *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur branches mortes de *Rhamnus*
frangula. — Conidies brunes, cylindriques,
arquées, extrémité hyaline. — RR. — La
Chaussée. — Printemps.
1833. **CORYNEUM FOLIICOLUM.** *Fuck.* — Alb.
de l'Est. — Sur feuilles de *Crataegus oxya-*
cantha. — Amas de conidies, oblongues, fusi-
formes, 8-10 cloisons de couleur brun-olive,
recourbées, formant des taches superficielles.
— R. — Bois de Vavray. — Automne.

15^e GENRE. — **SCOLECOSPORIUM.** — *Lib.*

1834. **SCOLECOSP. FAGI.** *Lib.* — Alb. de l'Est.
Sur branches mortes de *Fagus sylvatica*. —
Amas de conidies fusiformes très allongées,
hyalines aux extrémités, brunes étant mûres,
munies de 8 à 12 cloisons. — Conidies de

Massaria macrosperma. — CC. — Hiver et printemps. — Partout.

16^e GENRE. — **ASTEROSPORIUM**. — *Kunz.*

1835. **ASTER. HOFFMANNI**. *Kunze.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les branches mortes de Hêtre. — Pustules sous-cutanées, formées par des conidies brunes, en forme d'étoile. à 4 rayons coniques, portées par des pédicelles hyalins cloisonnés. — CC. dans les bois au printemps. — Partout.

17^e GENRE. — **PESTALOZZIA**. — *De Not.*

1836. **PEST. ROSÆ**. *West.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Rosa Canina*. — Conidies fusiformes, 3 cloisons, loge supérieure hyaline, terminée par 3 arêtes divergentes, pédicelle allongé. — CC. — Printemps. — Partout.

1837. **PEST. CONIGENA**. *Lév.* — Alb. de l'Est. — Sur bractées de cônes de *Pinus abies* et *Picea*. — Conidies fusoïdes, terminées par 4 ou 5 arêtes. — C. — Ablancourt, Soulanges, etc. — Hiver.

1838. **PEST. FUNEREA**. *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Thuya*. — Conidies fusoïdes allongées, munies de 4-5 cloisons et 3 ou 4 arêtes. — CC. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.

1839. **PEST. TRUNCATA**. *Lev.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Hypericum Perforatum*. — Conidies brunes, 3 cloisons, loge supérieure hya-

- line à 2 arêtes bifurquées : avec l'âge, les loges extrêmes disparaissent et la conidie reste tronquée. — R. — Bois de St-Lumier. — Printemps.
1840. **PEST. HYPERICINA.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Hypericum Perforatum*. — Sporidies cylindriques, courbes, triseptées, munies de 2 ou 3 arêtes, couleur ocre-jaune clair. — R. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps.
1841. **PEST. MONOCHÆTA.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de Hêtre. — Conidies réunies en tubercules, brunes, munies de 4 à 5 cloisons, fusiformes allongées ; très long pédicelle ; loge supérieure hyaline, terminée par une seule arête. — AC. — Bois d'Aulnay-l'Aître. — Printemps.
1842. **PEST. POTENTILLÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Potentilla reptans* desséchées à la surface du sol après l'Hiver. — Conidies fusoides, 3 cloisons ; loge supérieure munie d'aigrette plus longue que la Conidie pédicellée. — RR. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps.
1843. **PEST. PEZIZOIDES.** *De Not.* — Alb. de l'Est. — Sur sarments morts de *Vitis vinifera*. — Amas de Conidies disciformes pézizoïdes, conidies fusoides, à 5 loges et 5 arêtes. — AR. — Jardins à St-Amand. — Hiver.
1844. **PEST. LILIORUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Lilium candidum* après l'hiver. Groupes de conidies à la base de la tige. — Station exceptionnelle non encore observée.

18^e GENRE. — **SEPTOGLÆUM**. — *Sacc.*

1845. **SEPTOGL. ACERINUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les feuilles d'*Acer Campestre* et *Pseudo-Platanus*. — Tubercules épars sur des taches grisâtres en forme de disque, couleur d'ambre. conidies en fuseau, unicloisonnées portées par de courtes basides. — R. — Bois de St-Amand.
— Automne.

19^e GENRE. — **STEGANOSPORIUM**. — *Cord.*

1846. **STEGAN. PIRIFORME**. *Corda.* — Alb. de l'Est. -- Sur *Acer Pseudo-Platanus*. — Amas de Conidies recouvert par l'épiderme ; conidies piriformes à 4 ou 5 cloisons transversales et 1 ou 2 longitudinales. — C. - Printemps. — Partout.
1847. **STEGAN. COMPACTUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes rameaux d'Orme morts. — Conidies brunes, oblongues, à 4 ou 6 cloisons transversales et 1 longitudinale, cellule médiane souvent renflée ; pédicelle hyalin. — Conidies de *Melanconis Berkeleyi*. — AC. après l'hiver. — Bois à St-Amand.
1848. **STEGAN. CELLULOSUM**. *Corda.* — Alb. de l'Est — Sur rameaux morts de *Tilia*. — Amas de conidies brunes, piriformes, à 5-7 cloisons murales. — Soulanges. — Printemps.

20^e GENRE. — **PHRAGMOTRICHUM**. — *Kunze*.

1849. **PHRAGM. CHAILLETII**. *Kunze*. — Alb. de l'Est. — Sur bractées de cônes de *Pinus abies*. — Amas de conidies Rhomboïdes, murales, brunes, disposées en chapelet, séparées l'une de l'autre par 2 ou 3 cellules étroites hyalines. — CC. en Automne et au Printemps. — Parc d'Ablancourt et jardins.

HYPHOMYCÈTES. — *Martius*.

Champignons privés de périthèces et de thèques, consistant en filaments plus ou moins développés et en conidies libres.

1^{re} FAM. — **Mucédinées**. — *Link*.

Filaments pâles ou légèrement colorés, dressés puis s'affaissant, non réunis en fascicule ; conidies incolores.

SECT. I. — **AMÉROSPORÉES**. — *Sacc*.

1^{er} GENRE. — **CHROMOSPORIUM**. — *Corda*.

1850. **CHROMOSP. ROSEUM**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur chapeau d'agaric en putréfaction. — Petits tubercules roses, formés de conidies

elliptiques ou globuleux, ayant l'apparence d'un *Ascobolus carneus*. — AR. — Automne.

2^e GENRE. — **MICROSTROMA**. — *Niessl*.

1851. **MICR. ALBUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles de Chêne. — Conidies ovales, oblongues, pédicellées, réunies en faisceau épars, hyalines. — RR. — Automne. — Aulnay-l'Aître.

3^e GENRE. — **OOSPORA**. — *Wallr.*

1852. **OOSP. MICROCARPA**. *Schulz.* — Alb. de l'Est. — Sur aiguilles de Pin sylvestre, pourrissantes. — Filaments courts, simples, terminés par des conidies rondes-ovales, hyalines, disposées en chapelet. — CC. — Automne, Hiver doux. — Partout.
1853. **OOSP. EPIMYCES**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur Périthèces de *Lasiosphaeria crinita*. — Flocons blancs de filaments, composés de conidies elliptiques disposées en chapelet. — RR. — Automne. — St-Amand.
1854. **OOSP. ÆQUIVOCA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur racines coupées de Frêne. — Flocons de filaments blancs formés par de longs chapelets de conidies elliptiques apiculées. — R. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Automne.
1855. **OOSP. CRUSTACEA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Flocons denses crustacés, passant du blanc au rouge minium, formés de filaments terminés

par des conidies cuboïdes-globuleuses en chapelet. — Sur les vieux fromages, dans les caves.
— CC.

1856. **OOSP. VIRESCENS.** *Wallr.* — Alb. de l'Est
— Sur feuilles de Peuplier et de Saule, pourrissant sur terre. — Flocons denses de filaments verdâtres, allongés tortueux, composés de conidies ovoïdes-oblongues, vertes, en chapelet.
— CC. — Automne. — Bois de St-Amand.

1857. **OOSP. SULPHUREA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur le pain moisi. — Flocons arachnoïdes couleur de soufre, composés de filaments rampants terminés par des conidies ovales, jaunes, en chapelet. — CC. — Lieux humides. — Partout.

1858. **OOSP. SPHÆRELLÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur Périthèces de *Nectria Dahliæ*. (Ch. R.) dont il est l'appareil conidien. — Touffes blanches de filaments courts, terminés par des conidies ovoïdes, d'abord en chapelet, puis éparses, hyalines. — RR. — Jardins à St-Amand. — Automne.

1859. **OOSP. CORII.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur lanières de cuir, abandonnées dans les lieux humides. — Touffes épaisses et larges de filaments tortueux, rameux, composés en grande partie, par des conidies cuboïdes, en chapelet rouge-clair. — R. — Printemps. — St-Amand.

1860. **OOSP. UREDINIS ?** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur la face inférieure des feuilles de *Rubus*.
— Touffes de filaments simples, jaunes-hyalins

composés de conidies courtes, cuboïdes. — AR.
— Automne. — St-Amand.

4^e GENRE. — **FUSIDIUM**. — *Link*,

1861. **FUSIDIUM PARASITICUM**. — Alb. de l'Est.
— Appareil conidien de *Xylaria hypoxylon*. —
Conidies blanches, fusiformes, portées sur des
basides courtes, le sommet des *Xylaria* envahis
est comprimé, digité et blanc pulvérulent.
— CC. — Sur les bois pourris. — Automne,
Printemps. — Partout.

5^e — GENRE. — **MONILIA**. — *Pers*.

1862. **MON. FRUCTIGENA**. *Pers*. — Alb. de l'Est.
— Sur les fruits pourrissants, de poires, de
pêches, cerises, etc. — Flocons compacts, blancs,
jaunâtres, composés de filaments courts en fais-
ceau, terminés par de longs chapelets de coni-
dies ovoïdes, concolores. — CC. — Automne,
Hiver. — Partout.
1863. **MON. SITOPHILA**. *Sacc*. — Alb. de l'Est.
— Sur mie de pain corrompue, ressemble beau-
coup à *Oospora Sulphurea*, dont il se distingue
par sa couleur rose-orangée. — AC. — Lieux
humides. — Partout.

6^e GENRE. — **CYLINDRIUM**. — *Bon*.

1864. **CYLIND. GRISEUM**. *Bon*. — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de Chêne humides et pourris-

santes. — Formant des taches grises, étendues, composées de conidies cylindriques, hyalines. — CC. — Automne. — Partout.

1865. **CYLIND. FLAVO-VIRENS.** *Bon.* — Alb. de l'Est. — Taches planes, étendues vert-jaunâtre, composées de conidies cylindriques-fusoïdes, jaunes, hyalines. — Sur feuilles pourrissantes de Chêne et de Hêtre. — CC. — Automne. — Partout.

7^e GENRE. — **OIDIUM.** — *Link.*

1866. **OIDIUM ERYSIPOIDES.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles vivantes d'*Humulus*, de *Papaver Somniferum*, etc. — Filaments stériles, formant un tissu arachnoïde, et filaments fertiles dressés, courts, terminés par des conidies ovales, en chapelet 4-8 conidies. — CC. — Jardins. — Automne et Été. — Partout.
1867. **OIDIUM TUCKERI.** *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et fruits vivants de la Vigne. — Filaments arachnoïdes, blancs, très nombreux. Filaments fertiles courts, terminés par 2 ou 3 conidies ovoïdes en chapelet. — Parasite très nuisible. — CC. — Fin de l'Été. — Partout.
1868. **OIDIUM MONILIOIDES.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur la face supérieure des feuilles de graminées *Hordeum murinum*, *Triticum repens*, etc. — Taches velues d'un blanc-rosé, composées de filaments la plupart fertiles, terminées par des conidies ovoïdes, incolores, en chapelet dressé. — C. — Fin de l'Été. — Partout.

1869. **OIDIUM LEGUMINOSARUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Au sommet des tiges et sur les graines de Sainfoin. — Filaments arachnoïdes et filaments fertiles plus courts, terminés par 2 ou 3 conidies ovales, ponctuées. — La présence de cet *Oidium* n'influence en rien la germination et la qualité de la graine et cependant en empêche la vente. — Récolté à Reims par le Dr Thomas et communiqué par le Dr Jolicœur. — Fin de Juillet.

8^e GENRE. — **ÆDOCEPHALUM.** — *Preuss.*

1870. **ÆDOCEPH. AGARICINUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur chapeau d'*Agaric*. — Groupe fasciculé de filaments hyalins, terminés par un capitule jaune-d'ocre, formé par des conidies ovales jaunâtres, en chapelet, insérées au sommet du filament un peu renflé et garni de petites verrues. — AR. — Sermaize. — Automne.

9^e GENRE. — **RHOPALOMYCES.** — *B. et Br.*

1871. **RHOP. CANDIDUS.** *B.-Br.* — Alb. de l'Est. — Sur le crottin de cheval. — Filaments simples, dressés, continus, terminés par un renflement sphérique aréolé, sur lequel sont insérées les conidies piriformes hyalines formant un capitule sphérique. — AR. — St-Amand. — Printemps.

10^e GENRE. — **HAPLOTRICHUM**. — *Link.*

1872. **HAPL. CAPITATUM**. *Link.* — Alb. de l'Est.
— Sur écorce de Pin sylvestre humide. — Groupe
de filaments blancs, dressés, fasciculés, septés,
renflés au sommet, conidies ovoïdes, insérées
sur de petites verrues et formant un capitule
blanc sphérique, qui jaunit en vieillissant. —
AC. — Automne. — St-Amand.

11^e GENRE. — **BOTRYOSPORIUM**. — *Corda.*

1873. **BOTRY. PULCHRUM**. *Cord.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges de *Dahlia* pourrissantes dans les
lieux humides. — Touffe de filaments blancs,
dressés, simples ou dichotomes. Sporophores
insérés en forme d'épi, le long des filaments,
terminés par de petites verrues sur lesquelles
sont insérées les conidies ovoïdes agglomérées en
capitule d'un beau blanc. — AC. — Automne,
Hiver. — St-Amand.

12^e GENRE. — **COEMANSIELLA**. — *Sacc.*

1874. **COEMANS. ALABASTRINA**. *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur le crottin de cheval. — Fila-
ments simples, dressés terminés par un capitule
sphérique d'abord, puis ouvert, à disque central
fructifère, composé de 10 à 15 segments radiés,
dont l'extrémité bifide forme une couronne
comme les sépales d'une marguerite. Conidies

ovoïdes insérées sur de petits mamelons basilaires. — AR. — Automne. — St-Amand.

13^e GENRE. — **CEPHALOSPORIUM**. — Cord.

1875. **CEPHAL. ACREMONIUM**. Corda. — Alb. de l'Est. — Sur tiges sèches d'*Heracleum*. — Filaments couchés, rameux, émettant des filaments, courts, dressés, aigus, terminés par des capitules sphériques de conidies hyalines, ovales, très nombreuses. — AR. — Automne. — St-Amand.

1876. **CEPHAL. HERACLEI**. Ch. R. — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Heracleum spondylium*. — Filaments rampants lâches ; filaments dressés assez longs, portant au sommet un capitule sphérique de conidies incolores. — Très voisin de *Cephal. Macrosporum*. — AC.

14^e GENRE. — **TRICHODERMA**. — Pers.

1877. **TRICH. LIGNORUM**. Karz. — Alb. de l'Est. — Sur les troncs d'arbres exposés à l'humidité. — Petites touffes arrondies de filaments blancs, à l'extérieur, vert-foncé au centre, rameux et septés, les filaments blancs sont stériles, les verts sont fertiles et porteurs de conidies, petites, ovales et vertes à leur maturité. Conidies de *Hyprocrea rufa*. — CC. — Automne. — Partout.

15^e GENRE. — **ASPERGILLUS**. — *Mirh.*

1878. **ASPERGILLUS GLAUCUS**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les végétaux et les substances putrescibles. — Filaments stériles rameux, les fertiles dressés simples renflés en vésicules sphériques au sommet. Conidies portées par des sterigmates cylindriques, et disposées en chapelet couleur vert-glaucue. Conidies d'*Eurotium herbariorum*. — CC. — Partout.
1879. **ASPERGILLUS CANDIDUS**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur les plantes sèches et les champignons. — Caractères semblables à ceux de l'espèce précédente à part l'absence de couleur verdâtre. — CC. — Partout.

16^e GENRE. — **AMBLIOSPORIUM**. — *Fries.*

1880. **AMBL. ALBUM**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur le chapeau d'un *Polypore apode*, depuis quelque temps à la cave, — Petites touffes blanches composées de filaments dichotomes, terminés chacun par de nombreuses basides. disposées en ombelles. Chaque baside émet une conidie ovale, qui se détache à la maturité. — RR. Automne. — St-Amand.

17^e GENRE. — **PENICILLIUM**. — *Link.*

1881. **PENICIL. GLAUCUM**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les végétaux et les substances organiques. — Groupes de filaments

les uns stériles, rampants. les autres fertiles, dressés, divisés au sommet en deux rameaux, qui se subdivisent en de nombreux ramuscules, réunis en faisceau, et terminés chacun par un chapelet de conidies ovales, vert-glaucue. — CC. — Partout.

1882. **PENICIL. CANDIDUM.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles, les bulbes des plantes et les champignons. — Caractères de la précédente espèce, s'en distingue par l'absence de couleur. — CC. — Partout.

18^e GENRE. — **HAPLARIA.** — *Link.*

1883. **HAPL. GRISEA.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur tige de plantes herbacées, et sur fruits en décomposition. — Touffe de filaments dressés, cloisonnés, bifurqués au sommet, grisâtres, garnis dans leur trajet de glomérules sphériques de conidies ovales incolores. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.

19^e GENRE. — **CYLINDROTRICHUM.** — *Bon.*

1884. **CYLIND. OLIGOSPERMUM.** *Bon.* — Alb. de l'Est. — Sur les écailles de bois blanc humides. — Taches velues, grisâtres, formées par des filaments dressés, rigides, noirâtres, septés. — Les conidies de cette espèce sont incolores, cylindriques, munies de 4 cloisons et 5 sporules; les jeunes filaments sont terminés par des conidies en capitule blanc. — AC. en Automne. — St-Amand et St-Lumier.

20^e GENRE. — **ACREMONIUM**. — *Link.*

1885. **ACREM. ALTERNATUM**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les écailles et racines humides et mises en tas. — Filaments arachnoïdes, rampants, munis de rameaux alternes, simples, terminés chacun par une conidie ovale incolore. — CC. — Partout.
1886. **ACREM. VERTICILLATUM**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Même station et même caractère que l'espèce précédente ; en diffère seulement par ses rameaux disposés en verticilles. — CC. — Partout. — Automne.

21^e GENRE. — **RHINOTRICHUM**. — *Corda.*

1887. **RHIN. SIMPLEX**. *Cord.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de Pin sylvestre. — Taches noires, veloutées, composées de filaments rampants, émettant des rameaux dressés, noirs, septés, garnis dans leur longueur de conidies brunes, disposées en verticille. — R. — St-Amand, Soulanges. — Automne.

22^e GENRE. — **SPOROTRICHUM**. — *Link.*

1888. **SPOROTR. DENSUM**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur le thorax des coléoptères. — Touffes blanches, de filaments sinueux, très denses parsemés de conidies sphériques incolores. — AC. — Fin de l'Été. — St-Amand.

1889. **SPOROTR. SCOTOPHILUM.** *Ehrenb.* — Alb. de l'Est. — Sur les crottes de belettes. — Touffes de filaments rampants, rameux, les fertiles dressés, simples, entremêlés de conidies rondes-ovales, couleur minium. — AR. — St-Amand. — Automne.

23^e GENRE. — **BOTRYTIS.** — *Mich.*

1890. **BOTRYTIS CARNEA.** *Schum.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Chêne et de Hêtre tombées. — Groupe de filaments couleur de chair, dressés, dichotomes, rameux, conidies sphériques, roses, verruqueuses, disséminées à l'extrémité un peu renflée des filaments. — AR. dans les forêts. — Sermaize et Charmont. — Automne.

1891. **BOTRYTIS DICHOTOMA.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de bois humide et sur feuilles pourrissantes. — Touffe jaunâtre, velue, composée de filaments entremêlés, dichotomes, hyalins, parsemés de conidies sphériques, verruqueuses, de couleur jaune-d'ocre. — C. dans les bois. — Partout. — Automne.

1892. **BOTRYTIS VIRELLA.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de Saule mortes enfouies sous la mousse. — Touffe de filaments dressés, arborescents, à rameaux verticillés, terminés chacun par une conidie ovale, variant du jaune-citron au vert-pâle. — AR. — Bois de Pins. — St-Amand. — Automne.

1893. **BOTRYTIS VULGARIS.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les tiges herbacées lan-

guissantes. — Touffe blanchâtre composée de filaments, bruns à la base, septés, incolores au sommet, qui se divise en plusieurs rameaux terminés chacun par un glomérule sphérique de conidies incolores, ovales. — CC. — Automne et Printemps. — Partout.

1894. **BOTRYTIS CINEREA.** *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Parasite sur *Sclerotium durum*. — Touffe grisâtre composée de filaments bruns, septés, dressés, dichotome supérieurement, à rameaux terminés par des conidies disposées en capitule; conidies ovales, incolores. — CC. — Partout.
— Automne et Printemps.

1895. **BOTRYTIS GEMELLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce pourrie de Vigne. — Touffe laineuse, blanche, formée par des filaments dressés, dichotomes, chaque rameau est terminé par un renflement verruqueux, sur lequel s'insèrent les conidies ovales, réunies en capitule. — R. — Récolté à St-Lumier. — Au Printemps.

1896. **BOTRYTIS EPIGEA.** *Link.* — Alb. de l'Est.
— Sur la terre argileuse des forêts. — Touffe blanche, tomenteuse, passant au gris en vieillissant; filaments très denses, entremêlés; les fertiles dressés, courts portant au sommet des conidies petites, sphériques, incolores. — C. en Automne. — Dans les bois humides.

24^e GENRE. — **OVULARIA.** — *Sacc.*

1897. **OVULARIA LAMII.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles languissantes de *Lamium amplexi-*

caule. — Groupes épars, composés de faisceaux de filaments courts, terminés par des conidies ovales-fusiformes. — Croît aussi sur *Lampsana vulgaris*. — C. — Automne. — Partout.

1898. **OVULARIA OBLIQUA**. *Oud.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles vivantes de *Rumex crispus*. — Petits faisceaux blancs insérés sur des taches brunes de la feuille composées de filaments simples, continus, terminés chacun par une conidie ovale piriforme, très développée. — Conidie de *Spherella rumicis*. — AC. — Été. — St-Amand, etc.

1899. **OVULARIA VITIS**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Vigne desséchées. — Taches blanches, assez semblables à celles du Mildiou, dont elles diffèrent par des conidies fusiformes, à courtes basides. — Le Mildiou appartient à un autre genre. — AC. — Automne. — St-Amand.

25^e GENRE. — **SEPEDONIUM**. — *Link.*

1900. **SEPED. CHRYSOSPERMUM**. *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur chapeau des Bolets. — Taches jaune-d'or, velues et très étendues, formées par les filaments hyalins, septés dressés, dichotomes, terminés chacun par une conidie sphérique, verruqueuse d'un jaune-doré. — CC. — Automne. — Dans les bois. — Partout. — Conidie d'*Hypomyces chrysospermus*.

1901. **SEPED. CORDÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Parasite sur le disque de *Peziza macropus*. —

Conidies à 2 lobes sphériques, l'inférieur plus petit; verruqueuses hyalines rosées, passant au jaune. — AC. — Automne. — Dans les bois.

1902. **SEPED. BYSSICOLUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Appareil conidien de *Rosellinia aquila*. — Composé de filaments bruns, bifurqués, dichotomes à rameaux terminaux plus pâles, terminés chacun par des conidies ovales, incolores. — C. en Automne. — Sur les vieux bois pourris. — Partout.

26^e GENRE. — **ASTEROPHORA.** — *Ditm.*

1903. **ASTER. AGARICICOLA.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Appareil conidien de *Nyctalis asterophora*. — Prend naissance sous l'épiderme du chapeau. — Il est composé de filaments rameux, incolores, terminés par des conidies tuberculeuses en forme d'étoile, légèrement jaunâtres. — AC. en Automne. — Forêts.

27^e GENRE. — **VERTICILLIUM.** — *Nees.*

1904. **VERT. TERRESTRE.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur la terre et sur les écailles de Noyer humides, tournées vers le sol. — Taches blanches, formées par des touffes de filaments, les uns fertiles à rameaux verticillés, munis de conidies incolores sphériques, les autres stériles, très longs, de couleur brun-clair. — AC. — Automne.
1905. **VERT. AGARICINUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les chapeaux et les

lamelles des Agaricinées. — Filaments blancs, rameux, à rameaux et ramuscules verticillés; conidies incolores, ovales-oblongues, hyalines. — CC. — Automne. — Partout.

28^e GENRE. — **ACROCYLINDRIUM**. — *Bon.*

1906. **ACROCYL. CORDÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
C. sur les Agaricinées. — Composé de filaments dressés, à rameaux simples, verticillés, terminés chacun par une conidie cylindrique hyaline. — Automne. — Forêts.

29^e GENRE. — **ACROSTALAGMUS**. — *Corda.*

1907. **ACROST. CINNABARINUS**. *Cord.* — Alb. de l'Est. — Commun sur les tiges pourries des plantes herbacées, et sur les pommes de terre malades. -- Large plaque velue, rouge brique composée de filaments à rameaux et à ramuscules verticillés, terminés chacun par un globule sphérique de conidie ovale-rougeâtre agglutinée. — CC. — Automne. — Partout.

30^e GENRE. — **GONATOBOTRYS**. — *Cord.*

1908. **GONAT. SIMPLEX**. *Corda.* — Alb. de l'Est.
— Sur grain de Maïs. — Filaments dressés, incolores, septés, fasciculés, munis de distance en distance de renflements globuleux et verruqueux, sur lesquels sont disposées en spirale, les masses de conidies hyalines, ovales. — AR. — Automne.

1909. **GONAT. FLAVA**. *Bonord.* — Alb. de l'Est.

— C. sur les vieux troncs humides de Noyer
— Filaments rameux, munis dans leur longueur de renflements verruqueux, sur lesquels s'insèrent des glomérules arrondis de conidies ovales jaune-d'ocre. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.

31^e GENRE. — **SPICARIA**. — *Hartz*.

1910. **SPICAR. VERTICILLATA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les tubercules de *Solanum tuberosum* et sur les tiges pourries de *Dahlia* mis à la cave pendant l'hiver. — AC. — Cette espèce me paraît être une variété du *Verticillium candidum*.
-

SECT. II. — **DIDYMOSPORÉES**. — *Sacc.*

32^e GENRE. — **DIPLOCLADIUM**. — *Bon.*

1911. **DIPLO. MAJUS**. *Bon.* — Alb. de l'Est. — Sur les chapeaux et les lamelles des agaricinaées. — Cette espèce est l'état jeune du *Dactylum dendroïdes*, les conidies sont uniseptées et deviennent pluriseptées à la maturité. — CC. — Partout.
1912. **DIPLO. MINUS**. *Bon.* — Alb. de l'Est. — Sur les tubes du *Polyporus versicolor*. — Appareil conidien d'*Hypomyces aurantius*. — Filaments dressés, à rameaux verticillés, terminés

chacun par une conidie ovale, septée comme celle de *Trichothecium roseum*. — AR. — Automne. — St-Amand.

33^e GENRE. — **TRICHOTHECIUM**. — *Link.*

1913. **TRICHOT. ROSEUM**. *Link.* — Alb. de l'Est. — C. sur rameaux de Frêne et de Peuplier. — Touffe de filaments roses, fasciculés, continus, terminés chacun par une ou deux conidies piri-formes, uniseptées, apiculées inférieurement. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.
1914. **TRICHOT. DOMESTICUM**. *Fr.* — Alb. de l'Est. — AC. sur les bois et substances putrescibles, dans l'intérieur des habitations ; ressemblable à l'espèce précédente. — Conidies de couleur blanche. — CC. — Printemps, Automne. — Partout.

34^e GENRE. **CEPHALOTHECIUM**. — *Corda.*

1915. **CEPHAL. CAPITATUM**. *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur tige de *Papaver somniferum* en compagnie du *Brachycladium*, sur lequel il croît en parasite. — Filaments rampants stériles. Filaments dressés terminés au sommet par de petites verrues sur lesquelles s'insèrent en forme de capitule, des conidies ovales, uniseptées, incolores. — RR. — Jardins. — St-Amand. — Printemps.
1916. **CEPHAL. TETRASPERMUM**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur détritüs de balles d'orge en décomposition. — Taches blanches, formées par

la masse des filaments dressés du *Cephalothecium*. Chaque filament est simple à 1 ou 2 cloisons, terminé au sommet par 3 ou 4 conidies incolores, ovales uniseptées. — RR. — St-Lumier-en-Champagne. — Automne.

35^e — GENRE. — **DIDYMOPSIS**. — *Sacc.*

1917. **DIDYM. SPICATA**. *Ch. R. Lebr.* — Alb. de l'Est. — Sur le disque de la *Pezize* en ciboire — Duvet blanchâtre, formé par des filaments dressés, rameux munis de conidies allongées, cunéiformes, hyalines uniseptées, disposées le long du filament, en verticille et en forme d'épis. — RR. — Communiqué par M. André Lebreton. — En Été.

36^e GENRE. — **MYCOGONE**. — *Ditus.*

1918. **MYCOG. ROSEA**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur les chapeaux et lamelles des Agaricinées en putréfaction. — Filaments incolores. Conidies obovales, roses, uniseptées. — AC. en Automne dans les bois de Pins.
1919. **MICOG. PEZIZÆ**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le disque de *Peziza juniperi*. — Espèce se rapprochant beaucoup de *Didymaria helveticæ* (de Corda). Elle en diffère par la disposition de ses rameaux, qui sont tous terminés par 2 conidies allongées, cunéiformes, didymes. — RR. — Aulnay-l'Aître. — Automne.

37^e GENRE. — **HORMIACTIS**. — *Preuss.*

1920. **HORM. ALBA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'Orties. — Touffes blanches, velues, composées de longs chapelets de conidies cylindriques uniseptées, insérés sur de courts pédicelles. — RR. — St-Amand. — Printemps.
-

SECT. III. — **PRAGMOSPORÉES**. — *Sacc.*

38^e GENRE. — **DACTYLIUM**. — *Nées.*

1921. **DACTYL. DENDROIDES**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur lames et chapeaux d'Agaricinées en décomposition. — Filaments stériles rampants, très nombreux ; filaments dressés, rameux, subverticillés ; conidies oblongues, tri-septées, hyalines apiculées à la base. — CC. — Automne. — Forêts.

39^e GENRE. — **RAMULARIA**. — *Unger.*

1922. **RAMULARIA AUGUSTISSIMA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles de *Cornus sanguinea*. — Petits groupes épars sur des taches brunes composées de filaments rameux munis dans leur longueur et au sommet de conidies étroites fusiformes, incolores. — AR. — Automne. — St-Amand.

1923. **RAMULARIA SAMBUCINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Sambucus nigra*. — Faisceaux épars de conidies cylindriques, uniseptées, incolores, insérées sur des taches blanchâtres. — AC. — Fin d'été. — St-Amand.
1924. **RAMULARIA URTICÆ.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — C. sur les taches noires qui envahissent la face inférieure des feuilles d'Ortie en Automne. — Petits groupes de conidies elliptiques, allongées ; portées sur de courts filaments disposés en faisceau. — Partout.
1925. **RAMULARIA GIBBA.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles de *Ranunculus repens*. — Petits groupes blanc de neige sur une tache jaunâtre, boursoufflés, Conidies fusiformes, droites, à 3 gouttelettes, hyalines. — AR. — Été.
1926. **RAMULARIA PARIETARIÆ.** *Pass.* — Alb. de l'Est. — A la face supérieure des feuilles de *Parietaria officinalis*. — Touffes blanches, composées de filaments fasciculés, porteurs de Conidies cylindriques, la plupart uniseptées. — AC. — St-Amand. — Automne.
1927. **RAMULARIA ULMARIÆ.** *Cooke.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Spirea ulmaria*. — Taches blanches, composées de conidies cylindriques uniseptées, disposées en chapelets fasciculés. — C. — Automne. — Bords des eaux.
1928. **RAMULARIA GERANII.** *West. Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Geranium molle*, à la face inférieure. — Taches brunes, cou-

vertes de groupes épars de conidies blanches, fusoides, fasciculées. — C. — Printemps. — St-Amand.

1929. **RAMULARIA VARIABILIS**. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles du *Verbascum thapsus*. — Groupes blanchâtres sur des taches brunes, composées de filaments fasciculés très courts, porteurs de conidies de formes variées, ovales, elliptiques ou cylindriques. — AC. — Printemps. — St-Amand.

1930. **RAMULARIA PLANTIGINEA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles de *Plantago lanceolata*. — Groupes épars sur des taches ochracées, composés de filaments simples, continus, porteurs de conidies cylindriques, droites à 1-3 cloisons. — AC. — Automne. — Dans les champs.

1931. **RAMULARIA VIOLÆ**. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles de *Viola canina* et *odorata*. — Groupes épars sur des taches orbiculaires, composés de filaments très courts, fasciculés, porteurs de conidies cylindriques, obtuses. — AC. — En Automne à St-Amand.

1931 bis. **RAMULARIA SYMPHYTI**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles languissantes de Consoude. — Prés, bords de la Marne, — Soulanges. — Automne. — AC. — Très longues conidies.

1932. **RAMULARIA LAMII**. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Lamium amplexicaule*. — Groupes épars, sur des taches orbiculaires, composés de filaments très courts, simples, por-

teurs de conidies elliptiques, continues. — AC.
— Automne. — Jardins. — Partout.

40^e GENRE. — **SEPTOCYLINDRIUM**. — *Sacc.*

1933. **SEPTOCYL. VIRESCENS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'Ombellifères. — Taches velues, assez étendues, vert-glaucue ; apparence de *Cladosporium herbarum*, composées de filaments courts, septés, rameux ; porteurs de conidies cylindriques, pluriseptées, disposées en chapelet. — R. — Printemps. — Bois de St-Lumier.

41^e GENRE. — **HELYCOMYCES**. — *Link.*

1934. **HELICOM. ROSEUS**. *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur les Pericarpes pourris de l'*Esculus hippocestanum*. — Petites taches blanches, rosées formées par la réunion de conidies contournées en spirales, munies de 4 à 6 cloisons, incolores, portées par des filaments courts, septés, terminés par 1 ou 2 pointes sur lesquelles s'insèrent les conidies. — AR. — Automne. — St-Amand.

2^e FAM. — **Dematriées.** — *Fries.*

Filaments bruns ou noirs, rigides, non réunis en fascicule, rarement hyalins, dans ce cas, porteurs de Conidies noires.

SECT. I. — **AMÉROSPORÈES.** — *Sacc.*

1^{er} GENRE. — **CONIOSPORIUM.** — *Sacc.*

1935. **CONIOSP. SOCIUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
-- Sur la face inférieure des feuilles de *Malva sylvestris*. — Taches noires intenses, formées par l'agglomération de nombreuses conidies, brunes, ovoïdes, apiculées inférieurement. — R. — Automne. St-Amand.
1936. **CONIOSP. RHIZOPHILUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur Rhizomes de *Triticum repens*.
-- Aspect d'un *Torula herbarum*. — Groupes très noirs vus en masses, composées de nombreuses conidies, rondes-ovales, de couleur brune-olive sous le microscope. — AR. — Printemps. — St-Amand.
1937. **CONIOSP. CAULINCOLUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes et dénudées de *Reseda luteola*. — Taches noires, formées par des masses de conidies, brunes, en forme d'amande. Sous un fort grossissement, on constate

une couche muqueuse émettant de courts pédicelles, terminés par de jeunes conidies incolores. — RR. — Chemin de St-Amand à Lisse. — Hiver.

2^e GENRE. — **TORULA.** — *Pers.*

1938. **TORULA ANTENNATA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur *Prunus cerasus*, *Vitis vinifera*, et *Rosa canina*. — Taches brunes, plus ou moins larges, velues, composées de chapelets de conidies brunes, elliptiques, allongées, portées sur de courts pédicelles. — AC. — En Automne, Printemps. — Partout.
1939. **TORULA HERBARUM.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Très C. sur les tiges herbacées. formant des taches noir - olive, velues; composées de conidies globuleuses, 4-6 portées par de courts pédicelles. — CC. — Partout.
1940. **TORULA COMPNIACENSIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Inscrit pour mémoire. — Envoi de M. Petit. — Récolté sur les murs des fabriques d'eau-de-vie à Cognac. — Taches noires, composées de conidies, brunes, sphériques, tuberculeuses, 10-20 en chapelets portées par un court pédicelle. — Automne, hiver. — Espèce nouvelle *Ch. R.*
1941. **TORULA GRAMINIS.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les Rhizomes des graminées déracinées. — Taches noires, brunes, formées par des chapelets de conidies globuleuses portées par de courts pédicelles. — CC. — Hiver. — Partout.

1942. **TORULA. CORII.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est.
— Plaques rougeâtres, étendues, sur lanières de cuir exposées à l'humidité, composées de chapelets allongés, rameux, de conidies cuboïdes rougeâtres, portées par de courts pédicelles. — AR. — Printemps. — St-Amand.
1943. **TORULA. PUNCTATA.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges herbacées, surtout de *Malva sylvestris*. — Taches noirâtres, étendues, veloutées, formées par des chapelets très longs de conidies brunes sphériques, tuberculeuses, ponctuées, portées par de courts pédicelles. — AC. — Automne. — St-Amand.
1944. **TORULA. TUBERCULARIÆ FORMIS.** *Ch. R.*
— Alb. de l'Est. — Tubercules noirs, discoïdes à surface blanche pulvérulente, épars, sur le bois de Saule pourri, ayant servi de rames dans les jardins. Composés de chapelets de conidies, rondes-cuboïdes, réunies en faisceaux denses portées par des pédicelles de même longueur que les chapelets, septés. — RR. — Automne.
— St-Amand. — Cette espèce pourrait former un genre nouveau de la famille des *Tuberculariées*.

3^e GENRE. — **HORMISCUM.** — *Kunze.*

1945. **HORMISC. ALTUM.** *Ehrenb.* — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux d'*Alnus Glutinosa*. — Groupes de filaments noirs, luisants, placés dans les fissures de l'épiderme, formés par la réunion des

longs chapelets de conidies cuboïdes, brunes, persistantes. — AC. — Automne, printemps. — St-Amand.

1946. **HORMISC. VERMICULARE.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Châtaignier. — Grandes plaques d'un noir intense; formées par la réunion des nombreux filaments moniliformes, bruns; composées de conidies cuboïdes, et réunies en faisceaux de 2 à 5 chapelets. — RR. — Bois de Reims. — Fin de l'été.

1947. **HORMISC. HYSTERIOIDES.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Rosa canina*. — Groupes linéaires, parallèles, incrustés dans l'écorce; composés de chapelets jaunâtres, de conidies cuboïdes, transparentes. — RR. — St-Amand. — Automne.

1948. **HORMISC. STILBOSPORUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois de chêne. — Taches velues, très noires, irrégulières, formées par des conidies brunes, à 4 cloisons, placées bout-à-bout irrégulièrement; disposées en faisceaux tortueux. — R. — St-Amand. — Printemps.

1949. **HORMISC. PITHYOPHILUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes rameaux de *Pinus Picea* qu'il entoure d'une croûte noire velue, formée par des chapelets de conidies brunes, cuboïdes de longueur très variée. — AC. — Jardins. — Partout.

1950. **HORMISC. CEREVISIÆ.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — A la surface de la bière et des

liquides acides en fermentation. — Plaques mesentériformes composées de filaments, les uns continus, et les autres composés d'articles ou conidies hyalines sub-ovoïdes disposées en chapelet. — AC. dans les caves et les officines.

4^e GENRE. — **GYROCERAS**. — *Corda*.

1951. **GYROCER. PLANTAGINIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles vertes de *Plantago media*. — Très longs chapelets de conidies brunes cuboïdes, disposés en faisceaux, contournés, tortueux. — R. — Bords des chemins, entre St-Amand et Bassu. — Automne.

5^e GENRE. — **ECHINOBOTRYUM**. — *Corda*.

1952. **ECHIN. ATRUM**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri dénudé, envahi par *Campotrichum podospermum*. — Parasite sur les filaments de cette espèce. — Conidies obovales, brunes, munies d'aspérités saillantes plus claires réunies en glomérules de 5. — AR. — — St-Amand. — Automne.

1953. **ECHIN. PARASITANS**. *Cord.* — Alb. de l'Est. — Parasite sur les stipes de *Stysanus stemonitis*. — Glomérules de conidies 8-10, piriformes, jaunâtres, maculées de brun, à col incolore. — AC. — Automne. — Printemps — St-Amand.

6^e GENRE. — **STACHYBOTRYS.** — *Cord.*

1954. **STACHYBOTRYS ALTERNANS.** *Bon.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges de liliacées et sur le papier humide. — Taches noirâtres, formées par des filaments bruns, lisses rameux, terminés par une couronne de 5-6 conidies hyalines, sur laquelle s'insèrent des masses de conidies brunes, formant une tête globuleuse noire. Les rameaux de cette espèce sont alternes. — R. — Printemps. — à St-Amand.
1955. **STACHYBOTRYS ATRA.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois humide et sur tige de Lys. — Groupe de filaments, simples, rugueux. brunâtres, assez courts, terminés par une couronne de 6 conidies hyalines, donnant naissance à des sporidies brunes, elliptiques, uniseptées, disposées en globules noirs, sphériques. AC. — Jardins. — Printemps. — St-Amand.
1956. **STACHYBOTRYS LOBULATA.** *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Arundo phragmites* humides. — Ressemble beaucoup à *Stachybotrys alternans*, mais en diffère par ses conidies sphériques, échinulées. — AR. — Automne. — Aulnay-l'Aître.

7^e GENRE. — **PERICONIA.** — *Bon.*

1957. **PERICONIA PYCNOSPORA.** *Fres.* — Alb. de l'Est. — Groupe de petits filaments bruns, septés, simples, dressés, surmontés chacun d'un

glomérule sphérique composé de conidies brunes, rondes, échinulées. — AC. sur *Urtica dioica*. — Printemps, Automne. — Partout.

1958. **PERICONIA ATRA**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Taches brunes, velues, sur écailles de bois pourrissant, formés de filaments bruns, septés, dressés, terminés par un glomérule sphérique de conidies brunes, rondes, chagrinées. — CC. — Printemps, Automne. — Partout.

1959. **PERICONIA FUSCA**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles putrides des plantes aquatiques. — Caractères semblables à ceux des espèces précédentes mais en diffère par les conidies plus petites, ovales et brunes. — AC. — Bords des ruisseaux. — St-Lumier, Soulanges. — Automne.

1960. **PERICONIA ELLIPSOSPORA**. *Sacc*. — Alb. de l'Est. — Sur les pédoncules du *Pæonia officinalis*. — Taches noires, velues, assez étendues, composées de filaments dressés, bruns, septés, surmontés d'un capitule sphérique de conidies vert-olive, puis brunes, voilées et lisses; on remarque à la base du capitule plusieurs conidies sporigères. — CC. — St-Amand. — Printemps.

8^e GENRE. — **CAMPTOUM**. — *Link*.

1961. **CAMPT. CURVATUM**. *Link*. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles languissantes de *Poa aquatica*. — Petits groupes velus elliptiques, épars, composés de filaments septés, noduleux, hyalins.

simples, le long desquels s'insèrent des conidies brunes, courbées, réniformes. — AC. — Bords des eaux. — Printemps.

9^e GENRE. — **ARTHRIINIUM**. — *Kunze*.

1962. **ARTHRI. CARICICOLUM**. *Kunze*. — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles mortes du *Carex caespitosa*. — Ressemble par ses caractères au *Camptoum curvatum*, en diffère seulement par la forme de ses conidies elliptiques atténuées aux extrémités. — CC. — Printemps, Automne.

10^e GENRE. — **GONIOSPORIUM**. — *Link*.

1963. **GONIOS. PUCCINIoidES**. *Link*. — Alb. de l'Est. — Croît au Printemps sur les feuilles mortes des *Poa* et des *Carex*. — Il diffère des deux espèces précédentes par la forme de ses conidies, qui est cuboïde anguleuse. — C. au Printemps dans les lieux humides à St-Amand, etc.

11^e GENRE. — **STEPTOTRIX**. — *Cord*.

1964. **STEPT. FUSCA**. *Cord*. — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes de *Pteris aquilina*. — Petites touffes velues, brun-verdâtre, composées de filaments brun-clair café au lait, continus noduleux, tordus, le long desquels s'insèrent de petites conidies ovoïdes brun-clair. — RR. — Sermaize. — Automne.

12^e GENRE. — **TRICHOSPORIUM**. — *Fries*.

1965. **TRICH. FUSCUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur l'écorce des bois pourris amassés en tas sur la terre humide. — Filaments bruns, rameux entrecroisés, septés, parsemés de conidies ovoïdes, brunes. — Cette espèce précède l'apparition du *Rosellinia aquila* dont il est l'appareil conidien. — CC. — Partout.
1966. **TRICH. ATERRINUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs et racines déterrées du Peuplier et du Noyer. — Grandes plaques d'un noir intense, composées de filaments simples, entremêlés, très noirs, parsemés de petites conidies elliptiques, brunes et très nombreuses. — C. en Automne, Printemps. — St-Amand.
1967. **TRICH. CHARTACEUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur papier abandonné dans les lieux humides. — Taches noires, irrégulières, composées de filaments, rameux, incolores, et anastomosés, parsemés de conidies ovoïdes, noires, et très petites. — C. — Automne. — Partout.

13^e GENRE. — **MONOTOSPORA**. — *Corda*.

1968. **MONOT. SPHÆROCEPHALA**. *B. et Br.* — Alb. de l'Est. — Sur la tranche d'une vieille souche pourrie. — Taches noires, formées par les groupes de *Monotospora* qui examinés à la loupe ressemblent à une forêt de petites épingles à têtes noires ; chaque espèce est composée d'un

filament brun, septé, aminci au sommet et terminé par une conidie noire, luisante, sphérique et très grosse. — RR. — Automne. — St-Amand.

1969. **MONOT. CUNEIFORMIS.** (*Rich.*) *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles pourries de Pin sylvestre. — Taches velues. placées dans les sinus creusés par les insectes; composée de filaments fasciculés, bruns, simples, septés et terminés au sommet par une conidie unique, brune, cunéiforme; les cloisons des filaments sont quelquefois garnies d'une gaine, résultant d'une spore avortée. — RR. — Automne. — Soulanges.

1970. **MONOT. OVATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Groupes de conidies ovales ou ovoïdes, noires, luisantes portées par de courts filaments courbes. — Sur bois de Frêne. -- St-Amand. — Automne. — R.

14^e GENRE. — **HADOTRICHUM.** — *Fuckel.*

1971. **HADOTR. PHRAGMITIS.** *Fuckel.* — Alb. de l'Est. — Voir *Henderzonia arundinacea.*

15^e GENRE. — **CATENULARIA.** — *Grov.*

1972. **CATEN. ATRA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est — Sur écailles de Frêne. — Taches noires, larges, velues, composées de filaments dressés, très nombreux, septés simples, parsemés d'une masse de conidies très petites, ovoïdes noirâtres. — AR. — Printemps. — St-Amand.

16^e GENRE. — **HAPLOGRAPHIUM**. — *Br.*

1973. **HAPLOG. PENICILLATUM**. *Sacc. et Ch. R.*
— Alb. de l'Est. — Sur les fruits d'*Alnus glutinosa*. — Groupes velus, formés par des filaments simples, noirs, dressés. terminés au sommet par une couronne de rameaux courts, 4-6, surmontés chacun par un très long chapelet flexueux, de conidies cylindriques courtes et hyalines. — RRR. — Entre St-Lumier et St-Amand. — Au Printemps.
1974. **HAPLOG. TORULOIDES**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les tiges des plantes herbacées. — Groupes noirâtres, formés par des filaments simples, septés, bruns, terminés au sommet par des chapelets de conidies globuleuses, noires-olivacées, assez courts, formant une tête arrondie. — CC. — Automne. — Partout.

17^e GENRE. — **DEMATIUM**. — *Pers.*

1975. **DEMAT. HISPIDULUM**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Glyceria aquatica*. — Groupes épars de petites touffes noires-velues, composés de filaments fasciculés. noirs, terminés en pointe, munis à la base de conidies sphériques, brunes, de différentes grosseurs. — Lieux humides. — En Automne. — Partout.

18^e GENRE. — **HORMODENDRUM**. — *Bon.*

1976. **HORM. OLIVACEUM**. *Bon.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles de Chêne et sur tiges d'Om-

bellifères. — Groupes de filaments velus, vert-foncé ou olive, simples d'abord, et septés, puis rameux au sommet, les rameaux sont terminés par des chapelets de conidies verdâtres, ovoïdes ou petites. — AR. — Bois de St-Lumier. — Automne,

19^e GENRE. — **SARCOPodium**. — *Ehren.*

1977. **SARC. FUSCUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur ramilles de bois tombé à terre, et à la base des tiges des grandes herbes desséchées. — Groupe de filaments velus de couleur ocracée ou brune, composé de filaments très longs, septés, tortueux, concolores, au milieu desquels gisent des masses de conidies cylindriques, incolores. — AC. — Bois de St-Amand, St-Lumier. — Automne.

1978. **SARC. ROSEUM**. *Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges pourries des plantes herbacées. — Groupes elliptiques, velus, roses, formés de longs filaments tortueux, concolores, qui entourent un globule de conidies elliptiques, allongées et très nombreuses. — AC. — Automne, Printemps. — Partout.

20^e GENRE. — **CIRCINOTRICHUM**. — *Nées.*

1979. **CIRC. MACULIFORME**. *Nées.* — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Hêtre. — Taches noires, éparses, velues, composées de filaments, dressés, noirs, septés. très rameux au sommet, à

rameaux plus pâles, dichotomes et recourbés ; conidies fusoïdes, incolores, insérées à la base des filaments. — C. — St-Amand. — Printemps,

21^e GENRE. — **MYXOTRICHUM**. — *Kunze*.

1980. **MYX. CHARTARUM**. *Kunze*. — Alb. de l'Est. — Sur papier pourrissant. — Taches noirâtres, composées de filaments noirs, enchevêtrés, très rameux ; les rameaux dichotomes plus pâles sont terminés par des conidies sphériques incolores, disposées en glomérules. — Etat conidien de *Chaetomium chartarum*. — AC. — Lieux humides. — Automne.

22^e GENRE. — **CHÆTOPSIS**. — *Grév.*

1981. **CHÆTOPS. GRISEA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois pourri, notamment du *Corylus avellana*. — Groupes velus, de couleur grise due au mélange des filaments noirs et des conidies blanches, filaments dressés, très longs, terminés en pointe, entourés à la base de rameaux incolores, porteurs de conidies cylindriques, hyalines. — C. — Automne. — Partout.

23^e GENRE. — **MENISPORA**. — *Pers.*

1982. **MENISP. GLAUCA**. *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois de Chêne pourri. — Ressemble à l'espèce précédente, par ses filaments noirs, terminés en pointe, et par la coloration grise due aux conidies blanches ; ces conidies de *Menispora* sont groupées en capitule sphérique

au sommet des rameaux d'autres filaments plus courts situés à la base des premiers; conidies incolores, cylindriques, arquées. — C. — Automne. — Partout.

1983. **MENISP. CILIATA.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur bois de Chêne pourri. — Taches grises, velues, composées de filaments bruns, septés, rameux, munis dans leur longueur de conidies arquées, blanches, terminés à chaque extrémité par un long cil. — C. — Lieux humides. — Partout. — Automne et Printemps.

24^e GENRE. — **GONYTRICHUM.** — *Nées.*

1984. **GON. CÆSIUM.** *Nées.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri humide, dans lieux sombres. — Taches velues, grisâtres, composées de filaments, rameux à angle droit, anastomosés, garnis à l'entrecroisement des filaments de courts ramuscules, terminés chacun par un globule de conidies ovoïdes, incolores. — CC. — Lieux humides. — Partout.

25^e GENRE. — **FUCKELINA.** — *Sacc.*

1985. **FUCK. SOCIA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de Pin sylvestre. — Filaments dressés, simples, septés, noirs, amincis au sommet, terminés par 6-10 stérigmates, émettant chacun une conidie ovale, incolore. — Etat conidien de *Leptospora caudata*, Fuck. — AR. — Automne. — St-Amand.

26^e GENRE. — **STACHYLIDIUM**. — *Link.*

1986. **STACHYL. BICOLOR**. *Link.* — Alb. de l'Est.

— Commun sur les tiges pourrissantes de *Dahlia*.

— Filaments dressés, bruns à la base, incolores au sommet, munis dans leur longueur de rameaux simples, verticillés, portant chacun un glomérule de conidies ovales oblongues, hyalines. — C. en Automne et Printemps. — St-Amand.

1987. **STACHYL. SAMBUCI**. *Ch. R.* — Alb. de

l'Est. — Sur branches dénudées du *Sambucus nigra*. — Filaments dressés, bruns à la base, incolores supérieurement, munis de rameaux disposés en verticilles, chaque ramuscule terminé en pointe porte un glomérule de conidies incolores, ovales. — C. en Automne et au Printemps, à St-Amand.

27^e GENRE. — **CHALARA**. — *Corda*.

1988. **CHALAR. STROBILINA**. *Sacc.* — Alb. de

l'Est. — Sur les bractées de cônes de *Pinus abies*. — Taches grises, formées de filaments courts, renflés en forme de bouteille, bruns, terminés par un très long chapelet de conidies cylindriques, courtes, munies de 2 sporuies. — Appareil conidien d'*Helotium strobilinum*. — AR. — Ablancourt. — Automne.

SECT. II. — **DIDYMOSPORÉES.** — *Sacc.*

28^e GENRE. — **DICOCCUM.** — *Corda.*

1989. **DICOCCUM UNISEPTATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges pourrissantes de *Clematis Vitalba*. — Conidies ovoïdes, brunes, uniseptées inférieurement, munies d'une grosse gouttelette, insérée sur des basides courtes, en mamelon. — Accompagne le *Stysanus clematidis*. — AC. — St-Amand. — Printemps.

1990. **DICOCCUM SENECTIONIS.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Senecio vulgaris*. — Groupes de conidies elliptiques, munies d'une cloison et resserrées au milieu. de couleur brune. — AR. — St-Lumier. — Printemps.

29^e GENRE. — **BISPORA.** — *Corda.*

1991. **BISP. MONILIOIDES.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois de Chêne. — Taches noires, formées par de longs chapelets de conidies brunes, fusiformes. obscurément septées, disposées en fascicules. — R. — Bois de Sermaize. — Automne.

30^e GENRE. — **PASSALORA.** — *Fr. et Mont.*

1992. **PASS. BACCILLIGERA.** *Mont et Fries.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Alnus glutinosa*,

envahies à la face inférieure, par des groupes de filaments bruns-grisâtres, fasciculés, septés, toruleux, émettant à leur sommet de grandes conidies incolores, uniseptées ; lobe supérieur renflé fusiforme, l'inférieur cylindrique. — R. — Bois de St-Lumier. — Automne.

31^e GENRE. — **FUSICLADIUM**. — *Bon.*

1993. **FUSICL. DENTRITICUM**. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Pommier encore vertes. — Taches noires, velues, formées par des filaments bruns, rameux, rampants ou dressés, et alors terminés par des conidies variées, brunes, munies d'une à trois cloisons. — AC. — Automne. — Jardins.
1994. **FUSICL. PIRINUM**. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles de Poirier. — Taches brunes, irrégulières, formées par des conidies brunes-verdâtres, portées par de courts filaments de 1 à 2 cellules. — C. en Automne. — Jardins. — Partout.
1995. **FUSICL. DEPRESSUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles vivantes d'*Angelica sylvestris*, à la fin de l'Été. — Petits groupes noirs épars, composés de fascicules denses de filaments simples, continus, bruns, entremêlés de conidies de même longueur, uniseptées, renflées supérieurement, amincies à la base, de couleur jaunâtre, ou nankin clair. — C. de St-Amand à St-Lumier. — Automne.

32^e GENRE. — **SCOLECOTRICHUM**. — *Kunze*.

1996. **SCOLECOT. CLAVARIARUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Parasite sur *Clavaria Cristata*, dont il rend le tronc et les rameaux velus-noirâtres. — Composé de filaments dressés. bruns, peu rameux, cloisonnés terminés chacun par une conidie brune, uniseptée, elliptique, allongée. — AC. — Automne. — Bois de Sermaize.

1997. **SCOLECOT. VENOSUM**. *Bon.* — Alb. de l'Est. — A la face supérieure des feuilles de Pommier. — Taches grises, rondes, formées par des faisceaux de filaments courts, portant des conidies ovales allongées, uniseptées, brunes, les faisceaux sont disposés en lignes rayonnantes du centre vers la circonférence. — AC. — Automne. — Jardins.

33^e GENRE. — **POLYTHRINCUM**. — *Kunze*.

1998. **POLYTHR. TRIFOLII**. *Kunze*. — Alb. de l'Est. — C. sur feuilles de *Trifolium repens*. — Il forme à la face inférieure de petits groupes velus, noirâtres, composés de faisceaux de filaments moniliformes, gris-verdâtres, terminés par une conidie hyaline, ovale, uniseptée. — AC. — Automne. — Partout.

34^e GENRE. — **CLADOSPORIUM**. — *Link.*

1999. **CLADOSP. HERBARUM**. *Link.* — Alb. de l'Est. — C. en Automne et au Printemps sur

les grandes herbes languissantes, et sur le bois humide. — Taches vert-foncé, passant au brun ; composées de filaments dressés, rameux, septés, vert-clair, terminés par des conidies de formes diverses, oblongues, ovoïdes, ou cylindriques, 1-3 cloisons. — Partout.

2000. **CLADOSP. AMPHITRICUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois dénudé de Pin sylvestre. — Taches noirâtres ou olives, formées par de petits tubercules, donnant naissance à des filaments bruns, dressés, simples, sur lesquels s'insèrent des conidies brunes, ovales-oblongues, continues ou uniseptées. — AR. — Automne. — Soulanges.

2001. **CLADOSP. EPIPHYLLUM.** *Mart.* — Alb. de l'Est. — Groupes velus, olive-noirâtre, disséminés à la surface des feuilles humides ; composés de filaments fasciculés septés, concolores, tortueux, terminés par des conidies, ellipsoïdes, verdâtres, unipluri-septées. — CC. — Partout.

2002. **CLADOSP. TYPHARUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur *Typha* et *Scirpus lacustris*. — Groupes épars de filaments dressés, fasciculés, verdâtres, septés, terminés chacun par une spore elliptique-allongée, concolore, 1-3 cloisons. — C. — Bords des eaux. — Partout.

2003. **CLADOSP. PILICOLA.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges sèches de *Galium mollugo* dont les poils sont envahis à leur sommet, par des faisceaux de filaments bruns, rameux, porteurs de conidies cylindriques, 1-3 septées, con-

colores ; le *Cladosporium* parasite, donne à chaque poil, l'apparence d'un *Stysanus* ou d'un *Coremium*. — RR. — Soulanges. — Printemps.

35^e GENRE. — **CLADOTRICHUM**. — *Corda*.

2004. **CLADOT. SCYPHOPHORUM**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Bouleau et de *Syringa vulgaris*. — Groupes bruns, noirâtres, formés par une masse de filaments bruns, dressés, rameux, septés, noduleux-renflés, ou en forme de coupe, terminés par des conidies elliptiques uniseptées, resserrées à la cloison, brunes, souvent disposées en chapelet. — AC. — St-Amand, Soulanges. — Automne.

2005. **CLADOT. POLYSPORUM**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts d'*Alnus glutinosa*. — Taches noires velues, composées de filaments dressés, rameux, fertiles, terminés par des conidies elliptiques, brunes, uniseptées et resserrées à la cloison, mucronées aux deux extrémités. — AC. — Automne. — Soulanges.

36^e GENRE. -- **DIPLOCOCCIIUM**. — *Grev*.

2006. **DIPLOCOC. PULCHRUM**. *Sacc. et Ch. R.* — Alb, de l'Est. — Sur le bois pourri. — Groupes épars de flocons noirâtres, composés de filaments arborescents, ressemblant à une fougère en miniature ; les rameaux principaux sont garnis de ramuscules formés par des chapelets de conidies brunes, elliptiques, didymes. — AR. — St-Amand, Lisse. — Automne.

SECT. III. — **PHRAGMOSPORÉES.** — *Sacc.*

37^e GENRE. — **CLASTEROSPORIUM.** — *Schw.*

2007. **CLASTER. SARCOPODIOIDES.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les siliques de *Lunaria annua*. — Taches grises, formées par les groupes épars de conidies, disposées en fascicules, dressés, renflés vers le bas, allongés en pointes, munis de 10 à 20 cloisons, de couleur brun-clair; basides très courtes. — AC. — Automne. — Jardins.
2008. **CLASTER. CURVATUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles vertes de *Crataegus oxyacantha*. — Taches noires formées par des fascicules de conidies cylindriques-fusiformes, brunes, très longues, munies de 10 à 20 cloisons, recourbées. — R. — Bois de Vavray-le-Petit. — Automne.
2009. **CLASTER. SPARSUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa vulgaris* dans les fentes de l'épiderme. — Taches velues, noires, composées de conidies, brunes, claviformes, allongées, munies de 7 à 10 cloisons. — AR. — Printemps. — Jardins à St-Amand.
2010. **CLASTER. FASCICULARE.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois de Peuplier pourri. — Taches noires, composées des filaments d'*Helminthosporium truncatum*, à la base desquels

croissent les conidies de *Clasterosporium*, piriformes 4-5 septées, réunies en faisceaux. — AC. — Automne. — St-Lumier et St-Amand.

2011. **CLASTER. CONGESTUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri d'*Alnus glutinosa*. — Taches noires, étendues, formées par des filaments dressés, simples, bruns 2-4 septés porteurs de longues conidies, brunes, cylindriques 5-8 septées. — AC. — Automne. — St-Amand.
2012. **CLASTER. ABRUPTUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri d'*Alnus glutinosa*. — Tache brune, formée par les masses de conidies, cylindriques, longues, munies de 5 à 7 cloisons, et de gouttelettes, brunes, portées sur de courts pédicelles. — AC. — Automne. — St-Amand et St-Lumier.
2013. **CLASTER. CLAVÆFORME.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri tombé à terre. — Taches grises, formées par les masses de conidies, dressées, fusiformes brun-clair, munies de 6-7 cloisons, terminées en pointe par un pédicelle plus clair, à 2-3 cloisons. — AC. — Automne, Printemps. — Partout.
2014. **CLASLER. EREMITA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur brindilles de Chêne en compagnie de *Menispora oligosperma*. — Conidies très longues, cylindriques, fusiformes, peu colorées, munies de 10 à 20 cloisons, an *Clost. vagum*? — AR. — St-Amand. — Automne.
2015. **CLASTER. OVOIDEUM.** — *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Clematis vitalba*. —

Groupes épars, de conidies distinctes, dressées, ovoïdes, brunes, à 2 cloisons, portées sur un court pédicelle, peu coloré. — AR. — Printemps. — St.Amand.

2016. **CLASTER. FUSIFORME.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur la tranche horizontale de troncs de Peuplier et d'Aune. — Conidies brunes, ou noires, opaques, fusiformes, munies de 5 à 7 cloisons et portées par des pédicelles de même longueur, cylindriques, septées. — C. — Automne. — Partout.

2017. **CLASTER. CASTANEÆ.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce dont les caractères se rapprochent de ceux des Torulacées a été décrite plus haut, sous le nom de *Hormiscium vermiculare*.

2018. **CLASTER. LIGUSTRI.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Ligustrum vulgare*. — Groupes grisâtres, peu visibles, formés par réunion de nombreuses conidies brunes-claires, cylindriques fusiformes, munies de 7 cloisons, dressées et portées par un très court pédicelle. — RR. — St-Amand. — Printemps. — Dans les haies.

2019. **CASTER. TRIPARTITUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — A la base des tiges mortes de *Genista scoparia*. — Taches noires, velues, formées par les conidies fasciculées au nombre de 3, brun-pâle, fusoides, amincies au sommet, plus renflées à la base, munies de 10-15 cloisons, insérées sur un *Hyphasma* rampant anastomosé. — R. — Sermaize. — Automne.

38^e GENRE. — **SEPTONEMA**. — *Corda*.

2020. **SEPT**^{ma}. **MULTIPLEX**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Nous avons décrit cette espèce sous le nom
de *Hormiscium stilbosporum*; les deux descrip-
tions de Saccardo lui conviennent également
et laissent indécise sa place dans la classification.

39^e GENRE. — **HELMINTHOSPORIUM**. — *Link*.

2021. **HELMIN**. **APPENDICULATUM**. *Corda*. —
Alb. de l'Est. — C. sur les rameaux d'*Alnus*
glutinosa, d'*Acer*, etc. — Plaques velues, noires,
composées de filaments dressés bruns, septés,
terminés en pointes, munis dans leur longueur
et au sommet de conidies en massues, courbes.
brunes, à base plus pâle amincie, 6-7 cloisons.
— CC. — Automne, Printemps. — Partout.

2022. **HELMIN**. **LEUCOSPERMUM**. *Corda*. — Alb.
de l'Est. — Sur bois de Saule humide et pour-
rissant. — Taches noires, velues, formées de
filaments fasciculés dressés, bruns, septés, inco-
lores au sommet, et terminés par une conidie
fusoïde, bitriseptée, hyaline. — AR. — St-Amand
au Printemps.

2023. **HELMIN**. **ATTENUATUM**. *Feck*. — Alb. de
l'Est. — Sur les vieux troncs pourris. — Taches
noires-velues, composées de conidies droites,
multiseptées, la plupart fusiformes ou lancéolées,
brunes-foncées, excepté la dernière cellule qui
est hyaline. Portées par un pédicelle noirâtre.

— Voisin de *Clast. fusiforme*. — CC. — Printemps. — Partout.

2024. **HELMIN. VELATUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois pourri. — Taches noires, composées de filaments bruns, septés. enveloppés de la base au sommet d'un mucus transparent très visible, terminés chacun par une conidie fusiforme 5-7 septées-brunes. — AC. — Hiver, Printemps. — Partout.

2025. **HELMIN. RHOPALOIDES.** *Fres.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges humides et mortes de Buis, dans les jardins. — Taches noirâtres entourant la tige, composées de conidies fusiformes très allongées, brunes, plus pâles au sommet. portées par des pédicelles concolores, un peu plus courtes. — R. — St-Amand. — Automne.

2026. **HELMIN. CLAVARIARUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce qui est l'état conidien d'*Helmintosphaeria clavariæ* nommé par Fuckel *Helminthosporium* a été décrite plus haut sous le nom de *Scolecotrichum* Sacc.

2027. **HELMIN. TRUNCATUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles humides de Peuplier mises en tas. — Taches noires-velues, composées de filaments fasciculés, les uns stériles, bruns, septés. amincis, les autres plus épais, fertiles; les deux tiers supérieurs sont bruns, septés et chaque article consiste en une conidie triseptée et tronquée aux deux bouts. — AC. — St-Lumier, St-Amand. — Automne.

2028. **HELMIN. MACROCARPUM.** *Grév.* — Alb.

de l'Est. — Sur les troncs et rameaux d'*Acer*. de *Fraxinus*, etc. — Taches velues, noires-olivâtres, composées de filaments droits, noirs, subulés, portant au sommet des conidies allongées-claviformes, 6-9 cloisons. — AC. — Automne, Printemps.

2029. **HELMIN. MOLLE.** *B.* et *C.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Sambucus ebulus*. — Taches brunes peu étendues, composées de filaments, bruns, septés, plus clairs au sommet, porteurs de conidies cylindriques, obtuses, munies de 3 cloisons. — AC. — Aulnay, St-Amand. — Automne.

40^e GENRE. — **BRACHYSPORIUM.** — *Sacc.*

2030. **BRACHY. STEMPHYLIOIDES.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Spirea Ulmaria*. — Groupes épars de filaments distincts ou fasciculés, dressés, brun-clair, septés, terminés par une conidie elliptique, brune, à 5 ou 6 loges, dont les extrêmes sont hyalines, parfois surmontées d'un globule sphérique qui semble être une conidie supplémentaire; des gaines, restes de conidies avortées existent souvent le long des filaments. — RR. — Aulnay, Printemps.

41^e GENRE. — **CERCOSPORA.** — *Fres.*

2031. **CERCOSP. VITICOLA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure des feuilles de Vigne. — Taches grises, rondes, formées par des faisceaux de chapelets de conidies verdâtres,

cylindriques 1-3 septées. — C. dans les années humides en Automne. — Jardins. — St-Amand.
2032. **CERCOSP. LILIICOLA.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tige de *Lilium Candidum*. — Groupes peu nombreux de filaments blancs, dressés, à 2-3 cloisons terminés chacun par une conidie de même longueur, allongée, fusiforme, concolore, munie de 6-7 cloisons. — RRR. — St-Amand. — Jardins. — Printemps.

42^e GENRE. **HETEROSPORIUM.** — *Klotzsch.*

2033. **HETER. ORNITHOGALI.** *Klotzsch.* — Alb. de l'Est. Sur feuilles d'*Ornithogalum umbellatum*. — Etat conidien d'un *Phyllachora* ; composé de filaments simples, dressés, septés, bruns, plus clairs au sommet, terminés par des conidies ovoïdes puis cylindriques, brunes, à 3-5 cloisons, et à épispore verruqueux. — R. — St-Amand. — Printemps.

43^e GENRE. — **ACROTHECIUM.** — *Sacc.*

2034. **ACROTH. OBOVATUM.** *Cooke.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois pourri. — Taches noires velues, peu étendues, composées de filaments bruns, septés clairs au sommet, terminés par une ou deux conidies brunes, ovoïdes, à 2 cloisons inférieures. — R. — St-Amand, St-Lumier. — Dans les bois. — Été.

44^e GENRE. — **SPOROSCHISMA.** — *Berk.*

2035. **SPOROS. MIRABILE.** *Berk.* — Alb. de

l'Est. — Cette espèce selon nous fait double emploi avec *Helminthosporium truncatum* citée plus haut.

45^e GENRE. — **DENDRYPHIUM.** — *Wallr.*

2036. **DENDRY. ATRUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est.

— Sur écorces de Pin sylvestre. — Touffe de filaments bruns-noirâtres, assez longs, simples, septés jusqu'au tiers supérieur, présentant à partir de ce point des rameaux nombreux, opposés, formés par des chapelets de conidies, cylindro-elliptiques, brunes à 3 cloisons. — AR. — Soulanges. — Automne.

2037. **DENDRY. FUMOSUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est.

— Fréquent sur les tiges pourrissantes de Dahlia et d'Ortie. — Taches très noires, composées de conidies brunes, cylindriques fusiformes, munies de 6 à 10 cloisons, disposées par 3-4 en chapelet, portées par un court filament brun septé, à base rampante. — CC. — Printemps. — Partout.

2038. **DENDRY. PENICILLATUM.** *Fr.* — Alb. de

l'Est. — Sur tiges mortes de *Papaver somniferum*. — Grandes taches noirâtres, velues, composées de filaments dressés, bruns, septés, garnis au sommet de quelques rameaux et ramuscules fasciculés, porteurs de conidies elliptiques-allongées à 2-3 cloisons incolores. — C. — Printemps. — Jardins.

SECT. IV. — **DICTYOSPORÉES.** — *Sacc.*

46^e GENRE. — **SPORODESMIUM.** — *Link.*

2039. **SPOROD. ULMICOLUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts d'*Ulmus campestris*. — Groupes bruns, placés sous l'épiderme déchiré, composés de conidies incolores, puis brunes, fusiformes, renflées, munies de cloisons murales, terminées au sommet par une cellule incolore, courbe et inférieurement par un pédicelle court 1-2 septé. — C'est l'appareil conidien de *Massaria pupula*. — AC. — Printemps. — St-Amand.
2040. **SPOROD. POLYMORPHUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Pinus sylvestris*, formant des amas noirâtres, grumeleux, qui recouvrent d'anciennes cicatrices du conifère, composés d'une masse de conidies de diverses formes, pluri-cloisonnées, brunes, issues d'un *Hyphasma* constant, mais difficile à apprécier. — AC. — Soulanges, Bassu.
2041. **SPOROD. ALITOSPORII.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Rosa canina*. — Disséminé parmi les filaments bruns, qui accompagnent le *Tapezia rosæ*. — Les conidies sont brunes, elliptiques, ou subtriangulaires, munies de cloisons murales. — RR. Entre St-Amand et Lisse. — Printemps.

47^e GENRE. — **STIGMELLA.** — *Lév.*

2042. **STIGM. DRYINA.** *Lév.* — Alb. de l'Est. — A la face inférieure de feuilles de Chêne. — Petits groupes noirâtres, épars, sous-cutanés ; composés de conidies rondes, irrégulières, brunes, à cloisons murales. — AR. — Bois de Sermaize. — Printemps.

48^e GENRE. — **CONIOTHECIUM.** — *Corda.*

2043. **CONIOTH. EFFUSUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de Pin sylvestre et de Saule. — Taches noirâtres, formées par des amas de conidies subglobuleuses, ou irrégulières, brunes, transparentes, réunies en globules difformes. — C. — Bois de pins. — Partout.
2044. **CONIOTH. CONGLUTINATUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de Bouleau. — Glomérules noirs, confluent, composés de conidies petites, ovoïdes, brunes, agglutinées. — AR. — Printemps. — St-Lumier.
2045. **CONIOTH. AMENTACEARUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux morts des Saules après les gelées. — Groupes noirâtres, pulvinés, épars, composés de conidies oblongues, brunes, agglutinées en glomérules. — CC. au Printemps. — Partout.
2046. **CONIOTH. BETULINUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les rameaux morts de *Betulus*

alba. — Groupes noirs, épars, rompant l'épiderme, composés de conidies, concolores subglobuleuses, peu transparentes. — CC. — Printemps. — Partout.

2047. **CONIOTH. QUESTIERI.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles languissantes de *Cornus sanguinea*. — Taches noires irrégulières, composées de glomérules noirs, luisants, entremêlés de filaments très ténus ; chaque glomérule est formé de la réunion de 8-10 conidies incolores, puis brunes, ovoïdes. — AR. — St-Amand, St-Lumier. — Automne.

2048. **CONIOTH. FASCICULATUM.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges desséchées de *Balota nigra*. — Petits groupes noirâtres, hémisphériques, disposés régulièrement à la surface de l'épiderme, composés de conidies conglutinées, superposées, moniliformes, et fasciculées. — AC. — St-Amand, Ablancourt, etc.

49^e GENRE. — **DICTYOSPORIUM.** — *Corda.*

2049. **DICTY. ELEGANS.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Corylus avellana*. — Taches grisâtres, formées par la réunion des *Dictyosporium* ; visibles seulement à la loupe et au microscope. — Les conidies sont simples, dressées, cloisonnées murales, linguiformes, munies d'un très court pédicelle. — AR. — Printemps. — St-Amand, St-Lumier.

50^e GENRE. — **SPEIRA**. — *Corda*.

2050. **SPEIRA TORULOIDES**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Carex*. — Conidies ovoïdes, ou en fer à cheval, brun-clair, composées de cellules, moniliformes disposées sur trois rangs, munies d'un très court pédicelle. — AR. — Printemps. — Lieux humides.

51^e GENRE. — **STEMPHYLIUM**. — *Waltz*.

2051. **STEMP. PARADOXUM**. *Fuck*. — Alb. de l'Est. — Sur écorce de Pommier. — Taches noires, composées de groupes épars, de conidies noires-luisantes, de formes ovales ou cylindriques, dressées, munies d'un court pédicelle et formées de nombreuses cellules murales. — R. — St-Amand. — Printemps.
2052. **STEMP. PIRIFORME**. *Bon*. — Alb. de l'Est. — Sur le papier humide. — Taches grisâtres, composées de conidies piriformes, brunes, murales, insérées sur un hyphama à peine visible, rameux. — AR. — Hiver. — St-Amand.

52^e GENRE. — **MACROSPORIUM**. — *Fries*.

2053. **MACROS. BRASSICÆ**. *Berk*. — Alb. de l'Est. — Sur les tiges mortes de *Brassica oleracea* et d'*Hesperis matronalis*. — Taches grises, formées par les groupes épars de *Macrosporium*. Composées de filaments courts, dressés, bruns,

surmontés chacun d'une conidie grosse, piriforme-allongée, brune, cloisonnée murale. — AC. — Printemps. — St-Amand.

2054. **MACROS. MALVÆ.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Malva sylvestris*. — Taches grisâtres, composées de filaments dressés, brun-clair, munis de nombreuses cloisons, terminés chacun par une conidie grande, piriforme ou fusoïde à cloisons murales, à peine teintées presque hyalines. — AC. — Printemps. — St-Amand.

2055. **MACROS. LAGENARIÆ.** *Thüm.* — Alb. de l'Est. — Sur le fruit de *Lagenaria vulgaris*. — Taches grises, à zones concentriques, formées par les groupes mamelonnés des fascicules de *Macrosporium*, composées de filaments brun-clair, septés, terminés chacun par une conidie irrégulièrement ovoïde, brune à cloisons murales. — AC. — En hiver.

53^e GENRE. **MYSTROSPORIUM.** *Corda.*

2056. **MYSTR. STEMPHYLIUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur tige pourrissante de Chou. — Taches grisâtres formées par les groupes de conidies brunes-olivacées, à cloisons murales, et de formes très diverses, portées par des pédicelles courts concolores. — C. — Automne, printemps. — Jardins. — Partout.

54^e GENRE. — **TRICHÆGUM.** — *Corda.*

2057. **TRICHÆG. CLADOSPORIOIDES.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur branches de Saule, mortes.

— Taches grises, formées par les faisceaux épars, de *Trichæum*, composées de filaments courts, noduleux, bruns, portant à leur sommet une conidie ovale irrégulière, cloisonnée, murale et verruqueuse. — AC. — Printemps. — Partout.

55^e GENRE. — **SEPTOSPORIUM**. — *Corda*.

2058. **SEPT. BULBOTRICHUM**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri et sur grains de Maïs. — Taches grisâtres, formées par les filaments de deux natures, les uns simples, septés, brunâtres, stériles, renflés-bulbeux à la base. les autres courts concolores portant une conidie piriforme, brune, pluri-cloisonnée, murale. — C. — Printemps. — Partout.

2059. **SEPT. VELUTINUM**. *C.* et *El.* — Alb. de l'Est. — Sur branches d'*Acer*. — Taches gris-brun, composées de faisceaux de filaments stériles, bruns, septés, et de filaments fertiles, courts, portant des conidies ovoïdes piriformes, brunes, murales, pas de bulbes à la base. — C. — Automne, printemps.

56^e GENRE. — **ALTERNARIA**. — *Nées*.

2060. **ALTERN. TENIUS**. *Nées*. — Alb. de l'Est. — Sur tiges de Lis mortes et humides. — Taches noires, intenses, composées de filaments courts, terminés chacun par un long chapelet de conidies brunes, murales, lageniformes. — AR. — Jardins. — Automne. — St-Amand.

57^e GENRE. — **FUMAGO**. — *Pers.*

2061. **FUMAGO. VAGANS**. *Pers.* — Alb. de l'Est.
— Sur feuilles vivantes de Peuplier, de Ronce,
de Vigne, etc. — Taches noires-opaques; for-
mées de filaments divers, olivacés-noirâtres,
rameux, entremêlés, confus, imitant le noir de
fumée, munis de conidies la plupart didymes,
pluri-septées. — CC. — Automne. — Partout.
2062. **FUMAGO. LATERITIURUM**. *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur les briques des toits. — Taches
noires, formées de filaments rayonnants, la plu-
part stériles, les fertiles plus courts, portant des
conidies agglomérées ou en chapelet. — AR.
— Automne. Printemps.
-

SECT. V. — **STAUROSPORÉES**. — *Sacc.*

58^e GENRE. — **TRIPOSPORIUM**. — *Corda.*

2063. **TRIPOSP. ELEGANS**. *Corda.* — Alb. de
l'Est. — Sur rameaux pourris de Coudrier et
de Charme. — Taches brunes, velues, compo-
sées de filaments bruns, septés, un peu rameux,
à rameaux à angle droit; les stériles sont allon-
gés terminés en pointes; les fertiles plus courts
portent à leur sommet, des conidies, à 3-5
segments, disposés en étoile, bruns, septés,
plus pâles au sommet. — AR. — Bois de St-
Amand, St-Lumier. — Automne.

SECT. VI. — **HELICOSPORÉES.** — *Sacc.*

59^e GENRE. — **HELICOSPORIUM.** — *Nées.*

2064. **HELICOS. PULVINATUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur écaïlle de Peuplier. — Taches grisâtres composées de filaments brun-pâle, septés, très rameux, le long desquels s'insèrent des conidies cylindriques, septées et munies de gouttelettes, contournées en spirales, incolores. — AC. au Printemps en temps humide. — St-Amand et St-Lumier.
2065. **HELICOS. MULLERI.** — *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur petits rameaux de Chêne ou d'*Acer*, ayant séjourné dans les lieux inondés l'hiver. — Taches couleur gris de fer, composées d'une masse de conidies, brunes-verdâtres, contournées en spirales ou en vrilles, cloisonnées et munies de gouttelettes, issues de filaments, dressés, un peu rameux. d'une teinte plus pâle. — AR. dans les bois entre St-Amand et St-Lumier. — Printemps.
-

3^e FAM. — **Stilbées.** — *Fries.*

*Filaments pâles ou bruns, réunis en faisceau
allongé en forme de stipe.*

SECT. I. — **AMÉROSPORÉES.** — *Sacc.*

60^e GENRE. — **STILBUM.** — *Tode.*

2066. **STILBUM. ERYTHROCEPHALUM.** *Ditm.* — Alb. de l'Est. — Sur les excréments du chien. — Petites clavules, blanches, ou rosées, terminées par un capitule rougeâtre. — Cette espèce est formée par la réunion dense de longs filaments, terminés chacun par une conidie, ovale; l'épaisse couche de conidies constitue le capitule rougeâtre. — AC. — Automne. — Partout.
2067. **STILBUM. VILLOSUM.** *Mérat.* — Alb. de l'Est. — Sur les crottes de rat, dans un tas de vieille paille exposée à l'air humide. — Il se distingue du précédent par son port plus svelte, sa couleur blanche, et par ses filaments fertiles bi-quadrifurqués au sommet. — R. — St-Amand. — Automne.
2068. **STILBUM. VULGARE.** *Tod.* — Alb. de l'Est. — C. sur les écailles humides de Chêne, de Bouleau, de Peuplier. — Petits groupes de clavules blanchâtres, glabres, munies d'un capi-

tule blanc-jaunissant, presque sphérique, conidies ovales, hyalines. — CC. — Automne-Printemps. — Partout.

2069. **STILBUM. AURANTIACUM.** *Bab.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de l'*Ulmus campestris* tombés à terre. — Petits groupes de clavules simples ou fasciculées; pédicelle assez long, rouge-pourpre; capitules globuleux d'une teinte plus pâle; conidies oblongues, et tronquées-incolores. — AC. — Automne-Printemps. — St-Amand.

2070. **STILBUM. PILACRIFORME.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur bois pourri, humide, d'*Ulmus campestris* et d'*Alnus glutinosa*. — Etat conidien de *Pilacre Friesii*. — Petites clavules, blanchâtres, courtes-velues, munies d'un capitule recouvert de conidies vert-glaucue, insérées sur une couche noire formée par le sommet bifurqué et de couleur brune des filaments du pédicelle; conidie hyaline piriforme. — R. — St-Amand, Soulanges.

61^e GENRE. — **CILICIPODIUM.** — *Corda.*

2071. **CILIC. SANGUINEUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Croît en groupes sur les tiges herbacées pourries en tas, notamment sur *Dianthus plumarius*. — Clavules allongées, fibrilleuses, blanches, amincies à la base, terminées au sommet, par un capitule rouge-sanguin, formé par l'agglomération des nombreuses conidies ovoïdes

qui terminent les filaments. — AR. — Jardins.
— St-Amand. — En Automne.

62^e GENRE. — **ECCHYNA**. — *Fries*. (Pilacre *Sacc*).

2072. **ECCHINA FAGINEA**. *B. et Br.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois de Hêtre mis en tas. — Groupes épars, de petites clavules, composées d'un pédicule jaunâtre, strié, cylindrique terminé par un capitule hémisphérique, recouvert par une masse de conidies sphériques brun-clair. — Récolté à Cheminon en Automne. — AR.

2073. **ECCHYNA. WEINMANNI**. *Fr.* — Alb. de l'Est. — L'espèce décrite sous ce nom par Fries est à n'en pas douter la forme conidienne de *Pilacre* ou *Vibrisea Friesii* qui attaque fréquemment les racines de la vigne malade ; nous en avons donné la description parmi les Discomycètes, page 201. — AC. — Automne.

2074. **ECCHYNA. PORICOLA**. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur les tubes de *Polyporus salicinus* en décomposition. — Cette espèce présente tous les caractères d'*Ecchyna faginea*, à part sa station et ses dimensions plus grandes. — RRR. — Bois de St-Amand, à la Cense des Prés. — Automne.

63^e GENRE. — **COREMIUM**. — *Link.*

2075. **COREM. GLAUCUM**. *Fries*. — Alb. de l'Est. — C. sur toutes les substances sucrées et putrescibles, telles que les fruits, les confitures, etc. — Petites clavules, munies d'un pédicule blanc

composé de filaments nombreux réunis, et qui en s'étalant au sommet forment un capitule glauque, composé de conidies disposées en chapelet. — C'est évidemment une des formes nombreuses du *Penicillium glaucum*. — CC. — Partout.

2076. **COREM. NIVEUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — AC. — Partout, notamment sur écorce et aiguille de Pin sylvestre. — Ressemble au *Coremium glaucum* dont il diffère seulement par sa blancheur de neige et ses formes plus délicates. — Automne et printemps.

64^e GENRE. — **ISARIA.** — *Pers.*

2077. **ISARIA FARINOSA.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur les larves et chrysalides des insectes, recouvertes de terre. — Elle paraît au dehors sous forme d'une petite clavaire arborescente au sommet, et saupoudrée d'une masse de conidies blanches; la tige est composée de filaments très serrés, terminés supérieurement en plusieurs rameaux courts; conidies ovales allongées hyalines; c'est la forme conidienne de *Cordiceps militaris*. — AR. — Bois à St-Amand.
2078. **ISARIA. ARACHNOPHILA.** *Ditm.* — Alb. de l'Est. — Sur les corps des araignées mortes. — Se présente sous forme de rameaux allongés, simples, disposés en faisceaux; de la tige des rameaux, formée par la réunion des filaments partent des ramuscules nombreux, en épis, terminés chacun par un capitule composé de

basides piriformes et de petites conidies ovales hyalines. — C'est probablement le *Sterigmatocystis candida* (Sacc). — AR. — Printemps. — St-Amand.

2079. **ISARIA ELEUTHERATORUM.** *Nées.* — Alb. de l'Est. — Sur larves d'insectes. — Rameaux filamenteux blancs, très longs, sinueux terminés par 3 ou 4 ramuscules, couverts de nombreuses conidies, hyalines, très petites, ovales-allongées — AR. dans les bois à St-Lumier.

2080. **ISARIA BRACHIATA.** *Schum.* — Alb. de l'Est. — Sur les chapeaux des Agaricinés pourris et desséchés. — Se présente sous forme de petits rameaux, simples, amincis au sommet, composés de filaments réunis, et garnis de sporophores nombreux, terminés par un capitule de conidies, petites hyalines. — AC. — Bois de pins. — Bassu, Soulanges.

2081. **ISARIA UMBRINA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur *Fraxinus* et *Prunus spinosa*. — Petites clavules velues, simples ou rameuses, couleur café au lait, entourant ordinairement l'*Hypoxyylon fragiforme*, dont il est l'appareil conidien, les filaments fertiles semblent appartenir au genre *Verticillium*. — AC. — Automne. — St-Amand.

65^e GENRE. — **CERATIUM.** — A. S.

2082. **CERATIUM HYDNOIDES.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois pourri de Chêne et de Pin — Groupes de petits troncs, rameux, à rameaux contournés, de consistance molle ;

fermes avec l'âge, de couleur blanc de neige puis jaunâtres, couverts sur toute la surface de spicules terminées chacune par une conidie elliptique, grosse, hyaline. — AC. — Automne, Printemps.

2083. **CERATIUM. PYXIDATUM.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de Chêne pourris et sur tige sarmenteuse de Houblon. — Se présentant sous forme de petites clavules blanches, fasciculées, réunies à la base, 2-4 ; la surface des clavules est hérissée de basides acuminées, surmontées chacune d'une conidie elliptique munie d'une cloison médiane. — Cette espèce me semble appelée à faire partie d'un genre particulier. — C. — Automne. — Printemps. — Partout.
-

SÉR. — **PHÆOSTILBÉES.** — *Sacc.*

SECT. I. — **AMEROSPORÉES.** — *Sacc.*

66^e GENRE. — **SPOROCYBE.** — *Fries.*

2084. **SPOROCYBE BYSSOIDES.** *Bon.* — Alb. de l'Est. — C. sur les tiges des grandes herbes. — Petites taches velues, formées par les groupes nombreux de *Sporocybe*, composés chacun d'un pédicule noirâtre, rigide et d'un capitule olivacé produit par l'écartement de l'extrémité des filaments munis de nombreuses conidies

obovales, olives. — AC. — Automne-Printemps.
— Partout.

2085. **SPOROCYBE CUNEIFERA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Saponaria* et de *Dianthus*. — Taches noirâtres, formées par les groupes de *Sporocybe*, à pédicules, filamenteux, noirs, écartés au sommet, en gerbe, presque incolores, et surmontés de conidies hyalines cunéiformes. — R. — St-Amand. — Jardins. — Au Printemps.

2086. **SPOROCYBE FASCICULATA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Cette espèce ressemble au *Sporocybe Atra* et n'en diffère que par sa disposition en faisceaux et par ses conidies ovoïdes plus petites. — Croît en Automne sur le bois pourri. — AR. — St-Amand.

2087. **SPOROCYBE ATRA.** *Succ.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et chaumes de *Carex* et de *Festuca*. — Epars et en petit nombre, à pédicules rigides, noirs, formés de filaments qui s'écartent brusquement au sommet, pour former un capitule hémisphérique, couvert de conidies oblongues-fusoïdes-olivacées. — AC. — Automne-Printemps. — St-Amand.

2088. **SPOROCYBE CARNEA.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur lattes de Chêne depuis longtemps dans une cave. — Cette espèce a l'aspect et la couleur d'un *Ædocephalum agaricinum*, c'est une stilbinée à stipe formé de filaments réunis, septés, couleur de chair, capitule sphérique, compact, couvert de conidies roses, elliptiques. — R. — St-Amand. — Été.

67^e GENRE. — **GRAPHIUM**. — *Corda*.

2089. **GRAPH. RIGIDUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur écailles de bois humide, notamment du
Pin sylvestre. — Groupes de *Graphium* épars,
munis chacun d'un pédicelle noir, rigide.
subulé, portant au sommet un capitule sphé-
rique, blanc, aqueux puis compact et gris :
conidies petites, fusoïdes. — C. — Automne,
Printemps. — St-Amand.

2090. **GRAPH. FISSUM**. *Preuss.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges mortes de *Solanum dulcamara*.
— Formant des groupes très nombreux de
Graphium à pédicule noir, fibrilleux, les fila-
ments du sommet sont dilatés en gerbes, et parse-
més çà et là, même le long de la tige, de conidies
hyalines, fusoïdes. — AR. — St-Amand. —
Automne.

2091. **GRAPH. STRICTUM**. *Preuss.* — Alb. de
l'Est. — Sur le bois putride. — Petits groupes
noirâtres de *Graphium*, munis d'un pédicule
noir, plus pâle au sommet, disposé en pinceau
formant un capitule muqueux, blanc, de coni-
dies ovales. hyalines. — Printemps. — St-
Amand.

68^e GENRE. — **HARPOGRAPHIUM**. — *Sacc.*

2092. **HARP. FASCICULATUM**. *Sacc.* — Alb.
de l'Est. — Sur *Prunus domestica* et sur *Acer*.
— Etat conidien d'*Eutypa heteracantha*, qu'il

accompagne sur le support, formant de petites massues brunes, filamenteuses, couvertes presque entièrement de conidies. — AR. — St-Amand. — Automne.

69^e GENRE. — **STYSANUS**. — *Corda*.

2093. **STYSANUS. STEMONITES**. *Corda*. — Alb. de l'Est. — Sur racines pourries et sur plantes herbacées mises en tas. Groupes très denses, formant des taches grises, composées de pédicules rigides, noirâtres, filamenteux, terminés par un capitule cylindrique, blanchâtre, formé par l'extrémité des filaments, muni de conidies ovales, incolores. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.

2094. **STYSANUS CLEMATIDES**. *Fuck*. — Alb. de l'Est. — Sur les sarments pourris de *Clématitis Vitalba*. — Cette espèce forme une petite forêt de capitules ovoïdes, gris-argentés, portés par des pédicules bruns-noirâtres, filamenteux, les conidies insérées au sommet des filaments, sur de petites basides verruqueuses, sont ovales, allongées, incolores. — C. — Jardins. — Automne, Printemps.

70^e GENRE. — **ANTROMYCES**. — *Fres*. —

2095. **ANTROMYC. COPRIDIS**. *Fres*. — Alb. de l'Est. — Espèce communiquée par M. Boudier de Montmorency. — Inscrite ici pour mémoire. — Très voisine du genre *Arthrobotryum*. — Naissant dans la coque d'une chrysalide de

Copris, ses conidies sont uniseptées, disposées en chapelet. — RRR.

SECT. II. — **PHRAGMOSPORÉES.** — *Sacc.*

71^e GENRE. — **ARTHROBOTRYUM.** — *Ces.*

2096. **ARTH. STILBOIDEUM.** *Ces.* — Alb. de l'Est. — Sur les troncs pourris de Peuplier, coupés près du sol. — Petites clavules noires, dressées, un peu renflées au milieu, dont les filaments s'écartent en gerbe au sommet et portent chacun une conidie elliptique fusoïde, à 2-3 cloisons. — C. Bois de St-Amand à St-Lumier. — Printemps.
-

4^e FAM. — **Tuberculariées.**

Filaments pâles ou bruns, agglutinés et réunis en forme de tubercule ayant souvent pour base un strome un peu épais.

SECT. I. — **AMÉROSPORÉES.** — *Sacc.*

1^{er} GENRE. — **TUBERCULARIA.** — *Tode.*

2097. **TUBERCULARIA VULGARIS.** *Tode.* — Alb. de l'Est. — CC. sur l'écorce d'Erable. -- C'est l'appareil conidien de *Nectria cinnabarina*. — Tubercules nombreux, hémisphériques rouge-

vermillon, à strome plus pâle, composé d'une masse de filaments rameux, portant sur leur trajet et au sommet des conidies elliptiques-allongées, incolores ; toute l'année — Partout.

2098. **TUBERCULARIA PEZIZOIDEA.** *Schw.* — Alb. de l'Est. — Sur jeunes rameaux de Peuplier. — Tubercules en forme de disques, jaunes-orangés, formés par la réunion compacte de filaments dressés, terminés chacun par une conidie incolore sphérique. — AR. — Bois de St-Amand et St-Lumier. — Automne.

2099. **TUBERCULARIA SARMENTORUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur les sarments de Vigne, et de *Clematis Vitalba*. — Tubercules petits, couleur pourpre, sortant de dessous l'épiderme, disposés en lignes longitudinales ; conidies cylindriques courbes, petites, hyalines. — AC. — Partout.

2100. **TUBERCULARIA HYDNOIDEA.** *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de Peuplier humides ; affectant deux formes, l'une sphérique ou lobée, l'autre divisée en rameaux claviformes couleur rouge-pâle ou rose, couverte à la surface par des conidies incolores, elliptiques relativement très grandes. — R. en hiver. — Bois de St-Lumier.

2101. **TUBERCULARIA VERSICOLOR.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Buxus sempervirens*. — Tubercules rouge-pâle, aplatis ou un peu convexes, formés par des filaments continus très longs, portant chacun à leur sommet,

une conidie incolore, elliptique, très grande. —
Etat conidien de *Nectria Demazieri*. — AC. —
Jardins. — St-Amand. — Printemps.

2^e GENRE. — **DENDRODOCHIUM**. — *Bon.*

2102. **DENDR. CITRINUM**. *Grave.* — Alb. de l'Est.
— Sur cône de *Pinus Sylvestris*. — Tubercules
très petits. jaune-citron, ovoïdes ou pezizoïdes,
composés de filaments droits, septés, fasciculés,
donnant naissance dans leur longueur et au
sommet à de petites conidies incolores, ellipti-
ques avec deux gouttelettes. — AC. — Prin-
temps-Automne. — Bois de Pins. — Partout.

3^e GENRE. — **TUBERCULINA**. — *Sacc.*

2103. **TUBER. PERSICINA**. *Sacc.* — Alb. de
l'Est. — Sur feuilles d'*Euphorbiacées* attaquées
par différents *Æcidium*, dont il remplit la
cupule avec ses tubercules, arrondis, sail-
lants, et violacés ; ces tubercules sont for-
més des basides irrégulières qui portent à leur
sommet des conidies ovales, incolores. — AR.
— Été.

4^e GENRE. — **ILLOSPORIUM**. — *Mart.*

2104. **ILLOSP. ROSEUM**. *Mart.* — Alb. de l'Est.
— Croît sur les thalles de plusieurs lichens,
sous forme de tubercules roses, arrondis ou
lobés, composés de filaments tortueux, donnant
naissance à des conidies ovoïdes. — AR. —
Automne. — St-Amand.

2195. **ILLOSP. COCCINEUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est.
— Sur rameaux d'Orme, envahis par un *Parmelia*. — Tubercules rouge-carmin, sphériques granuleux, placés sur une membrane blanche, étalée sur le lichen ; conidies ovales, ou globuleuses, recouvrant la surface. — AR. en Automne.
— Aulnay-l'Aître.

5^e GENRE. — **ÆGERITA.** — *Pers.*

2106. **ÆGERITA ALBA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les Péricarpes humides de l'*Æsculus hypocastanum*. — Groupes de tubercules sphériques, blancs, formés par l'agglomération des conidies ovales, hyalines. — AR. — Bois de St-Lumier. — Automne.
2107. **ÆGERITA TORULOSA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est
— Récolté sur la terre des fosses à Pulpes.
— Tubercules de 2 à 4 millimètres, sphériques, blancs, composés de cellules basilaires, fusoïdes, surmontées de conidies ovales-cylindriques, en chapelet, incolores. — R. — St-Amand. — Automne.
2108. **ÆGERITA CANDIDA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur branches de Chêne pourries. — Tubercules nombreux, très petits, sphériques, blancs, groupés, composés de sporophores sinueux, terminés à la Périphérie de l'*Ægerita*, par des conidies incolores, rondes ou ovales. — AC.
— Dans les forêts. — Automne.

6^e GENRE. — **FUSICOLLA.** — *Bon.*

2109. **FUSICOLLA CORTICALIS.** — *Karst.* — Alb.

de l'Est. — Sur les rameaux de Saule Marceau humides. — Petits tubercules, blancs, ronds, aplatis, confluent, se désagrégant dans l'eau. et répandant des masses de conidies en bâtonnets incolores. — AR. — St-Amand, St-Lumier. — Hiver.

2110. **FUSICOLLA PHRAGMITIS.** *Karst.* — Alb. de l'Est. — Sur chaumes et rhizomes d'*Arundo Phragmites*. — Tubercules jaune-orangé, de diverses formes, sphériques, coniques ou en cupules, composés de filaments rameux, dressés, porteurs de conidies elliptiques, incolores, munies de deux gouttelettes. AR. — Automne. — Fossés du château d'Aulnay.

7^e GENRE. — **SPHACELIA.** — *Lév.*

2111. **SPHACELIA SEGETUM.** *Lév.* — Alb. de l'Est. — Membrane enveloppant l'Ergot de Seigle, blanche ridée, munie de conidies petites, hyalines, elliptiques, portées par des basides fasciculées. — Etat conidien du *Claviceps Purpurea*. — CC. — Été. — Partout.

2112. **SPHACELIA TYPHINA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les gaines du *Dactylis Glomerata*. — Précède l'apparition des périthèces d'*Epiclloe typhina*. — Sous forme d'un duvet blanchâtre, composé de basides simples, terminées par des conidies elliptiques, hyalines. — C. en Automne. — Bois, prairie. — Partout.

8^e GENRE. — **HYMENULA.** — *Fries.*

2113. **HYMEN. RUBELLA.** *Fries.* — Alb. de l'Est.

— Sur tiges mortes d'*Arundo Phragmites*. — Tubercules disciformes, épars, jaune-citron, céracés, gélatineux, composés de filaments allongés, continus, terminés chacun par une conidie hyaline, cylindrique. — AR. — Bords des ruisseaux. — St-Amand, Lisse. — Automne.

9^e GENRE. — **CYLINDROCOLLA**. — *Bon.*

2114. **CYLINDR. URTICÆ**. *Bon.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'Ortie. — Tubercules rouge-orangé, céracés, composés de filaments rameux porteurs de conidies cylindriques, un peu courbes, ou fusoïdes. — Etat conidien de *Calloria fusarioides*. — CC. — Automne-Printemps.

2115. **CYLINDR. DUBIA**. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles de bois pourri. — Tubercules blanc de neige, petits, sphériques, formés de filaments, porteurs de conidies cylindriques, granuleuses, placées bout à bout comme dans *Chalara*. — AR. — Bois de St-Amand. — Hiver.

10^e GENRE. — **SPHÆRIDIDIUM**. — *Fres.*

2116. **SPHÆR. CITRINUM**. *Sacc. et Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur écailles humides de Peuplier. — Très petits flocons jaunes, épars, sessiles ou pédicellés, composés de filaments, formés par des conidies cylindriques, en chapelets très longs, et rameux, jaunes, hyalins. — R. — St-Amand. — Automne.

11^e GENRE. — **PERIOLA**. — *Fries*.

2117. **PERIOLA HIRSUTA**. *Fr.* — Alb. de l'Est.
— Sur bois pourri. — Tubercules blancs, sub-sphériques, couverts de longs cils, concolores, terminés en crochet; ces tubercules sont composés d'un amas de conidies, elliptiques, incolores, granulées. — AR. — St-Amand. — Printemps.
2118. **PERIOLA TOMENTOSA**. *Fr.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges pourries de Pommes de terre. — Petits tubercules blancs, velus, épars, composés de cellules centrales, qui émettent à leur sommet des conidies elliptiques, blanches, disposées en chapelets. — AC. — Lieux humides. — Automne. — St-Amand.

12^e GENRE. — **VOLUTELLA**. — *Tode*.

2119. **VOLUTELLA SETOSA**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — C. sur les tiges herbacées, et sur le bois pourri. — Tubercules sphériques, blancs, couverts de longs poils, dressés, concolores, composés de conidies globuleuses, hyalines, très petites. — CC. — Automne, Printemps. — St-Amand.
2120. **VOLUTELLA BUXI**. *Berk.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles et tiges de Buis. — Tubercules, sub-sphériques, roses, couverts de longs poils, concolores, septés; composés de filaments tortueux, rameux, hyalins, terminés par des conidies elliptiques, fusoïdes, munies de deux gout-

- telettes. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.
2121. **VOLUTELLA ARUNDINIS.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur *Arundo Phragmites*. — Plaques velues, elliptiques, blanc-rosé, composées de longs filaments simples, à la base desquels sont amassées des conidies, elliptiques, fusoides, hyalines, très nombreuses. — C. — Lieux marécageux. en Hiver. — A St-Amand.
2122. **VOLUTELLA CYPERACEARUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de *Poa aquatica*. — Petits tubercules hémisphériques, rose-rouge, entourés de longs poils noirs, septés, composés de conidies cylindriques, courbes, amincies à la base, munies de gouttelettes incolores, et portées par un strome granuleux. — AR. — Lieux humides. — St-Amand. — Automne.
-

SECT. II. — **PHRAGMOSPORÉES.** — *Sacc.*

13^e GENRE. — **BACTRIDIIUM.** — *Kunze.*

2123. **BACTR. FLAVUM.** *K. et S.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs pourris et humides d'Orme et d'Aulne. — Tubercules globuleux, jaune-orangé, tuberculeux épars. composés de filaments qui émettent des pédicelles courts, terminés chacun par de longues conidies claviformes, à 4 cloisons, les 3 cellules médianes sont jaunes, et les deux extrêmes hyalines. — C. — Hiver-Printemps. — St-Amand.

14^e GENRE. — **FUSARIUM.** -- *Link.*

2124. **FUSARIUM PYROCHROUM.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts d'*Acer* et de *Sambucus nigra*. — Tubercules en groupes, arrondis, de couleur d'ocre ; composés de courts pédicelles, porteurs de très nombreuses conidies, fusoides arquées, munies de 3-5 cloisons. — AC. — Automne-Printemps. — St-Amand.
2125. **FUSARIUM PALLENS.** *Nées.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes d'*Angelica sylvestris*. — Tubercules blanc-rosé, couverts de conidies cylindriques, continues ou uniseptées, portées par de longues basides, simples ou bifurquées, insérées sur un strome brunâtre. — AC. — Bois. — St-Amand. — Automne.
2126. **FUSARIUM SAMBUCINUM.** *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur troncs et rameaux de *Sambucus nigra*. — Tubercules hémisphériques, rouge-pâle. pruneux ; composés de conidies, fusiformes, courbes. apiculées, portées par des sporophores concolores. septés. — C. — Printemps. — Partout.
2127. **FUSARIUM ROSEUM.** *Link.* — Alb. de l'Est — Sur les feuilles de Buis. — Tubercules rose-orangé, petits, épars, formés par un strome, portant à sa surface des conidies fusiformes, triseptées, recourbées aux extrémités. — C. au Printemps. — Partout.
2128. **FUSARIUM SOLANI.** *Sacc.* — Alb. de l'Est.

— Sur Pommes de terre pourries. — Tubercules globuleux, irréguliers, tomenteux, composés de filaments rameux, portant des conidies hyalines, fusiformes, arquées, triseptées. — CC. — Partout en Automne et Printemps.

2129. **FUSARIUM HETEROSPORUM**. *Nées*. — Alb. de l'Est. — Sur les épis de Seigle et de *Bromus Pinnatus*. — Attaque les grains sous forme de petites plaques roses, rougeâtres au centre, composées de courtes basides, surmontées de conidies, fusoïdes, arquées. — C. — St-Amand. — Soulanges. — Bords des chemins au Printemps.

2130. **FUSARIUM ZEÆ**. *Sacc*. — Alb. de l'Est. — Sur les chaumes et feuilles de Maïs. — Tubercules petits, rosés, composés de filaments rameux, terminés par des conidies fusoïdes, arquées, triseptées. — AC. — Aulnay-l'Aître. — Printemps, Hiver.

2131. **FUSARIUM GALLINACEUM**. *Cooke*. — Alb. de l'Est. — Sur les pattes et sur les ailes de poules mortes. — Tubercules aplatis, rouge-vermillon, ciliés sur les bords blanchâtres, composés de filaments rameux, porteurs de conidies, fusiformes, irrégulières, munies de gouttelettes. — Récolté à Soulanges plusieurs fois au Printemps. — R.

2132. **FUSARIUM AURANTIACUM**. *Sacc*. — Alb. de l'Est. — Sur les *Cucurbitacées*. — Tubercules hémisphériques, aplatis, confluent, entourés de filaments blancs, stériles, de couleur rouge-orangée, composés de filaments ténus,

très rameux, portant des conidies fusiformes, arquées, triseptées. — CC. — Automne. — Jardins. — Partout.

2133. **FUSARIUM MINUTULUM.** *Corda.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de *Corylus avellana*. — Tubercules blancs, très petits, groupés, confluent, composés de filaments simples, ou bifurqués, portant chacun une conidie elliptique, fusoïde incolore. — AR. — St-Lumier. — Printemps.

2134. **FUSARIUM OXYSPORUM.** *Schlecht.* — Alb. de l'Est. — Sur l'écorce des melons. — Tubercules, convexes, verruqueux, confluent, composés de conidies courbes, aiguës, de couleur rose. — Semble ne différer du *Fusarium aurantiacum* que par la teinte des tubercules. — CC. — Jardins. — Automne.

15^e GENRE. — **PIONNOTES.** — *Fries.*

2135. **PIONN. BETÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur racines de Betteraves en décomposition. — Tubercules gélatineux, irréguliers, aplatis, composés de filaments fasciculés ou rameux, portant des conidies hyalines, fusiformes, arquées. — CC. — Automne, Hiver. — Partout.

TUBERCULARIÉES DEMATIÉES. — *Sacc.*

SECT. I. — **AMEROSPORÉES.** — *Sacc.*

16^e GENRE. — **EPICOCCUM.** — *Link.*

2136. **EPICOCCUM VULGARE.** *Corda.* — Alb. de

l'Est. — Sur les tiges et feuilles des herbes pourrissantes. — Tubercules convexes, de couleur pourpre-noircissant, placés sur des taches concolores, plus pâles, composées de conidies brunes. aréolées, pointillées, portées par un court pédicelle hyalin. — CC. — Automne, Printemps. — Partout.

2137. **EPICOCCUM NEGLECTUM.** *Desm.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles languissantes et sur les chaumes de Maïs. — Tubercules ponctiformes, très noirs, petits, groupés, mais non insérés sur une tache, composés de conidies brunes, réticulées, munies d'un court pédicelle hyalin. — AC. — En Automne. — Partout.

17^e GENRE. — **HYMENOPSIS.** — *Sacc.*

2138. **HYMENOPSIS ELLIPSOSPORA.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur gaines d'*Arundo Phragmites*. — Tubercules noirs, elliptiques ou hémisphériques, formés par des filaments denses, simples, portant à leur sommet des conidies brunes, elliptiques-fusiformes. — AR. — St-Lumier, St-Amand. — Automne, Printemps.
2139. **HYMENOPSIS TYPHÆ.** *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Typha* et de *Juncus communis*. — Tubercules en disques noirs, margnés, épars, composés de basides simples, dressées, denses, verdâtres, portant des conidies fusiformes-elliptiques, concolores, munies de 2 gouttelettes. — AC. — Lieux marécageux — St-Amand, Lisse.

18^e GENRE. — **CHÆTOSTROMA**. — *Corda*.

2140. **CHÆTOS. CARICIS**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur les tiges desséchées de *Carex*. — Cette espèce indiquée par Saccardo, avec un point de doute me paraît être la même que *Hymenopsis Typhæ* citée plus haut.
2141. **CHÆTOS. ATRUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur chaumes de *Scirpus lacustris*. — Tubercules noirs, trémelloïdes, entourés de poils concolores très longs, peu nombreux, formés de basides simples, courtes, terminés par des conidies fusoides, verdâtres, munies de deux gouttelettes. — AC. — Lieux marécageux. — Automne, Printemps.

19^e GENRE. — **MYROTHECIUM**. — *Tode*.

2142. **MYROTH. CINCTUM**. *Sacc.* — Alb. de l'Est.
— Sur tiges de *Poa*, desséchées. — Tubercules noirs, hémisphériques, entourés à la base d'une collerette de filaments tortueux, blanchâtres, formés par des basides simples, denses, terminés par des conidies fusoides, brunes-verdâtres, sans gouttelettes. — AR. — Bois de St-Amand, St-Lumier. — Printemps.
2143. **MYROTH. GRAMINUM**. *Libert.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges d'*Agrostis vulgaris*. — Tubercules noirs, ronds, un peu convexes, entourés à la base, de longs poils, blanchâtres, composés de filaments ou basides, simples, terminés par

des conidies cylindriques, fusiformes, hyalines.
— AR. — Automne. — St-Amand.

SECT. II. — **ASTÉROSPORÉES.** — *Sacc.*

20^e GENRE. — **STEPHANOMA.** — *Wallr.*

2144. **STEPH. STRIGOSUM.** *Wallr.* — Alb. de l'Est. — Parasite sur le disque de *Peziza hemispherica*. — Forme conidienne d'*Hypomyces pezizæ*. — Composé de filaments rampants, qui émettent sur leur trajet des pédicelles dont le sommet renflé est entouré de conidies à lobes arrondis, disposés en étoiles hyalines. — RR. Bois de Sermaize. — En Été.
-

SECT. III. — **PHRAGMOSPORÉES.** — *Sacc.*

21^e GENRE. — **EXOSPORIUM.** — *Link.*

2145. **EXOSP. TILIÆ.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Tubercules noirs, convexes, pulvinés, portant à leur surface des conidies, claviformes, ou fusoïdes, pluriseptées, brunes-olivâtres. — CC. Sur les rameaux morts du Tilleul. — Automne, Printemps. — Partout.
-

MYCELIA STERILIA. — *Fries.*

Tissus fongiques privés de Fructification.

SCLEROTIUM. *Mycelium Quiescens.*

2146. **SCLEROT. SPHÆRIÆFORME.** *Lib.* — Alb. de l'Est. — Sur tiges mortes, notamment d'*Allium cœpa*, parmi les détritns des Jardins. — CC. — St-Amand, etc. — Automne. — Mycelium de *Pleospora allii*.
2147. **SCLEROT. CORNUTUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur le chapeau et les lamelles de *Russula nigricans*. — CC. dans les bois de Trois-Fontaines, Charmont. — Automne. — Mycelium d'une Agaricinée.
2148. **SCLEROT. PUSTULA.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Chêne mortes et encore adhérentes aux rameaux. — AC. — St-Lumier. — Automne, Hiver. — Selon Lèveillé, Mycelium de *Peziza candollebana*.
2149. **SCLEROT. FUNGORUM.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur chapeau et lamelles d'*Hebeloma crustuliniforme*. — AC. — Plantations de Pins. — St-Amand. — Été, Automne. — Mycelium de *Collybia Tuberosa*.
2150. **SCLEROT. LACUNOSUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est. — Sur chapeau et lamelles d'Agaricinées en décomposition, dans les bois de Pins. — Se distingue de la précédente espèce par ses tuber-

- cules irréguliers et creusés de lacunes. — AC.
— St-Amand, Soulanges. — Été-Automne.
2151. **SCLEROT. SCOLYMI.** *West.* — Alb. de l'Est.
— Sur les feuilles anciennes d'Artichaut. — Placé
en petits groupes brunâtres près de l'insertion
de la feuille sur le talon. — CC. — Jardins. —
Automne. — St-Amand, etc.
2152. **SCLEROT. ELONGATUM.** *Fuck.* — Alb. de
l'Est. — Sur la nervure principale des feuilles de
Chêne tombées à terre. — Elliptique, rougeâtre,
rugueux, strié, superficiel. — AC. — Bois de
St-Amand. — Printemps.
2153. **SCLEROT. LILIACEARUM.** *Kickx.* — Alb.
de l'Est. — Sur les tiges de *Muscari comosum*
et sur *Ornithogalum pyreneaticum*. — CC. —
Automne. — St-Amand.
2154. **SCLEROT. COMPLANATUM.** *Tode.* — Alb.
de l'Est. — Sur feuilles humides et pourries de Peu-
plier et d'Aulne. — Tubercules blancs, aplatis,
cunéiformes. — CC. — St-Amand. — Automne.
2155. **SCLEROT. PIRINUM.** *Fr.* — Alb. de l'Est.
— Sur l'épiderme des poires pourries à la cave.
— Tubercules noirs, ronds, irréguliers. — CC.
— Hiver. — Partout.
- 2156 **SCLEROT. SARMENTICOLUM.** *West.* —
Alb. de l'Est. — Sur jeunes rameaux de Vigne
morts, encore adhérents au cep. — Elliptique,
gris-noirâtre. — C'est sans doute une variété
de *Scler. Durum* — Il donne naissance au
Botrytis cinerea. — CC. — Jardins.
2157. **SCLEROT. SEMEN.** *Tode.* — Alb. de l'Est.

- Sur les tiges mortes et pourrissantes des légumes et des grandes herbes. — Tubercules sphériques, petits, passant du blanc au noir. chagrinés. — CC. — Hiver-Printemps. — Partout.
2158. **SCLEROT. JUGLANDINUM.** *West.* — Alb. de l'Est. — A l'intérieur des écailles de Noix pourries, dans les lieux humides. — AC. — Jardins. — St-Amand, Aulnay, etc. — Partout. — Automne, Printemps.
2159. **SCLEROT. SCUTELLATUM.** *Alb. et Schw.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles d'*Acer* et leurs pétioles. — Tubercules ronds, aplatis en scutelle, bruns. — AR. — Bois de St-Amand à St-Lumier. — Mycelium de *Typhula Erythropus*.

RHIZOCTONIA. — D. C.

2160. **RHIZOCT. MEDICAGINIS.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur racines de *Medicago Sativa* qu'il entoure d'un Mycelium filamenteux, violacé, très abondant et parfois parsemé de périthèces sphériques, noirâtres, stériles. — AC. — Champs. — Automne-Hiver. — St-Amand, etc. — *Nuisible*.
2161. **RHIZOCT. DAUCI.** *Rebent.* — Alb. de l'Est. — Sur racines des Carottes pourrissantes dans les caves. — Composé d'un Mycelium filamenteux, rougeâtre, moins dense que le précédent et plus rare. — St-Amand. — Hiver.
2162. **RHIZOCT. SOLANI.** *Kühn.* — Alb. de l'Est. — Sur les tubercules de *Solanum tuberosum* à la cave, dans l'Hiver. — Filaments rameux, anastomosés, bruns-rougeâtres. — Peu développé

par conséquent moins nuisible que les précédents. — St-Amand.

RHIZOMORPHA. — Roth.

2163. **RHIZOM. CORTICALIS.** — Alb. de l'Est. — Stromes noirâtres, luisants, très allongés, de formes diverses, en filets arrondis, ou comprimés élargis, à rameaux anastomosés; croissant sous l'écorce des vieux troncs cariés. — C'est le Mycelium d'une Agaricinée nuisible *Armillaria mellea*. — CC. — Bois. — Partout.
2164. **RHIZOM. SAMBUCCI.** Chev. — Alb. de l'Est. — Sur la moelle des rameaux de *Sambucus nigra* pourris. — Longs filaments bruns-noirâtres, parallèles et longitudinaux. — CC. dans les jardins, vieilles haies. — St-Amand. — Automne.
2165. **RHIZOM. FRAGILIS.** Schmitz. — Alb. de l'Est. — Stromes très allongés, cylindriques, d'un brun-rougeâtre, luisants; rameaux étalés, alternes, les supérieurs opposés ou verticillés. — C. sur les troncs pourris. — Je pense que c'est une variété moins robuste de *Rhiz. corticalis*.
2166. **RHIZOM. SETIFORMIS.** — Alb. de l'Est. — Sur tiges de *Scirpus lacustris* pourrissant. — Long filament brun-clair, partant de la base du chaume au sommet, émettant des rameaux latéraux parsemés de globules ovales, jaunâtres, tuberculeux. — (conidies?). — AR. — St-Lumier.

HIMANTIA. — *Pers.*

2167. **HIMANTIA CANDIDA.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles et sur le bois pourris mis en tas. — Expansion filamenteuse, blanche, à filaments radiés, plus ou moins membraneuse. — AC. en Automne. — Partout.

2168. **HIMANTIA CELLARIS.** *Pers.* — Alb. de l'Est. — Sur les murs et sur la terre des celliers et caves humides. — Tissu membraneux, arachnoïde, brun-noirâtre, composé de filaments partant d'un centre commun. — AC. — Hiver, printemps. — Partout.

HYPHA. — *Rabh.*

2169. **HYPHA GIGANTEA.** *Chev.* — Alb. de l'Est. — Sur les vieilles charpentes et dans les plafonds de masures abandonnées. — Plaques très larges, blanches puis jaunâtres, ressemblant à de l'amadou. — AC. — St-Amand, etc.

2170. **HYPHA ALUTA.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Croît dans les mêmes localités que la précédente espèce, sous forme de plaques très minces, veloutées, jaune-cannelle. — AC.

OZONIUM. — *Link.*

2171. **OZONIUM AURICOMUM.** *Link.* — Alb. de l'Est. — Sur le bois de chêne travaillé, vieux et pourri, charpentes, seaux domestiques, etc. — Houppes fasciculées de filaments orangés,

raides. — Mycelium d'un Coprin. — AC. — Automne. — Partout.

2172. **OZONIUM AUREUM.** — Alb. de l'Est. — Sur les racines languissantes des arbres fruitiers et autres. — Coussinets velus, de couleur d'or puis rougeâtre. — C'est sans doute le *Chroolepus aureus*. — AC. — Automne. — St-Lumier, St-Amand.
-

EXANTHEMATA. — *Kickx.*

Pseudo-Mycètes.

Altérations pathologiques dues à des piqûres d'Insectes.

PHYLLERIUM. — *Fries.*

2173. **PHYLL. PIRINUM.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, roux-ferrugineux, assez larges, envahissant la face inférieure des feuilles du Poirier. — C. — Automne.
2174. **PHYLL. VITIS.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, blanches, puis rosées, sous les feuilles de Vigne qu'elles déforment sans nuire à la végétation. — CC. — Partout. — Été.
2175. **PHYLL. JUGLANDIS.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, oblongues-rectangulaires, jaune-roussâtre, sous les feuilles du Noyer. — CC. — Été, automne.
2176. **PHYLL. TILIACEUM.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, jaunes puis pourpres, sous les feuilles de Tilleul. — CC. — Automne.

2177. **PHYLL. PADI.** — Alb. de l'Est. — Taches velues d'une belle couleur rose, puis orangée ; sous les feuilles de *Prunus Padus*. — AR. — Automne.

ERINEUM. — *Pers.*

2178. **ERINEUM. FAGINEUM.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, blanc-rosé, sous les feuilles de *Fagus sylvatica*. — C. — Automne.

2179. **ERINEUM ALNEUM.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, blanches, puis rouge-cinabre sous les feuilles d'*Alnus glutinosa*. — C. — Été.

2180. **ERINEUM PLATANOIDEUM.** — Alb. de l'Est. — Taches velues, blanches puis ferrugineuses. — Sous les feuilles d'*Acer pseudo-platanus*. — C. — Été, automne.












NOSOPHLÆÉES. — *Fries.*




















Renflements bulleux de l'épiderme des troncs et rameaux vivants, s'ouvrant par fentes et laissant échapper sous forme de corpuscules pulvéreux, les cellules désagrégées de l'écorce.















2181. **NOSOPHLÆA ALNEA.** — Sur les troncs vivants d'*Alnus glutinosa*. — Epiderme soulevé en phlyctènes rougeâtres, participant de la coloration des cellules sous-jacentes. — Il n'est pas rare de voir les troncs des pommiers atteints de la même altération pathologique.

















LISTE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.

Chaque nom de Genre est suivi d'un nom d'Espèce-Type
dont la Spore est représentée avec l'indication
de sa dimension réelle.

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
187.	ACETABULA.	<i>Fuckel. Acet. Acetabulum.</i>	 0 ^{m.m} 012
421.	ACREMONIUM.	<i>Sacc. A. Alternatum.</i>	 0 ^{m.m} 003
426.	ACROCYLINDRIUM.	<i>Sacc. A. Cordæ.</i>	 0 ^{m.m} 01
351.	ACROSPERMUM.	<i>Tode. A. Compressum.</i>	 0 ^{m.m} 16
426.	ACROSTALAGMUS.	<i>Cord. A. Cinnabarinus.</i>	 0 ^{m.m} 003
460.	ACROTHECIUM.	<i>Sacc. A. Obovatum.</i>	 0 ^{m.m} 021
234.	ACTINOSPIRA.	<i>Cord. A. Chartarum.</i>	 0 ^{m.m} 003
166.	ÆCIDIUM.	<i>Pers. Æ. Tragopogonis.</i>	 0 ^{m.m} 021
482.	ÆGERITA.	<i>Pers. Æ. Candida.</i>	 0 ^{m.m} 006
131.	ÆTHALIUM.	<i>Link. Æ. Septicum.</i>	 0 ^{m.m} 007
303.	AGLAOSPORA.	<i>de Not. A. Profusa.</i>	 0 ^{m.m} 045


PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
187.	ALEURIA.	<i>Fries. A. Vesiculosa.</i>	 0 ^{m.m} .009
467.	ALTERNARIA.	<i>Nees. A. Tenuis</i>	 0 ^{m.m} .027
25.	AMANITA.	<i>Quel. A. Muscaria.</i>	 0 ^{m.m} .009
419.	AMBLIOSPORIUM.	<i>Fres. A. Album.</i>	 0 ^{m.m} .015
398.	AMEROSPORIUM.	<i>Speg. A. Caricinum.</i>	 0 ^{m.m} .013
289.	AMPHISPHERIA.	<i>Ces. A. Umbrina.</i>	 0 ^{m.m} .012
135.	ANGIRIODORUM.	<i>Grev. A. Sinuosum.</i>	 0 ^{m.m} .01
236.	ANIXIA	<i>Fries. A. Perichænoïdes.</i>	 0 ^{m.m} .005
259.	ANTHOSTOMA.	<i>Sacc. A. Gastrina</i>	 0 ^{m.m} .01
258.	ANTHOSTOMELLA.	<i>Sacc. A. Limitata.</i>	 0 ^{m.m} .012
194.	ANTHRACOBIA	<i>Boud. A. Melaloma</i>	 0 ^{m.m} .015
478.	ANTHROMYCES.	<i>Fres. A. Copridis.</i>	 0 ^{m.m} .013
364.	AOSPHÆRIA.	<i>Berk. A. Pineæ.</i>	 0 ^{m.m} .005
132.	ARCYRIA.	<i>Hill. A. Nutans.</i>	 0 ^{m.m} .007
30.	ARMILLARIA.	<i>Q. A. Mellea.</i>	 0 ^{m.m} .007
441.	ARTHRIINIUM.	<i>Kze. A. Caricicolum.</i>	 0 ^{m.m} .009
479.	ARTHROBOTRYUM.	<i>Cès. A. Stilboideum.</i>	 0 ^{m.m} .011
196.	ASCOBOLUS.	<i>Pers. A. Furfuraceus.</i>	 0 ^{m.m} .0
377.	ASCOCHYTA	<i>Lib. A. Philadelphi.</i>	 0 ^{m.m} .01

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
197.	ASCOPHANUS.	<i>Boud. A. Garneus.</i>	 0 ^{m.m} 012
235.	ASCOTRICHIA.	<i>Berk. A. Chartarum.</i>	 0 ^{m.m} 006
198.	ASCOZONUS.	<i>Boud. A. Cunicularis</i>	 0 ^{m.m} 01
419.	ASPERGILLUS.	<i>Mich. A. Glaucus.</i>	 0 ^{m.m} 0028
235.	ASTERINA	<i>Lév. A. Scabiosæ.</i>	 0 ^{m.m} 057
365.	ASTEROMA.	<i>D. C. A. Hyperici.</i>	 0 ^{m.m} 0042
425.	ASTEROPHORA.	<i>Ditm. A. Agaricicola,</i>	 0 ^{m.m} 014
408.	ASTEROSPORIUM.	<i>Kze. A. Hoffmanni</i>	 0 ^{m.m} 026
348.	AULOGRAPHUM.	<i>Lib. A. Juncinum.</i>	 0 ^{m.m} 009
109.	AURICULARIA.	<i>Fries. A. Mesenterica.</i>	 0 ^{m.m} 014
486.	BACTRIDIDIUM.	<i>Kze. B. Flavum.</i>	 0 ^{m.m} 15
135	BADHAMIA.	<i>Berk. B. Pallida</i>	 0 ^{m.m} 009
277.	BERTIA.	<i>De Not. B. Moriformis</i>	 0 ^{m.m} 03
449.	BISPORA.	<i>Cord. B. Monilioides</i>	 0 ^{m.m} 012

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
88.	BOLETUS.	<i>Dill. B. Scaber.</i>	 0 ^{m.m} .012
257.	BOMBARDIA.	<i>Fries. B. Fasciculata.</i>	 0 ^{m.m} .03
377.	BOTRYODIPLODIA.	<i>Sacc. B. Juglandicola.</i>	 0 ^{m.m} .018
268.	BOTRYOSPHÆRIA.	<i>Ces. B. Advena.</i>	 0 ^{m.m} .027
417.	BOTRYOSPORIUM.	<i>Cord. B. Pulchrum.</i>	 0 ^{m.m} .004
422.	BOTRYTIS.	<i>Mich. B. Cinerea.</i>	 0 ^{m.m} .006
459.	BRACHYSPORIUM.	<i>Cord. B. Stemphylioides</i>	 0 ^{m.m} .035
203.	BULGARIA.	<i>Fries. B. Inquinans.</i>	 0 ^{m.m} .01
241.	CÆLOSPHÆRIA.	<i>Sacc. C. Cupularis.</i>	 0 ^{m.m} .01
117.	CALOCERA.	<i>Fries. C. Viscosa.</i>	 0 ^{m.m} .007
339.	CALONECTRIA.	<i>De Not. C. Richoni.</i>	 0 ^{m.m} .028
203.	CALLORIA.	<i>Fries. C. Fusaroides.</i>	 0 ^{m.m} .015
190.	CALOSCYPHA.	<i>Boud. C. Fulgens.</i>	 0 ^{m.m} .006
240.	CALOSPHÆRIA.	<i>Tul. C. Vibratilis.</i>	 0 ^{m.m} .007
202.	CALYCELLA.	<i>Boud. C. Citrina.</i>	 0 ^{m.m} .007
383.	CAMAROSPORIUM.	<i>Schlz. C. Berberidis.</i>	 0 ^{m.m} .009

PAGES GENRES ESPÈCES SPORES ET MESURE

440. CAMPTOUM. *Link.* C. Curvatum.



82. CANTHARELLUS. *Fries.* C. Cibarius.

238. CAPNODIUM. *Mont.* C. Salicinum.




316. CAPRONIA. *Sacc.* C. Juniperi.

135. CARCERINA. *Fries.* C. Spumaroides




448. CATENULARIA. *Grev.* C. Atra.


219. CENANGIUM. *Fckl.* C. Prunastri.




234. CEPHALOTHECA. *Fckl.* C. Sulfurea.



418. CEPHALOSPORIUM. *Cord.* C. Acremonium.



428. CEPHALOTHECIUM. *Cord.* C. Tetrasporum




474. CERATIUM. *Alb. et Schw.* C. Hydroides


312. CERATOSPHÆRIA. *Niessl.* C. Lampadophora



251. CERATOSTOMA. *Ces.* C. Rosæ.



264. CERATOSTOMELLA. *Sacc.* C. Rostrata.


































459. CERCOSPORA. *Fres.* C. Viticola.

















308. CERIOSPORA. *Niessl.* C. Xantha.



179. CHÆTOGLADIUM. *Fres.* C. Jonesii.













PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
251.	CHÆTOMIUM.	<i>Kze. C. Chartarum.</i>	 0 ^{m.m} 006
Sup ¹ .	CHÆTOPHOMA.	<i>Cooke. C. Antirrhini.</i>	 0 ^{m.m} 004
446.	CHÆTOPSIS	<i>Grev. C. Grisea.</i>	 0 ^{m.m} 006
301.	CHÆTOSPHÆRIA.	<i>Tul. C. Callimorpha.</i>	 0 ^{m.m} 014
	CHÆTOSTROMA.	<i>Cord. C. Atrum.</i>	 0 ^{m.m} 009
448.	CHALARA.	<i>Cord. C. Strobilina.</i>	 0 ^{m.m} 004
193.	CHEILYMENIA.	<i>Boud. C. Stercorea.</i>	 0 ^{m.m} 018
206.	CHLOROSPLENIUM.	<i>Fr. C. Æruginosum.</i>	 0 ^{m.m} 012
411.	CHROMOSPORIUM.	<i>Cord. C. Roseum.</i>	 0 ^{m.m} 004-6
205.	CIBORIA.	<i>Fck¹ C. Amentacea.</i>	 0 ^{m.m} 006
366.	CICINNOBOLUS	<i>Ehr C. Cesatii</i>	 0 ^{m.m} 006
193.	CILIARIA.	<i>Quél. C. Scutellata.</i>	 0 ^{m.m} 018
471.	CILICIOPODIUM.	<i>Cord. C. Sanguineum.</i>	 0 ^{m.m} 0042
445.	CIRCINOTRICHUM.	<i>Nees. C. Maculiforme.</i>	 0 ^{m.m} 011
451.	CLADOSPORIUM.	<i>Link. C. Herbarum.</i>	 0 ^{m.m} 010-1
453.	CLADOTRICHUM.	<i>Cord C. Scyphophorum.</i>	 0 ^{m.m} 015
454.	CLASTEROSPORIUM.	<i>Schw C. Fasciculare</i>	 0 ^{m.m} 036

















PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
51.	CLAUDOPUS.	<i>Quél. C. Variabilis.</i>	 0 ^{m.mv} 006
114.	CLAVARIA.	<i>Linn. C. Botrytis.</i>	 0 ^{m.mv} 01
342.	CLAVICEPS.	<i>Tul. C. Purpurea</i>	 0 ^{m.mv} 21
34.	CLITOCYBE.	<i>Q. C. Suaveolens</i>	 0 ^{m.mv} 006
49.	CLITOPILUS.	<i>Q. C. Orcella.</i>	 0 ^{m.mv} 008
301.	CLYPEOSPHÆRIA.	<i>Fck^l. C. Notarisii.</i>	 0 ^{m.m} 018
417.	CEMANSIELLA.	<i>Sacc. C. Alabastrina.</i>	 0 ^{m.mv} 01
144.	COLEOSPORIUM.	<i>Lév. C. Miniatum</i>	 0 ^{m.m} 018
37.	COLLYBIA.	<i>Quél. C. Velutipes.</i>	 0 ^{m.m} 006
351.	COLPOMA.	<i>Wallr. C. Quercinum</i>	 0 ^{m.m} 1
434.	CONIOSPORIUM.	<i>Sacc. C. Rhizophilum.</i>	 0 ^{m.m} 007
463.	CONIOTHECIUM.	<i>Cord. C. Amentacearum.</i>	 0 ^{m.m} 007
371.	CONIOTHYRIUM.	<i>Cord. C. Fuckelü.</i>	 0 ^{m.m} 003
67.	COPRINUS.	<i>Pers. C. Lagopus.</i>	 0 ^{m.m} 009

PAGES	GENRES	ESPÈCES*	SPORES ET MESURE
195.	COPROBIA.	<i>Boud. C. Granulata</i>	 0 ^{m.m} .016
255.	COPROLEPA.	<i>Fries. C. Merdaria.</i>	 0 ^{m.m} .022
342.	CORDICEPS.	<i>Link. C. Ophioglossoides.</i>	 0 ^{m.m} .16
472.	COREMIUM.	<i>Link. C. Glaucum.</i>	 0 ^{m.m} .003
391.	CORNULARIA.	<i>Karsten. C. Boudieri</i>	
109.	CORTICIUM.	<i>Fries. C. Quercinum.</i>	 0 ^{m.m} .009
39.	CORTINARIUS.	<i>Fries. C. Violaceo-Cinereus.</i>	 0 ^{m.m} .01
240.	CORONOPHORA.	<i>Fckl. C. Annexa.</i>	 0 ^{m.m} .015
202.	CORYNE.	<i>Tul. C. Sarcoides.</i>	 0 ^{m.m} .018
303.	CORYNELIA.	<i>Boud. C. Atro-Virens.</i>	 0 ^{m.m} .006
406.	CORYNEUM.	<i>Nees. C. Notarisianum</i>	 0 ^{m.m} .045
107.	CRATERELLUS.	<i>Fries. C. Cornucopioides.</i>	 0 ^{m.m} .006
138.	CRATERIUM.	<i>Fries. C. Leucophalum.</i>	 0 ^{m.m} .007
61.	CREPIDOTUS.	<i>Q. C. Mollis.</i>	 0 ^{m.m} .006
133.	CRIBARIA.	<i>Schr. C. Vulgaris.</i>	 0 ^{m.m} .006
171.	CRONARTIUM.	<i>Tul. C. Pæoniae.</i>	 0 ^{m.m} .015 0 ^{m.m} .011




S.P.

GES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
47.	CRYPTOSPHERIA.	<i>Grev.</i> C. Populina.	 0 ^{m.m.} 009
28.	CRYPTOSPORA.	<i>Tul.</i> C. Suffusa.	 0 ^{m.m.} 042
39.	CRYPTOSPORELLA.	<i>Sacc.</i> C. Hypoderma.	 0 ^{m.m.} 033
3.	CRYPTOSPORIUM.	<i>Cord.</i> C. Neesii.	 0 ^{m.m.} 036
32.	CRYPTOSTICTIS.	<i>Fckl.</i> C. Cynosbati.	 0 ^{m.m.} 01
8.	CRYPTOVALSA.	<i>Ces.</i> C. Pruni.	 0 ^{m.m.} 007
7.	CUCURBITARIA.	<i>Gray's.</i> C. Elongata	 0 ^{m.m.} 018
9.	CYATHICULA.	<i>De Not.</i> C. Coronata.	 0 ^{m.m.} 015
4.	CYATHUS.	<i>Hall.</i> C. Striatus.	 0 ^{m.m.} 017
4.	CYLINDRIUM.	<i>Bon.</i> C. Flavo.Virens.	 0 ^{m.m.} 018
4.	CYLINDROCELLA.	<i>Bon.</i> C. Dubia.	 0 ^{m.m.} 033
3.	CYLINDROSPORIUM.	<i>Unger.</i> C. Ranunculi.	 0 ^{m.m.} 05

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
420.	CYLINDROTRICHUM.	Bon. Oligospermum.	 0 ^m .03
125.	CYNOPHALLUS.	Fries. C. Caninus.	 0 ^m .0028
111.	CYPHELLA.	Fries. C. Muscigena.	 0 ^m .007
175.	CYSTOPUS.	De By. C. Candidus.	 0 ^m .015
369.	CYTOSPORA.	Ehr. C. Leucosperma.	 0 ^m .0058
Sup ¹ .	CYTOSPORELLA.	Sacc. C. Conspersa.	 0 ^m .003
391.	CYTOSPORINA.	Sacc. C. Heteracantha.	 0 ^m .045
Sup ¹ .	CYSTOTRICHIA.	B. et Br. C. Striola.	 0 ^m .007
122.	DACRYMYCES.	Nees. D. Fragiformis.	 0 ^m .014
100.	DEDALÆA.	Fries. D. Unicolor.	 0 ^m .007
430.	DACTYLIUM.	Nees. D. Dendroides.	 0 ^m .02
264.	DALDINIA.	De Not. D. Concentrica.	 0 ^m .012
378.	DARLUCA.	Cast. D. Vagans.	 0 ^m .011
209.	DASYSCYPHA.	Boud. D. Palearum.	 0 ^m .01
290.	DELITSCHIA.	Auersw. D. Auerswaldii.	 0 ^m .042
244.	DEMATIUM.	Pers. D. Hispidulum.	 0 ^m .009
481.	DENDRODOCHIUM.	Bon. D. Citrinum	 0 ^m .002

PAGES	GENRES	ESPÈCES
364.	DENDROPHOMA.	<i>Sacc.</i> D. Pruinosa.
461.	DENDRYPHIUM.	<i>Wallr.</i> D. Atrum.
Supl.	DEPAZEA.	<i>Fries.</i> D. Tremulæcola.
218.	DERMATEA.	<i>Fries.</i> D. Furfuracea.
280.	DIAPORTHE.	<i>Nits.</i> D. Quercina.
248.	DIATRYPE.	<i>Fries.</i> D. Acericola.
249.	DIATRYPELLA.	<i>Ces.</i> D. Minuta.
349.	DICHÆNA.	<i>Fries.</i> D. Strobilina
384.	DICHOMERA.	<i>Cooke.</i> D. Tiliæ.
449.	DICOCCUM.	<i>Cord.</i> D. Uniseptatum
133.	DICTYDIUM.	<i>Schr.</i> D. Umbilicatum.
464.	DICTYOSPORIUM.	<i>Cord.</i> D. Elegans.
136.	DIDERMA.	<i>Pers.</i> D. Globosum.
429.	DIDYMOPSIS.	<i>Sacc.</i> D. Spicata.
274.	DIDYMELLA.	<i>Sacc.</i> D. Bryoniæ.
137.	DIDYMIUM.	<i>Schrad.</i> D. Hemisphæricum.
288.	DIDYMOSPILÆRIA.	<i>Sacc.</i> D. Acerina.

SPORES ET MESURE




PAGES

GENRES

ESPÈCES

SPORES ET MESURE


405. DIDYMOSPORIUM. *Sacc.* D. Carpini.



327. DILOPHIA. *Sacc.*

391. DILOPHOSPORA. *Desm.* D. Graminis.


405. DINEMASPORIUM. *Sacc.* D. Graminis.



238. DIMEROSPORIUM. *Sacc.*

427. DIPLOCLADIUM. *Bon.* D. Minus.

453. DIPLOCOCCIUM. *Grev.* D. Pulchrum.



372. DIPLODIA. *Fries.* D. Populina.

377. DIPLODIELLA. *Karst.* D. Fibricola.

379. DIPLODINA. *West.* D. Salicis.

398. DISCELLA. *Sacc.* D. Carbonacea.


186. DISCIOTIS. *Boud.* D. Venosa.
















396. DISCOSIA. *Lib.* D. Artocreas.


















267. DITOPELLA. *De Not.* (Voir Cryptospora Suffusa. p. 328).



















398. DOTHICHIZA. *Lib.* D. Populea.

















344. DOTHIDEA. *Sacc.* D. Puccinioides.
































PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
367.	DOTHIORELLA.	Sacc. D. Advena.	 0 ^{m.m} .035
{ 126. 472.	ECCHYNA.	Fries. E. Faginea.	 0 ^{m.m} .0042
438.	ECHYNOBOTRYUM.	Cord. E. Parasitans.	 0 ^{m.m} .01
51.	ECCILIA.	Quél. E. Polita.	 0 ^{m.m} .007
226.	ELAPHOMYCES.	Tul. E. Aculeatus.	 0 ^{m.m} .02
331.	ELEUTHEROMYCES.	Fuck. (Voir Sphæronema Subulatum Suppl.)	
239.	ENCHNOA.	Fries. E. Friesii.	 0 ^{m.m} .012
311.	ENCHNOSPHERIA.	Fuck ¹ . E. Pinetorum.	 0 ^{m.m} .027 0 ^{m.m} .022
144.	ENDOPHYLLUM.	Lév. E. Persoonii.	
49.	ENTOLOMA.	Quél. E. Rhodopolium.	 0 ^{m.m} .007
506.	ENTOMOSPORIUM.	Lév. E. Mespili.	 0 ^{m.m} .015
342.	EPICHLOE.	Tul. E. Typhina.	 0 ^{m.m} .1
489.	EPICOCCUM.	Link. E. Neglectum.	 0 ^{m.m} .014
121.	EPIDOCCHIUM.	Fries. E. Atro-Virens.	 0 ^{m.m} .05
499.	ERINEUM.	Pers. E. Alneum.	
278.	ERIOSPHERIA.	Sacc. E. Alligata.	 0 ^{m.m} .0056
231.	ERYSIPHE.	Lév. E. Umbelliferarum.	 0 ^{m.m} .015

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
233.	EUROTIIUM.	<i>Link.</i> E. Epixylon.	 0 ^{m.m} 004
245.	EUTYPA.	<i>Tul.</i> E. Aspera.	 0 ^{m.m} 009
245.	EUTYPELLA.	<i>Nits.</i> E. Prunastri.	 0 ^{m.m} 006
123.	EXIDIA	<i>Fries.</i> E. Recisa.	 0 ^{m.m} 018
180.	EXOASCUS.	<i>De By.</i> E. Alni.	 0 ^{m.m} 006
492.	EXOSPORIUM.	<i>Link.</i> E. Tiliæ.	 0 ^{m.m} 06
321.	FENESTELLA.	<i>Tul.</i> F. Princeps.	 0 ^{m.m} 04
93.	FISTULINA.	<i>Bull.</i> F. Hepatica.	 0 ^{m.m} 008
57.	FLAMMULA.	<i>Quél.</i> F. Conissans.	 0 ^{m.m} 006
447.	FUCKELINA.	<i>Sacc.</i> F. Microspora.	 0 ^{m.m} 009
468.	FUMAGO.	<i>Pers.</i> F. Vagans.	 0 ^{m.m} 005
487.	FUSARIUM.	<i>Link.</i> F. Roseum.	 0 ^{m.m} 025
450.	FUSICLADIUM.	<i>Bon.</i> F. Pirinum.	 0 ^{m.m} 018
363.	FUSICOCCUM.	<i>Cord.</i> F. Kunzeanum.	 0 ^{m.m} 012
482.	FUSICOLIA.	<i>Bon.</i> F. Phragmitis.	 0 ^{m.m} 003
414.	FUSIDIUM.	<i>Link.</i> F. Parasiticum.	 0 ^{m.m} 02
188.	GALACTINIA.	<i>Cooke.</i> G. Succosa.	 0 ^{m.m} 015

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
60.	GALERA.	<i>Quél. G. Tener.</i>	 0 ^{m.m} 011
128.	GEASTER.	<i>Mich. G. Hygrometricus.</i>	 0 ^{m.m} 0014
199.	GEOGLOSSUM.	<i>Pers G. Glabrum.</i>	 0 ^{m.m} 05
339.	GIEBERELLA.	<i>Sacc. G. Acervalis.</i>	 0 ^{m.m} 014
401.	GLÆOSPORIUM.	<i>Desm. G. Phaseoli.</i>	 0 ^{m.m} 014
127.	GLOBARIA.	<i>Pers. G. Gigantea.</i>	 0 ^{m.m} 0042
349.	GLONTOPSIS.	<i>De Not. G. Biformis.</i>	 0 ^{m.m} 015
348.	GLONIUM.	<i>Mich. G. Pygmæum.</i>	 0 ^{m.m} 009
275.	GNOMONIA.	<i>Ces. G. Ischnostyla.</i>	 0 ^{m.m} 012
264.	GNOMONIELLA.	<i>Sacc. G. Tubiformis.</i>	 0 ^{m.m} 007
352.	GODRONIA.	<i>Ch. K. G. Mühlenbeckii.</i>	 0 ^{m.m} 04
397.	GODRONIELLA.	<i>Karst G. Juncina</i>	 0 ^{m.m} 09
73.	GOMPHIDIUS.	<i>Fries. G. Viscidus.</i>	 0 ^{m.m} 02
426	GONATOBOTRYS	<i>Cord. G. Flava.</i>	 0 ^{m.m} 01
441.	GONIOSPORIUM.	<i>Link G. Puccinioides.</i>	 0 ^{m.m} 009
447	GONYTRICHUM.	<i>Nees. G. Cæsium</i>	 0 ^{m.m} 0028
106.	GRANDINIA.	<i>Fries. G. Crustosa</i>	 0 ^{m.m} 0028
171.	GRAPHIOLA.	<i>Poit. G Phœnicis.</i>	 0 ^{m.m} 003

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
477.	GRAPHIUM.	<i>Cord.</i> G. Rigidum.	 0 ^m . 0042
488.	GYROCERAS.	<i>Cord.</i> G. Plantaginis.	 0 ^m . 0042
184	GYROMITRA.	G. Esculenta.	 0 ^m . 015
224.	{ HABROSTICTIS. <i>Fuck.</i> OCELLARIA. <i>Tul.</i>	{ Aurea.	 0 ^m . 025
443.	HADOTRICHUM.	<i>Fuckl.</i> H. Phragmitis.	 0 ^m . 005-9
400.	HAINESIA.	<i>Ell.</i> H. Rubi.	 0 ^m . 007
420.	HAPLARIA.	<i>Link.</i> H. Grisea.	 0 ^m . 004
444.	HAPLOGRAPHIUM.	<i>Br.</i> H. Toruloides.	 0 ^m . 005
417.	HAPLOTTRICHUM.	<i>Link.</i> H. Capitatum.	 0 ^m . 014
477.	HARPOGRAPHIUM.	<i>Sacc.</i> H. Fasciculatum.	 0 ^m . 008
56.	HEBELOMA.	<i>Quél.</i> H. Crustuliniformis.	 0 ^m . 008
469.	HELICOSPORIUM.	<i>Nees.</i> H. Mulleri.	 0 ^m . 045
433.	HELICOMYCES.	<i>Link.</i> H. Roseus.	 0 ^m . 02
457.	HELMINTHOSPORIUM.	<i>Link.</i> Appendiculatum.	 0 ^m . 011
252.	HELMINTHOSPHÆRIA.	<i>Fuck.</i> H. Clavariarum.	 0 ^m . 011
207.	HELOTIUM.	<i>Fries.</i> H. Alniellum.	 0 ^m . 007

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
185.	HELVELLA.	<i>Linn.</i> H. Crispa.	 0 ^m . 015 0 ^m . 01
379.	HENDERZONIA.	<i>Berk.</i> H. Syringæ.	
397.	HETEROPATELLA.	<i>Fuck.</i> H. Lacera	 0 ^m . 036
217.	HETEROSPHÆRIA.	<i>Grev.</i> H. Patella.	 0 ^m . 014
280.	HERCOSPORA.	<i>Tul.</i> H. Tiliæ.	 0 ^m . 012
460.	HETEROSPORIUM.	<i>Klots.</i> H. Ornithogali.	 0 ^m . 04
200.	HEYDERIA.	<i>Fries.</i> H. Cucullata.	 0 ^m . 01
497.	HYMANTIA.	<i>Pers.</i> Mycelium stérile.	
103.	HYDNUM.	<i>Linn.</i> H. Erinaceum.	 0 ^m . 007
74.	HYGROPHORUS.	<i>Fries.</i> H. Virgineus	 0 ^m . 007
123.	HIRNEOLA.	<i>Fries.</i> H. Auricula-Judæ.	 0 ^m . 015
430.	HORMIACTIS.	<i>Preuss.</i> H. Alba	
436.	HORMISCIMUM.	<i>Kunz.</i> H. Vermiculare.	 0 ^m . 007
444.	HORMODENDRON.	<i>Bon.</i> H. Olivaceum.	 0 ^m . 004
194.	HUMARIA.	<i>Fries.</i> H. Leucoloma.	 0 ^m . 014
205.	HYALINA.	<i>Boud.</i> H. Crystallina.	 0 ^m . 008

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
213.	HYALOSCYPHA.	<i>Boud. H. Dentata.</i>	
129.	HYMENOGASTER.	<i>Witt. H. Leptoniæsporus.</i>	 0 ^{m.m} .0084
490.	HYMENOPSIS.	<i>Sacc. G. Ellipsospora.</i>	 0 ^{m.m} .006
483.	HYMENULA.	<i>Fries. G. Rubella.</i>	 0 ^{m.m} .006
497.	HYPHA.	<i>Rabh. H. Gigantea. Mycelium stérile.</i>	
63.	HYPHOLOMA.	<i>Quél. H. Fascicularis.</i>	 0 ^{m.m} .005
111.	HYPOCHNUS.	<i>Fries. H. Ferrugineus.</i>	 0 ^{m.m} .006
254.	HYPOCOPRA.	<i>Fuck. H. Maxima.</i>	 0 ^{m.m} .03
338.	HYPOCREA.	<i>Fries. H. Gelatinosa.</i>	 0 ^{m.m} .009
350.	HYPODERMA	<i>D.C. H. Virgultorum.</i>	 0 ^{m.m} .02
333.	HYPOMYCES.	<i>Tul. H. Lateritius.</i>	 0 ^{m.m} .02
309.	HYPOSPILA.	<i>Fries. H. Pustula.</i>	 0 ^{m.m} .015
262.	HYPOXYLON.	<i>Bull. H. Coccineum</i>	 0 ^{m.m} .007
349.	HYSTERIUM.	<i>Tode. H. Angustatum.</i>	 0 ^{m.m} .016
349.	HYSTEROGRAPHIUM.	<i>Cord. H. Fraxini.</i>	 0 ^{m.m} .033
481	ILLOSPORIUM.	<i>Mart I. Coccineum.</i>	 0 ^{m.m} .025

PAGES GENRES ESPÈCES SPORES ET MESURE.

55. INOCYBE. *Quél.* I. Dulcamara.

106. IRPEX. *Fries.* I. Fusco-Violaceus.

473. ISARIA. *Pers.* I. Farinosa.

Sup^l. KALMUSIA. *Niessl.* K, Hypotephra.

192. LACHNEA. *Fries.* L. Mollissima.

211. LACHNELLA. *Fries.* L. Prasina.

76. LACTARIUS. *Fries.* L. Volemus.

265. LÆSTADIA. *Auersw.* L. Carpineae.

195. LAMPROSPORA. *De Not.* L. Wrightii.

197. LASIOBOLUS. *Boud.* L. Pilosus.

309. LASIOSPHÆRIA. *Ces.* L. Crinita.

217. LECANIDIUM. *Rabh.* L. Atrum.

83. LENTINUS. *Fries.* L. Tigrinus.

277. LENTOMITA. *Niessl.* L. Auerswaldii.




87. LENZITES. *Fries.* L.


















137. LEOCARPUS. *Pers.* L. Vernicosus.

201. LEOTIA. *Bull.* L. Lubrica.

28. LEPIOTA. *Quél.* L. Procera.

50. LEPTONIA. *Quél.* L. Euchlorus.



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
185.	LEPTOPODIA.	<i>Boud. L. Elastica.</i>	
200.	LEPTOGLOSSUM.	<i>Cooke. L. Olivaceum.</i>	
295.	LEPTOSPHERIA.	<i>Ces. L. Culmifraga.</i>	
300.	LEPTOSPHERITES.	<i>Ch. R. L. Lemoinii</i>	
394.	LEPTOSTROMA.	<i>Fries. L. Scirpinum.</i>	
397.	LEPTOSTROMELLA.	<i>Sacc. L. Junci</i>	
393.	LEPTOTHYRIUM.	<i>Kunz. L. Protuberans.</i>	
338.	LETENDRÆA.	<i>Sacc. L. Eurotioides.</i>	
191	LEUCOSCYPHA.	<i>Boud. L. Leucotricha</i>	
403.	LIBERTELLA.	<i>Desm. L. Faginea.</i>	
336.	LINOSPORA.	<i>Fuck. L. Caprea.</i>	
347.	LOPHIDIUM.	<i>Sacc. L. Compressum.</i>	
348.	LOPHIOSPHERA.	<i>Trev. L. Fuckelii.</i>	
347.	LOPHIOSTOMA.	<i>Ces. L. Quadrinucleatum</i>	
346.	LOPHIOTREMA.	<i>Sacc. L. Crenatum.</i>	
346.	LOPHIOTRICHIA.	<i>Ch. R. L. Viburni.</i>	
351.	LOPHIUM.	<i>Fries. L. Mytilinellum.</i>	

PAGES GENRES ESPÈCES SPORES ET MESURE.

350. LOPHODERMIIUM. *Chev.* L. Arundinaceum

0^{m.m.} 044

130. LYCOGALA. *Mich.* L. Epidendron.

187. MACROPODIA. *Fuck.* M. Macropus.

465. MACROSPORIUM. *Fries.* M. Legenariæ.

83. MARASMIUS. *Fries.* M. Urens.

405. MARSONIA. *Fisch.* M. Potentillæ.

293. MASSARIA. *De Not.* M. Pupula

306. MASSARINA. *Sacc.* M. Eburnea.

343. MAZZANTIA. *Mont.* M. Galii

145. MELAMPSORA. *Tul.* M. Lini.

291. MELANCONIELLA. *Sacc.* M. Spodiæa.


279. MELANCONIS. *Tul.* M. Alni.



404. MELANCONIUM. *Link.* M. Ramulorum.

302. MELANOMMA. *Nits.* M. Vile.

276. MELANOPSAMMA. *Niessl.* M. Pomiformis.

331. MELANOSPORA. *Cord.* M. Vervecina.



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
402.	MELANOSTROMA.	<i>Cord.</i> M. Minutum.	
394.	MELASMIA.	<i>Lév.</i> M. Acerina.	
194.	MELASTIZA.	<i>Boud.</i> M. Miniata.	
305.	MELOGRAMMA.	<i>Tul.</i> M. Vagans.	
311.	MELOMASTIA.	<i>Nils.</i> M. Friesii.	
446.	MENISPORA.	<i>Pers.</i> M. Ciliata.	
101.	MERULIUS.	<i>Fries.</i> M. Lacrymans.	
306.	METASPHÆRIA.	<i>Sacc.</i> M. Sæpincola.	
200.	MICROGLOSSUM.	<i>Sacc.</i> M. Viride.	
392.	MICROPERA.	<i>Lév.</i> M. Drupacearum.	
230.	MICROSPHÆRA.	<i>Lév.</i> M. Grossulariæ.	
412.	MICROSTROMA.	<i>Niessl.</i> M. Album.	
345.	MICROTHYRIUM.	<i>Desm.</i> M. Visci. Ch.	
184.	MITROPHORA.	<i>Lév.</i> M. Semilibera.	
215.	MOLLISIA.	<i>Fries.</i> M. Cinerea.	
414.	MONILIA.	<i>Pers.</i> M. Fructigena.	
442.	MONOTOSPORA.	<i>Cord.</i> M. Sphærocephala	
183.	MORCHELLA.	<i>Dill.</i> M. Esculenta.	
179.	MORTIERELLA.	<i>Coem.</i> M. Polycephala.	

PAGES GENRES ESPÈCES SPORES ET MESURE.

175. MUCOR. *De By.* M. Mucedo.

40. MYCENA. *Quél.* M. Galericulata.

364. MYCOGALA. *Rost.* M. Parietinum.

429. MYCOGONE. *Ditm.* M. Rosea.

491. MYROTHECIUM. *Tode.* M. Cinctum.

466. MYSTROSPORIUM. *Cord.* M. Stemphylium.

402. MYXOSPORIUM. *Link.* M. Deplanatum.

446. MYXOTRICHUM. *Knnz.* M. Chartarum.

58. NAUCORIA. *Quél.* N. Melinoides.

334. NECTRIA. *Fries.* N. Sinopica.

330. NECTRIELLA. *Sacc.* N. Rousseliana.

404. NÆMASPORA. *Pers.* N. Microspora.


50. NOLANEA. *Quél.* N. Pascua.


















499. NOSOPHLÆA. *Fries.* N. Alnea. altération du tissu cellulaire.


















83. NYCTALIS. *Fries.* N. Asterophora.












224. OCELLARIA. *Tul.* O. Aurea. (Voir Habrostictis.)

416. ŒDOCEPHALUM. *Preuss.* Œ. Agaricinum.



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
415.	OIDIUM.	<i>Link.</i> O. <i>Tuckeri.</i>	 0 ^{m.m.} 0
202.	OMBROPHILA.	<i>Fries.</i> O. <i>Purpurascens.</i>	 0 ^{m.m.} 008
181.	ONIGENA.	<i>Pers.</i> O. <i>Corvina.</i>	 0 ^{m.m.} 005
43.	OMPHALIA.	<i>Quél.</i> O. <i>Fibula.</i>	 0 ^{m.m.} 0042
227.	OOGASTER.	<i>Cord.</i> O. <i>Cibarium.</i>	 0 ^{m.m.} 024
341.	OOMYCES.	<i>B. et Br.</i> O. <i>Carneo-Albus</i>	 0 ^{m.m.} 15 0 ^{m.m.} 004
412.	OOSPORA.	<i>Wallr.</i> O. <i>Epimyces.</i>	 0 ^{m.m.} 012
322.	OPHIOBOLUS.	<i>Riess.</i> O. <i>Hyperici.</i>	 0 ^{m.m.} 07
327.	OPHIOCERAS.	<i>Sacc.</i> O. <i>Corni. Ch. R.</i>	 0 ^{m.m.} 045
204.	ORBILIA.	<i>Fries.</i> O. <i>Rozei.</i>	 0 ^{m.m.} 042
351.	OSTROPA.	<i>Fries.</i> O. <i>Cinerea.</i>	 0 ^{m.m.} 16
181.	OTIDEA.	<i>Fuck.</i> O. <i>Onotica.</i>	 0 ^{m.m.} 012
291.	OTTHIA.	<i>Nits.</i> O. <i>Brunaudiana.</i>	 0 ^{m.m.} 02
432.	OVULARIA.	<i>Sacc.</i> O. <i>Lamii.</i>	 0 ^{m.m.} 025
498.	OZONIUM.	<i>Link.</i> O. <i>Aurantiacum.</i> Mycelium de Coprin.	
66.	PANÆOLUS.	<i>Quél.</i> P. <i>Papillonaceus.</i>	 0 ^{m.m.} 009
86.	PANUS.	<i>Fries.</i> P. <i>Rudis.</i>	 0 ^{m.m.} 006
449.	PASSALORA.	<i>Mont.</i> P. <i>Baccilligera.</i>	 0 ^{m.m.} 028

AGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
73.	PAXILLUS.	<i>Fries. P. Atro-Tomentosus.</i>	 0 ^{m.m.} 0042
149.	PENICILLIUM.	<i>Link. P. Glaucum.</i>	 0 ^{m.m.} 004
183.	PERICHÆNA.	<i>Fries. P. Populina.</i>	 0 ^{m.m.} 01
439.	PERICONIA.	<i>Bon. P. Atra.</i>	 0 ^{m.m.} 012
143.	PERIDERMIIUM.	<i>Tul. P. Pini.</i>	 0 ^{m.m.} 025
485.	PERIOLA.	<i>Fries. P. Tomentosa.</i>	 0 ^{m.m.} 009
237.	PERISPORIUM.	<i>Fries. P. Fimeti.</i>	 0 ^{m.m.} 024
173.	PERONOSPORA.	<i>De By. P. Viticola.</i>	 0 ^{m.m.} 015
408.	PESTALOZZIA.	<i>De Not. P. Funerea.</i>	 0 ^{m.m.} 022
219.	PEZICULA.	<i>Fuck. P. Cratægi.</i>	 0 ^{m.m.} 014
223.	PHACIDIUM.	<i>Fries. P. Repandum.</i>	 0 ^{m.m.} 009
125.	PHALLUS.	<i>Linn. P. Impudicus.</i>	 0 ^{m.m.} 0028
206.	PHIALEA.	<i>Fries. P. Firma.</i>	 0 ^{m.m.} 012
189.	PHLÆOSPORA.	<i>Wallr. P. Ulmi.</i>	 0 ^{m.m.} 05
103.	PHLEBIA.	<i>Fries. P. Radiata.</i>	 0 ^{m.m.} 006
51.	PHOLIOTA.	<i>Quéf. P. Cylindracea</i>	 0 ^{m.m.} 0084
157.	PHOMA.	<i>Fries. P. Herbarum.</i>	 0 ^{m.m.} 006

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
266.	PHOMATOSPORA.	<i>Sacc. P. Molluginis</i>	 0 ^{m.m.} 007
146.	PHRAGMIDIUM.	<i>Tul. P. Incrassatum.</i>	 0 ^{m.m.} 065
411.	PHRAGMOTRICHUM.	<i>Kze. P. Chaillatii.</i>	 0 ^{m.m.} 08
343.	PHYLLACHORA.	<i>Nits. P. Graminis.</i>	 0 ^{m.m.} 009
230.	PHYLLACTINIA.	<i>Lév. P. Suffulta.</i>	 0 ^{m.m.} 04
499.	PHYLLERIUM.	<i>Fries. P. Juglandinum. (Pseudo-mycète).</i>	
353.	PHYLLOSTICTA.	<i>Pers. P. Syringæ.</i>	 0 ^{m.m.} 0058 0 ^{m.m.} 08
256.	PHYLOCOPRA.	<i>Speg. P. Setosa.</i>	 0 ^{m.m.} 011 0 ^{m.m.} 011
266.	PHYSALOSPORA.	<i>Niessl. P. Gregaria.</i>	 0 ^{m.m.} 011 0 ^{m.m.} 011
138.	PHYSARUM.	<i>Pers. P. Columbinum.</i>	 0 ^{m.m.} 0042 0 ^{m.m.} 02
172.	PHYSODERMA.	<i>Wallr. P. Maculare.</i>	 0 ^{m.m.} 007
201.	PILACRE.	<i>Fries. P. Friesii.</i>	
399.	PILIDIUM.	<i>Kunz. P. Fuliginosum.</i>	
176.	PILOBOLUS.	<i>Coem. P. Crystallinus.</i>	

PAGES GENRES ESPÈCES SPORES ET MESURE

489. PIONNOTES. *Fries*. P. Betæ.




395. PIROSTOMA. *Fries*. P. Circinans.



119. PISTILLARIA. *Fries*. P. Micans.



312. PLEOMASSARIA. *Speg*. P. Siparia.



340. PLEONECTRIA. *Sacc*. P. Lamii.



368. PLACOSPHÆRIA. *Sacc*. P. Onobrychidis.




317. PLEOSPHÆRIA. *Speg*. P. Pilosella.




312. PLEOSPORA. *Rab*. P. Herbarum.




400. PLEOSPOROPSIS. *Ærst*. P. Strobilina.




44. PLEUROTUS. *Quél*. P. Ostreatus.



344. PLOWRIGHTIA. *Sacc*. P. Ribesia.



47. PLUTEUS. *Quél*. P. Cervinus.




170. PODISOMA. *Æst*. P. Juniperi.




229. PODOSPHÆRA. *Kunz*. P. Tridactyla.



93. POLYPORUS. *Fries*. P. Brumalis.



331. POLYSTIGMA. *Fuck*. P. Rubrum.
















392. POLYSTIGMINA. *Sacc*. P. Rubra.




457. POLYTHRINCUM. *Kunze*. P. Trifolii.


































PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
262.	PORONIA.	<i>Wild. P. Punctata.</i>	 0 ^{m.m.} 008
224.	PROPOLIS.	<i>Fries. P. Versicolor.</i>	 0 ^{m.m.} 02
282.	PROSTHEMIUM.	<i>Kunz. P. Betulinum.</i>	 0 ^{m.m.} 06 0 ^{m.m.} 05
61.	PSALLIOTA.	<i>Quél. P. Campestris.</i>	 0 ^{m.m.} 007
65.	PSATHYRA.	<i>Quél. P. Corrugis.</i>	 0 ^{m.m.} 012
67.	PSATHYRELLA.	<i>Quél. P. Gracilis.</i>	 0 ^{m.m.} 012
216.	PSEUDO-PEZIZA.	<i>Fuck. P. Trifolii.</i>	 0 ^{m.m.} 01
191.	PSEUDO-PLECTANIA.	<i>Fuck. P. Nigella.</i>	 0 ^{m.m.} 009
303.	PSEUDO-VALSA.	<i>Ces. P. Berkeleyi.</i>	 0 ^{m.m.} 037
65.	PSILOCYBE.	<i>Quél. P. Spadicea.</i>	 0 ^{m.m.} 007
125.	PTYCHOGASTER.	<i>Cord. P. Albus.</i>	 0 ^{m.m.} 0042
148.	PUCCINIA.	<i>De By. P. Graminis.</i>	 0 ^{m.m.} 1
190.	PUSTULARIA.	<i>Fuck. P. Cupularis.</i>	 0 ^{m.m.} 02










PAGES	GENRES	ESPÈCES
369.	PYRENOCHÆTA.	<i>Sacc.</i> P. Berberidis.
215.	PYRENOPEZIZA.	<i>Fuck.</i> P. Eryngii.
315.	PYRENOPHORA.	<i>Fries.</i> P. Relicina.
196.	PYRONEMA.	<i>Carus.</i> P. Marianum.
242.	QUATERNARIA.	<i>Tul.</i> Q. Personii.
Sup ¹ .	QUELETIA.	<i>Quél.</i> Q. Mirabilis.
430.	RAMULARIA.	<i>Ung.</i> R. Ulmaria.
368.	RABENHORTZIA.	<i>Fries.</i> R. Tiliæ.
130.	RETICULARIA.	<i>Bull.</i> R. Umbrina.
390.	RHABDOSPORA.	<i>Mont.</i> R. Helleborina.
317.	RHAMPHORIA.	<i>Niessl.</i> R. Buxi.
421.	RHINOTRICHUM.	<i>Cord.</i> R. Simplex.
186.	RHIZINA.	<i>Fries.</i> R. Undulata.
495.	RHIZOCTONIA.	<i>D. C.</i> R. Medicaginis. Pycnides stériles.
496.	RHIZOMORPHA.	<i>Roth.</i> R. Adna. Sp. ?
191.	RHIZOPODELLA.	<i>Cooke.</i> R. Melastoma.

SPORES ET MESURE



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
129.	RHIZOPOGON.	<i>Fries. R. Luteolus</i>	 0 ^{mm} . 009
178.	RHIZOPUS.	<i>Ehr. R. Nigricans.</i>	 0 ^{mm} . 01
416.	RHOPALOMYCES.	<i>B. et Br. R. Candidus</i>	 0 ^{mm} . 006
345.	ROPOGRAPHUS.	<i>Fuck. R. Filicinus.</i>	 0 ^{mm} . 018
221.	RHYTISMA.	<i>Fries. R. Salicinum.</i>	 0 ^{mm} . 06
236.	RICHONIA.	<i>Boud. R. Variospora.</i>	 0 ^{mm} . 024
190.	RIPAROBIVS.	<i>Boud. R. Cookei</i>	
351.	ROBERGEA.	<i>Desm. R. Unica.</i>	 1 ^{mm} .
170.	RÆSTELIA.	<i>Reb. R. Cancellata.</i>	 0 ^{mm} . 007, Sp ^{re} 0 ^{mm} . 027
256.	ROSELLINIA.	<i>De Not. R. Mammæformis.</i>	 0 ^{mm} . 018
79.	RUSSULA.	<i>Fries. R. Cyanoxantha.</i>	 0 ^{mm} . 0084
197.	SACCOBOLUS.	<i>Boud. S. Neglectus.</i>	 0 ^{mm} . 009
445.	SARCOPODIUM.	<i>Ehr. S. Roseum.</i>	 0 ^{mm} . 007
191.	SARCOSCYPIA.	<i>Fries. S. Coccinea.</i>	 0 ^{mm} . 024
189.	SARCOSPHERA.	<i>Aw. S. Macrocalix.</i>	 0 ^{mm} . 016

AGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
37.	SCHIZOPHYLLUM.	<i>Fries.</i> S. Commune.	 0 ^{mm} . 0056
348.	SCHIZOTHYRIUM.	<i>Desm.</i> S. Ptarmicæ.	 0 ^{mm} . 009
225.	SCHIZOXYLUM.	<i>Pers.</i> S. Berkeleyana.	 0 ^{mm} . 084
344.	SCIRRHIA.	<i>Nits.</i> S. Rimosa.	 0 ^{mm} . 02
126.	SCLERODERMA.	<i>Pers.</i> S. Verrucosum.	 0 ^{mm} . 014
493.	SCLEROTIUM.	<i>Pers.</i> S. Semen. Mycelium dur. Stérile	
407.	SCOLECOSPORIUM.	S. Macrosporum.	 0 ^{mm} . 018
451.	SCOLECOTRICHUM.	<i>Kunz.</i> S. Clavariarum.	 0 ^{mm} . 013
424.	SEPEDONIUM.	<i>Link.</i> S. Chrysospermum.	 0 ^{mm} . 009
410.	SEPTOGLÆUM.	<i>Sacc.</i> S. Acerinum	 0 ^{mm} . 021
433.	SEPTOCYLINDRIUM.	<i>Sacc.</i> S. Viride	 0 ^{mm} . 045
985.	SEPTORIA.	<i>Fries.</i> S. Calystegiæ.	 0 ^{mm} . 045
457.	SEPTONEMA.	<i>Cord.</i> S. Multiplex. Voir Hormiscium Stilbosporum.	
467.	SEPTOSPORIUM.	<i>Cord.</i> S. Velutinum.	 0 ^{mm} . 04
192.	SEPULTARIA.	<i>Cooke.</i> S. Arenaria.	 0 ^{mm} . 015
327.	SILLIA.	<i>Karst.</i> S. Ferruginea.	 0 ^{mm} . 054

PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE
Sup ^l .	SIRODESMIUM.	<i>De Not.</i> Sub Fumago. p. 468.	
105.	SISTOTREMA.	<i>Pers.</i> S. Confluens.	
102.	SOLENIA.	<i>Fuck.</i> S. Anomala.	
253.	SORDARIA.	<i>Ces.</i> S. Caudata.	
423.	SPHACELIA.	<i>Lév.</i> S. Segetum.	
270.	SPHÆRELLA.	<i>Ces.</i> S. Crassa.	
329.	SPHÆRIA.	<i>Auct.</i> S. Fissa ? <i>Sacc.</i>	
484.	SPHÆRIDIDIUM.	<i>Fres.</i> S. Citrinum.	
390.	SPHÆROGRAPHIUM.	<i>Sacc.</i> S. Micropera.	
124.	SPHÆROBOLUS.	<i>Tode.</i> S. Stellatus.	
365.	SPHÆRONEMA.	<i>Fries.</i> S. Conicum.	
371.	SPHÆROPSIS.	<i>Lév.</i> S. Longissima.	
229.	SPHÆROTHECA.	<i>Lév.</i> S. Castagnei.	
308.	SPHÆRULINA.	<i>Sacc.</i> S. Intermixta.	
427.	SPICARIA.	<i>Hartz.</i> S. Verticillata.	
177.	SPINELLUS.	<i>Vantieg.</i> S. Fusiger.	
475.	SPOROCYBE.	<i>Fries.</i> S. Byssoides.	
178.	{ SPORODONIA.	<i>Link.</i> S. Grandis.	
	{ SYZYGITES.	<i>Erh.</i> S. Megalocarpus.	
303	SPORORMIA	<i>De Not.</i> S. Intermedia.	

PAGES GENRES ESPÈCES

SPORES ET MESURE.

462. SPORODESMIUM. *Link.* S. Ulmicolum.

461. SPOROSCHISMA. *Berk.* S. Mirabile.

421. SPOROTRICHUM. *Link.* S. Scotophilum.

134. SPUMARIA. *Pers.* S. Alba.

448. STACHYLIDIUM. *Link.* Bicolor.

439. STACHYBOTRYS. *Cord.* S. Alternans.

382. STAGONOSPORA. *Sacc.* S. Graminella.

410. STEGANOSPORIUM. *Cord.* Compactum

222. STEGIA. *Fries.* S. Ilcicis.

134. STEMONITIS. *Fries.* S. Ovata


465. STEMPHYLIUM. *Wallr.* S. Paradoxum.




















492. STEPHANOMA. *Wallr.* S. Strigosum.

441. STREPTOTRIX. *Cord.* S. Fusca.

108. STEREUM. *Pers.* S. Hirsutum.

463. STIGMELLA. *Lév.* S. Dryina.



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
273.	STIGMATEA.	<i>Fries. S. Robertiani.</i>	 0 ^{m.m.} 012
225.	STICTIS.	<i>Pers. S. Radiata.</i>	
406.	STILBOSPORA.	<i>Pers. S. Macrosperma.</i>	 0 ^{m.m.} 03
470.	STILBUM.	<i>Tode. S. Villosum.</i>	 0 ^{m.m.} 0042
93.	STROBYLOMYCES.	<i>Berk. S. Strobilaceus.</i>	 0 ^{m.m.} 01
62.	STROPHARIA.	<i>Quel. S. Æruginosa.</i>	 0 ^{m.m.} 008
478.	STYSANUS.	<i>Cord. S. Stemonites.</i>	 0 ^{m.m.} 008
214.	TAPESIA.	<i>Fries. T. Rosæ.</i>	 0 ^{m.m.} 007
181.	TAPHRINA.	<i>Tul. T. Populina.</i>	 0 ^{m.m.} 005
316.	TEICHOSPORA.	<i>Fuck. T. Obduces.</i>	 0 ^{m.m.} 021
178.	THAMNIDIUM.	<i>Link. T. Elegans.</i>	  0 ^{m.}
316.	THECAPHORA.	<i>Tul. T. Delastrina.</i>	 0 ^{m.m.}
107.	THELEPHORA.	<i>Elis. T. Terrestris.</i>	 0 ^{m.m.} 007
305.	THYRIDARIA.	<i>Sacc. T. Incrustans.</i>	 0 ^{m.m.} 012
321.	THYRIDIDIUM.	<i>Sacc. T. Philadelphi.</i>	 0 ^{m.m.} 018
341.	THYRONECTRIA.	<i>Sacc. T. Pyrrhochlora.</i>	 0 ^{m.m.} 018
405.	THYSIDIUM.	<i>Mont. T. Botryosporum.</i>	  0 ^{m.m.} 0

AGES

GENRES

ESPÈCES

SPORES ET MESURE.

141. TILLETIA. *Tul.* L. Caries.

435. TORULA. *Pers.* T. Herbarum.

100. TRAMETES. *Fries.* T. Hexagonoides.

302. TREMATOSPHERIA. *Fuck.* T. Fraxini.

120. TREMELLA. *Dill.* T. Fimbriata.

466. TRICHÆGUM. *Cord.* T. Cladosporioides.

131. TRICHIA. *Hallr.* T. Chrysosperma.

418. TRICHODERMA. *Pers.* T. Lignorum.

199. TRICHOGLOSSUM. *Boud.* T. Hirsutum.

30. TRICHOLOMA. *Qué.* T. Nudum.

193. TRICHOPHÆA. *Boud.* T. Hispidula.


212. TRICHOSCYPHA. *Boud.* T. Pygmæa.















442. TRICHOSPORIUM. *Fries.* T. Chartaceum.

428. TRICHOTHECIUM. *Link.* T. Roseum.

148. TRIPHAGMIUM. *Tul.* T. Ulmarizæ.

468. TRIPOSPORIUM. *Cord.* T. Elegans.



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
221.	TROCHILA.	<i>Fries. T. Craterium.</i>	 0 ^{mm} .006
86.	TROGIA.	<i>Fries. T. Crispa.</i>	Sporis non visis. <i>Sec. Sacc.</i> 0 ^{mm} .004
60.	TUBARIA.	<i>Quél. T. Furfuracea.</i>	 0 ^{mm} .007
227.	TUBER.	<i>Mich. T. Mesentericum.</i>	 0 ^{mm} .02
479.	TUBERCULARIA.	<i>Tode. T. Vulgaris.</i>	 0 ^{mm} .008
481.	TUBERCULARINA.	<i>Sacc. T. Persicina.</i>	 0 ^{mm} .008
134.	TUBULINA.	<i>Pers. T. Cylindrica. (Fragiformis).</i>	 0 ^{mm} .005
128.	TULASNODEA.	<i>Fries. T. Mammosa.</i>	 0 ^{mm} .004
118.	TYPHULA.	<i>Fries. T. Erythropus.</i>	 0 ^{mm} .006
230.	UNCINULA.	<i>Lév. U. Adunca.</i>	 0 ^{mm} .02
213.	URCEOLELLA.	<i>Boud. U. Hyalina.</i>	 0 ^{mm} .006
158.	URED0.	<i>Pers. U. Potentillarum.</i>	 0 ^{mm} .017
142.	UROCYSTIS.	<i>Lév. U. Colchici.</i>	 0 ^{mm} .006
156.	UROMYCES.	<i>De By. U. Alliorum.</i>	 0 ^{mm} .021
139.	USTILAGO.	<i>Tul U. Segetum.</i>	 0 ^{mm} .006

AGES GENRES ESPÈCES SPORES ET MESURE.

262. USTULINA. *Tul.* U. *Vulgaris.*



137. UTRARIA. *Tourn.* U. *Excipuliformis.*



242. VALSA. *Fries.* V. *Pini.*



292. VALSARIA. *De Not.* V. *Cincta.*



Supl. VELUTARIA. *Fuck.* V. *Rufo-Olivacea.*



278. VENTURIA. *De Not.* V. *Circinans.*



366. VERMICULARIA. *Fries.* V. *Graminicola*



125. VERPA. *Schwartz.* V. *Digitaliformis.*



425. VERTICILLIUM. *Nées.* V. *Agaricinum.*



485. VOLUTELLA. *Tode.* V. *Buxi.*




47. VOLVARIA. *Quél.* V. *Speciosa.*



367. WALLROTIELLA. *Sacc.* V. *Minima.*



48. XENODOCHUS. *Fuck.* X. *Carbonarius.*






60. XYLARIA. *Hill.* X. *Polymorpha.*



25. XYLOGRAPHA. *Fries.* X. *Paraella.*



PAGES	GENRES	ESPÈCES	SPORES ET MESURE.
234.	ZASMIDIUM.	<i>Fries</i> , Z. Cellare.	 0 ^{mic} . 009 0 ^{mic} . 009
311.	ZIGNOELLA.	<i>Sacc</i> , Z. Ovoidea.	 0 ^{mic} . 02
338.	ZOPFIA.	<i>Rabh</i> , Z. Rhizophila.	 0 ^{mic} . 05

SUPPLÉMENT

SUPPLÉMENT.

APIOSPORIUM MELAMPYRI. *Sacc.* — **Sphæria Nervisequa.** *D. C.* — Alb. de l'Est. — Sur *Melampyrum pratense*. — Hypophylle ; périthèces petits, sphériques, noirs, luisants, situés le long des nervures de la feuille ; nucleus blanchâtre, stérile. — AC. — Automne. — Sermaize. Charmont.

ASCOCHYTA CLEMATIDIS. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — (non **Asc. Clematidina.** *Sacc.*) — Croît sur les feuilles de *Clematis vitalba* encore vertes, à la surface de larges taches noires, irrégulières. — Périthèces hémisphériques, jaunâtres, entourés à la base de quelques filaments blanchâtres ; ostiole assez large ; sporules incolores, elliptiques, uniseptées, 0^{mm},012. — AR. — Soulanges. — Automne.

ASCOPHANUS SPADICEO-NIGER. *Ch. R.* — Rec. 8. p. 22. — Réceptacles sphériques, épars, superficiels, rugueux, roux étant frais, noirs et ridés étant secs, ressemblant à *Peziza nidulus* et à

Riparobius Cookei. — Thèques larges, octospores ; spores bisériées. elliptiques, incolores, 0^{mm},015 ; paraphyses cylindriques, continues ou septées, non renflées au sommet. — Espèce voisine d'*Ascoph Ochraceus* de Boud. — Récolté sur le fumier et les crottes de lapin. — St-Amand. — Printemps.

CAMAROSPORIUM MACROSPORUM. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux morts de *Philadelphus coronarius*. — Périthèces sphériques, sous-cutanés, paraissant à travers les fentes de l'épiderme ; sporules lancéolées, brunes à 4-5 cloisons. — AR. — Jardins. — Hiver, Printemps. — St-Amand.

CHÆTOPHOMA ANTIRRHINI. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur capsules d'*Antirrhinum majus*. — Périthèces bruns, subsphériques, puis affaissés, glabres, munis à la base de fibrilles radiées ; ostiole central ; sporules ovales-oblongues, incolores, très nombreuses, 0^{mm},004. — Précède l'apparition de *Pleospora herbarum*. — Var. *Antirrhini*. — AC. — St-Amand. — Jardins. — Automne.

CLASTEROSPORIUM SPARSUM. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Syringa vulgaris*. — Taches velues, noirâtres, formées par les conidies claviformes, brunes, munies de la base au sommet de 8 à 10 cloisons. — AR. — Jardins. — St-Amand. — Printemps, Hiver.

CONIOTHYRIUM AILANTHI. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Pycnide de *Thyridaria ailanthi*. —

Périthèces 4, réunis en cercle, entourés d'un duvet rouge à la base, renfermant des sporules incolores puis brunes, courtement pédicellées, 0^{mm},0045. — Croît en compagnie du *Thyridaria* sur rameaux d'*Ailanthus glandulosa*. — AR. — Jardins. — Soulanges, Ablancourt. — Printemps.

CORTICIUM AMORPHUM. Conidies. Ch. R. — Alb. de l'Est. — J'ai découvert l'appareil conidien du *Corticium* dans l'épaisseur du tissu sous-hyménial ; il consiste en filaments arborescents, hyalins, porteurs sur chaque ramuscule, de conidies simples ou en chapelet remplies de sporidioles. — St-Amand. — 1877. — Bull. Soc. Bot. de France.

Genre CYTOSPORELLA. — Sacc.

CYTOSPORELLA CONSPERSA. Ch. R. — Alb. de l'Est. — Pycnide de *Tympanis conspersa*. — Conceptacles ovoïdes, noirs, entourant la base des cupules de *Tympanis* et issus du même strôme, laissant échapper de leur sommet des cirrhes de sporules incolores, elliptiques, 0^{mm},003; basides continues, simples ou un peu rameuses. — Sur branches mortes de Pommier. — Jardins, vergers. — St-Amand, St-Lumier. — AR. — Printemps.

Genre CYSTOTRICHA. — B. et Br.

CYSTOTRICHA STRIOLA. B. et Br. — Rec. 11. — Sur bois dénudé d'*Alnus glutinosa* servant

de barrière à un jardin de St-Amand. — Péri-thèces incrustés dans le bois, bruns, noircissant, hystériiformes ; nucleus blanchâtre composé de basides longues, rameuses, septées, garnies latéralement de sporules incolores, elliptiques, uniseptées, 0^{mm},007. — Hiver-Printemps. — AR.

CYTOSPORA CORNI. *Fuckl.* — Alb. de l'Est. — Spermogonie de *Valsa fallax* sur rameaux de *Cornus sanguinea*. — Petites pustules corticoles à peine proéminentes ; périthèces 8-10 disposés en cercle, émettant des cirrhes blanchâtres de sporules botuliformes, hyalines 0^{mm},0045. — AC. — Ablancourt, St-Amand. — Automne.

DENDROPHOMA PINI. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur branches et rameaux de Pin sylvestre. — Spermogonie de *Phacidium pini*. — Péri-thèces hémisphériques, s'ouvrant en fentes comme l'état ascophore ; spermaties petites, cylindriques, courbes, portées sur des basides rameuses, — St-Amand, Soulanges. — AC.

DEPAZEA TREMULÆCOLA. *D. C. et Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur feuilles de Peuplier-Tremble. — Taches rondes, grises, bordées par une zone plus foncée, occupées au centre par des groupes de périthèces noirs, ronds, aplatis, disposés la plupart en cercles concentriques ; sporules cylindriques, 0^{mm},02. — AR. — Bois de St-Lumier. — Automne.

DIPLODIA SALICINA. *Lév. Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de Saule. — Groupes de périthèces sous-cutanés, brunissant l'épiderme sou-

levé en forme de petites pustules hémisphériques ; du sommet déchiré sortent des cirrhes blanchâtres de sporules incolores ; ces sporules d'abord continues brunissent en vieillissant et prennent la cloison médiane. — AR. — St-Amand. — Automne. — C'est la pycnide de *Cucurbitaria salicis*.

HENDERZONIA CARPINI. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de *Carpinus*. — Tubercules noirs, saillants, aplatis au sommet, composés de sporules brunes, oblongues-ovales, à 4-5 cloisons, très longuement stipitées. — Pycnide de *Massaria Carpini*. — AC. — St-Amand. — Printemps.

HENDERZONIA POLYCYSTIS. *B. et Br.* — Alb. de l'Est. — Sur branches mortes de Bouleau. — Périthèces aplatis, sous-cutanés, réunis en groupes ; sporules brunes, oblongues-fusiformes, larges, à 5-7 cloisons. — AR. — St-Amand. — Stylospore de *Pseudo-valsella lanciformis*. — Printemps, automne.

HYDNUM ERINACEUM. *Conidies. Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Conidies intracellulaires situées dans l'épaisseur du parenchyme près du revêtement du chapeau ; conidies de deux sortes, les unes ovales-elliptiques munies de deux gouttelettes. 0^{mm},007 ; les autres baculoïdes-fusiformes, 0^{mm},011. — St-Amand, Bassu. — RR. — Bull. Soc. Bot. de France, 1881.

Genre KALMULSIA. — *Niessl.*

KALMUSIA HYPOTEPHRA. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur branche de Chêne dénudée. — Strômes elliptiques, noirâtres, minces, épars, percés par les ostioles des périthèces logés dans le bois ; thèques cylindriques, renfermant 8 sporidies brunes, allongées, un peu courbes, munies de 3 cloisons et de 4 gouttelettes, 0^{mm},018. — AR. — Bois de St-Lumier. — Automne.

PHOMA AQUILEGIÆ. *Ch. R.* — Rec. 11. — Cette espèce croît en été sur les tiges mortes d'*Aquilegia vulgaris* dont l'épiderme est détaché, exposées à l'humidité. — Elle se présente en groupes de petits points disposés en ligne, de couleur brune ; les sporules, assez grosses 0^{mm},006, terminent des basides un peu arquées et deux fois plus longues. — Jardins. — St-Amand.

PHOMA BACCÆCOLA. *Ch. R.* — Rec. 11. — Sur baies de *Symphoricarpon* noircies par la vétusté. — La surface de la tache est parsemée de périthèces hémisphériques, à large ostiole laissant échapper un globule de sporules elliptiques à 2 gouttelettes ; les sporules sont portées par des basides droites, assez longues. — AC. — Jardins. — St-Amand. — Automne.

PHOMA CISSI. *Ch. R.* — Rec. 11. — J'ai récolté cette espèce dans mon jardin, sur la *Vignevierge*. — Les sarments envahis présentent à leur surface des pustules éparses, formées par

les périthèces sous-jacents, recouverts par l'épiderme soulevé et fendu ; les périthèces noirs, hémisphériques contiennent des sporules allongées, 0^{mm},006, renflées aux extrémités, munies de 2 gouttelettes, insérées sur de longues basides droites. — St-Amand. — Printemps.

PHOMA COLPOMATIS. *Ch. R.* — Rec. 8. — Ce phoma est la spermogonie du *Colpoma quercinum*. — Il croît au centre du *Colpoma* en vétusté ou dans son voisinage ; ses périthèces sont noirs, sphériques, superficiels ; ils renferment des sporules ovales ou cylindriques très courtes, 0^{mm},0028. — Bois de St-Amand. — Automne.

PHOMA RHAMNI. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux de *Rhamnus frangula* en compagnie du *Diplodia frangulae*. — Spermogonie de *Cucurbitaria Rhamni*. — Périthèces noirs, ronds, aplatis, renfermant des sporules de phoma grosses, 0^{mm},008, elliptiques, à 2 gouttelettes ; basides longues. — AR. dans les haies des jardins. — La Chaussée. — Printemps.

PHOMA THLASPIDIS. *Ch. R.* — Rec. 8. — Sur tiges mortes de *Thlaspi perfoliatum*. — Périthèces hémisphériques, noirâtres, épars ; sporules elliptiques à 2 gouttelettes, 0^{mm},006 ; basides droites, assez longues. — C. — St-Amand. — Juillet. — Le long des chemins arides.

PHOMA. VISCI. *Sacc.* — Alb. de l'Est. — Sur les feuilles mortes et tombées du *Viscum album*. — Périthèces disséminés sur des taches rondes, blanches, entourées d'une ligne rougeâtre :

apparence d'un *Phyllosticta*. — AC. — Soulanges, Ablancourt. — Hiver.

PHOMA ULMICOLA. *Ch. R.* — Rec. 9. — Spermogonie de *Cryptosporella hypodermia*. — Cette espèce croît sur les mêmes rameaux que le *Cryptosporella* ; ses périthèces sont épars, sous-épidermiques, plus petits que ceux de la forme thécasporée ; sporules grandes, 0^{mm},012, ovales, remplies de gouttelettes, portées par des basides longues, rappelant celles de *Melanconium juglandis*. — Saccardo en fait un *Fusicoccum* avec un point de doute. Je n'ai pas vu les loges, cellulaires qui caractérisent ce dernier Genre. — Bois de St-Amand. — Hiver. — Sur les rameaux d'*Ulmus campestris*.

PHYLLACHORA POPULI. (*Botulispora*). *Ch. R.* — Alb. de l'Est et Rec. 12. — Cette espèce remarquable croît au printemps sur les feuilles de *Populus cordifolia*. — Je l'ai récoltée entre St-Lumier et St-Quentin-les-Marais, en février 1882. — Comme nous l'avons dit page 343, elle est ambiguë et ne peut trouver une place fixe dans la Classification. Elle se rapproche d'un côté du Genre *Cryptosphaeria* par ses sporidies botuliformes, brunissantes et ses thèques longuement pédicellées, de l'autre du Genre *Phyllachora* (*Phyll. ulmi*) par sa station foliicole et ses périthèces aplatis, confluent, réunis en strôme.

RHABDOSPORA TRAGOPOGONIS. *Ch. R.* — Rec. 12. — Cette espèce se rapproche de *Rhabd.*

solidaginis, cependant elle en diffère par sa station, par ses périthèces plus saillants et disposés en ligne, enfin par la taille plus petite des sporules, 0^{mm},018, exemptes de gouttelettes. — Récoltée en décembre 1887, sur le chemin de Lisse à Bassu.

SCHIZOTHYRIUM JUGLANDIS. *Ch. R.* — Alb. de l'Est. — Croît sur les pétioles des feuilles mortes du Noyer. — Elle forme, sur l'épiderme décoloré, des points noirs, très petits, ressemblant à des *hysterium*. — Plongés dans l'eau les réceptacles s'ouvrent en cupules dont les bords sont un peu laciniés. Thèques en massue ; sporidies 4-6, incolores, elliptiques-fusoïdes ; 0^{mm},008 ; paraphyses continues, renflées au sommet. — AC. — Automne, hiver. — St-Amand.

SCLEROTIUM DURUM. *Kickx.* — Alb. de l'Est. — Très commun sur les grandes herbes sèches. — Pustules noires, de formes variées, rugueuses, allongées ; substance interne blanche. Très souvent envahi par *Botrytis cinerea*. — Partout. — Hiver, printemps.

SCLEROTIUM SCOLYMI. *West.* — Alb. de l'Est. A la base des feuilles d'*Artichaut* (involucre). — Pustules saillantes, coniques, pâles puis brunes. — Substance interne blanche. — AC. — Jardins.

SIRODESMIUM FUMAGO. *Sacc.* — Rec. 12. — **Fumago vagans**, var. **Armeniaca.** *West.* — Cette espèce rampe en forme de rosace sur les feuilles de Pêcher. — Ses filaments sont nodu-

leux, torulacés, bruns, entremêlés de sporules elliptiques presque incolores. — Jardins. — Autonne. — St-Amand.

SPHÆRONEMA. SUBULATUM *des auteurs.* —

Eleutheromyces *de Fuckel.* — Cette espèce croît en groupes très denses sur les chapeaux des agarics desséchés après l'hiver. — Les périthèces sont en forme de bouteille allongée, d'un brun-rougeâtre plus pâle au sommet, terminés par une couronne de filaments aigus qui s'écartent pour le passage d'un globule de conidies ; à l'intérieur ces conidies incolores, fusiformes, 0^{mm}.01, munies d'un cil à chaque extrémité sont portées par des filaments simples ou peu rameux, fasciculés, dressés, septés, terminés en pointe. — Les conidies prennent naissance au dessous de chaque cloison. — J'ai vainement cherché les thèques indiquées par Fuckel et la description exacte que je donne ici permet, sans nier l'existence possible de la forme thécasporée, de conserver à cette spermogonie le nom de *Sphaeronema* que Fuckel et Saccardo ont écarté de leur classification.

TREMATOSPHÆRIA FRAXINI. *Ch. R.* — Rec.

2. — Sur les rameaux morts de *Fraxinus excelsior*. — Périthèces épars, sphériques, à ostiole conique émergeant à peine de l'épiderme noirci par la sortie des sporidies ; thèques fusiformes, longuement atténuées en pédicelle, octospores, entourées de paraphyses continues ; sporidies brunes, cylindriques, botuliformes, dis-

tiques, munies de 5 cloisons. — R. — Bois de St-Amand. — Automne, printemps.

TRIBLIDIUM ABIETIS. *Ch. R.* — Rec. 12. — Sur bois dénudé de *Pinus abies*. — Périthèces petits (à peine 1 mm.) hystériiformes, noirs ; thèques obovales, 0^{mm},051, sessiles, contenant de 4 à 8 spores brunes, biloculaires, 0^{mm},014 ; paraphyses peu distinctes rameuses au sommet. -- R. — St-Amand. — Hiver.

TRICHOSTROMA. QUERCUS. *Ch. R.* — Rec. 12. — Cette espèce vient en groupes sur le bois dénudé et humide des branches de Chêne, sous forme de tubercules très petits, sphériques, d'un jaune sale un peu verdâtre, glabres d'abord puis hérissés de poils noirs, excepté au sommet qui se dilate comme le disque d'une pézize pour le passage de la masse des sporules ; la substance des tubercules est formée d'une matière mucilagineuse, entremêlée de filaments incolores, rameux et parsemés de sporules ovoïdes, 0^{mm},003. — R. — Récolté à St-Amand, le 22 décembre 1887.

URCEOLELLA RICHONIS. *Boudier.* — Alb. de l'Est. — Mon savant ami M. Boudier, Président de la Société Mycologique, m'a fait la gracieuseté de me dédier cette espèce que j'ai trouvée en Décembre 1885, entre Lisse et St-Amand. — Elle a été décrite dans le Bulletin de la Société mycologique, tom. IV, sous le nom de *Urceolella Richonis*.

UROCYSTIS OROBANCHES. *Sacc.* — Alb. de

l'Est. — Sub *Tuburcinia*. — Croît à la base des tiges de *Phelipæa ramosa* parasite des racines du Chanvre. — Tubercules saillants formés par l'épiderme soulevé par la masse de sporules sous-jacentes, noires, rondes-irrégulières, assez grosses. — AR. mais commun à St-Lumier-en-Champagne, dans les chenevières. — En Automne.

Genre VELUTARIA. — *Fuckel*.

VELUTARIA RUFO-OLIVACEA. *Fuck.* — Alb. de l'Est. — Sur rameaux desséchés de *Rosa canina*, encore adhérents à la souche. — Pustules velues, brun-clair, pulvérulentes ; d'abord fermées puis ouvertes en cupules ; chair épaisse ; hymenium couvert de thèques cylindriques, 0^{mm},065 ; paraphyses simples, plus longues ; 8 spores elliptiques-ovales, incolores, 0^{mm},007. — Espèce souvent stérile. — R. — St-Amand. — Automne.

ZASMIDIUM CELLARE. *Fries.* — **Cephalotheca Cellaris.** *Ch. R.* — Nous avons dit, page 234, que le *Zasmidium* était un *Eurotium* pour la fructification ; des échantillons de périthèces, fraîchement récoltés m'ont permis de découvrir certains caractères essentiels qui m'avaient échappé dans les analyses antérieures et m'autorisent à fixer définitivement l'espèce en question dans le Genre *Sphaerotheca* très voisin en effet du Genre *Eurotium* ; ces caractères con-

sistent dans le mode de formation des thèques au sommet des filaments hyméniens et dans la couleur brune ou noire des périthèces et des spores.

Selon moi, le Genre *Zasmidium* disparaît et rentre dans le Genre *Sphaerotheca* ; notre espèce devient le *Sphaerotheca cellaris* et les noms de *Racodium* de Pers. *Antennaria* et *Zasmidium* de Fries, sont réservés pour désigner les larges plaques velues qui envahissent les tonneaux que je considère comme le Mycelium, ordinairement stérile, de *Cephalotheca cellaris*.



CONTRIBUTION
A LA
Flore Mycologique Générale.

Découvertes faites par Ch. RICHON,

INSCRITES DANS LE CATALOGUE.

N° d'ordre.

- 419. Ambliosporium Album.
- 813. Æcidium Gentianæ. 1872.
- 883. Aleuria Epixyla.
- 1164. Anthostomella Berberidis.
- 1165. Anthostomella Bromi.
- 1687. Ascochyta Thlaspidis.
- { 925. Ascophanus Spadiceo-Niger.
- { Suppl.
- 1080. Asterina Scabiosæ.
- 1463. Calonectria Richoni.

N° d'ordre.

1078. Cephalotheca Hispida.
1728. Camarosporium Berberidis.
1133. Ceratostoma Rosæ.
2032. Cercospora Liliicola.
Suppl. Chætophoma Antirrhini.
2003. Cladosporium Pilicola.
2018. Clasterosporium Ligustri.
2019. Clasterosporium Tripartitum.
1937. Coniosporium Caulincolum.
1645. Coniothyrium Fasciculatum.
1647. Coniothyrium ? Populi.
1645. Coniothyrium Laburni.
1768. Cornularia Boudieri.
Suppl. Corticium Amorphum. *Conidies*.
1430. Cryptospora Quercus.
Suppl. Cryptosporella Conspersa.
1399. Cucurbitaria Mahoniæ.
Suppl. Cystotricha Striola. *Sacc*.
985. Dasyscypha Hypocastani.
1917. Didymopsis spicata.
Suppl. Dendrophoma Pini.
1769. Dilophospora Graminis.
1801. Dinemasporium Purpurascens.
2006. Diplococcium Pulchrum.

N° d'ordre.

1682. Diplodia Vincæ.
1684. Diplodiella Junci.
1694. Diplodina Antirrhini.
1685. Diplodina Minima.
2074. Ecchyna Poricola.
1116. Eutypa Ligustri.
1808. Glæosporium Gallarum.
1809. Glæosporium Phasæoli.
1231. Gnomonia Rhoïs.
1524. Godronia Mühlenbeckii.
1973. Haplographium Penicillatum.
1704. Henderzonia Aconiti.
1705. Henderzonia Hyperici.
1706. Henderzonia Juniperi.
1707. Henderzonia Ligustri.
1708. Henderzonia Platani.
Suppl. Hydnium Erinaceum. *Conidies*.
632. Hymenogaster Leptoniæsporus.
1330. Leptosphæria Berberidis.
1329. Leptosphæria Stellariæ.
1331. Leptosphærites Lemoinii.
1775. Leptothyrium Lycopi.
1776. Leptothyrium Berberidis.
1500. Lophiostoma Genistæ. Var.

N° d'ordre.

- 1496. Lophiotrema Epilobii.
- 1492. Lophiotricha Viburni.
- 988. Lachnella Juniperi.
- 403. Marasmius Festucae.
- 1357. Metasphaeria Gei.
- 1491. Microthyrium Platani.
- 1490. Microthyrium Visci.
- 1969. Monotospora Cuneiformis.
- 1454. Nectria Dahliæ.
- 1870. Œdocephalum Agaricinum.
- 1859. Oospora Corii.
- 1858 Oospora Sphærellæ.
- 1418. Ophiobolus Galii.
- 1419. Ophiobolus Meliolæoides.
- 1849. Ovularia Vitis.
- 1085. Perisporium Matricariæ. *Conidie*.
- 1084. Perisporium Secale.
- 1844. Pestalozzia Liliorum.
- 1842. Pestalozzia Potentillæ.
- 1041. Phacidium Viride.
- Suppl. Phoma Aquilegiæ.
- Suppl. Phoma Baccæcoia.
- Suppl. Phoma Cissi.
- Suppl. Phoma Colpomatis.

N° d'ordre.

- Suppl. *Phoma Ulmicola*.
1194. *Phomatospora Berberidis*.
709. *Phragmidium Sparsum*.
Puccinia Malvacearum, en 1872.
937. *Pilacre*, en 1872.
{ 1480.
{ Suppl. *Phyllachora Populi*.
1549. *Phyllosticta Trifolii*.
1197. *Physalospora Ononidis*.
1630. *Pyrenochæta Berberidis*.
1014. *Pyrenochæta Jaceæ*.
Suppl. *Rhabdospora Tragopogonis*.
1389. *Rhamphoria Buxi*.
Suppl. *Schizothyrium Juglandis*.
1759. *Septoria Anagallis*.
1221. *Sphærella Ebuli*.
1431. *Sphæria Reniformis*.
1432. *Sphæria Dichænoides*.
2016. *Sphæridium Citrinum*.
1765. *Sphærographium Coluteæ*.
1766. *Sphærographium Coryli*.
2041. *Sporidesmium* ? *Alitosporii*.
2088. *Sporocybe Carnea*.
1987. *Stachylidium Sambuci*.

N° d'ordre.

1829. *Stilbospora Crataegi*.
2070. *Stilbum Pilacriforme*.
1403. *Thyridium Philadelphi*.
1940. *Torula Compniacensis*.
1942. *Torula Corii*.
1944. *Torula Tuberculariæformis*.
Suppl. *Triblidium Abietis*.
{ 1337. *Trematosphæria Fraxini*.
{ Suppl.
Suppl. *Trichostroma Quercus*.
2100. *Tubercularia Hydnoidea*.
{ 998. *Urceolella Richonis*.
{ Suppl.
1076. *Zasmidium Cellare*.
-

LISTE

PAR ORDRE DE CLASSIFICATION,
des Champignons récoltés dans les pays
circonvoisins, dont nous recommandons la
recherche aux botanistes de la Marne.

- I. Amanita Stragulata. *Fries.*
- II. Amanita Nitida. *Fries.*
- III. Tricholoma Album. *Fries.*
- IV. Tricholoma Splendens. *Fries.*
- V. Tricholoma Amaricans. *Fries.*
- VI. Clitocybe Gilva. *Fries.*
- VII. Clitocybe Amara. *Fries.*
- VIII. Mycena Pelianthina. *Fries.*
- IX. Mycena Rosella. *Fries.*
- X. Mycena Frumentacea. *Roze.*
- XI. Mycena Seynii. *Quélet.*
- XII. Enteloma Clypeatum. *Fries.*

- XIII. Entoloma Sericellum. *Boud.*
XIV. Entoloma Queletii. *Boud.*
XV. Nolanea Pascua. *Fries.*
XVI. Leptonia Serrulata. *Fries.*
XVII. Pleurotus Cornucopioides. *Fries.*
XVIII. Inocybe Incarnata. *Gillet.*
XIX. Inocybe Bongardi. *Weinn.*
XX. Inocybe Strigiceps. *Fries.*
XXI. { Psalliota Sylvatica. *Quélet.*
XXII. { Psalliota Peronata. *Rose.*
XXIII. { Psalliota Duriuscula.
XXIV. { Psalliota Flavescens.
XXV. { Psalliota Tenuipes.

Ces cinq dernières espèces sont décrites dans
l'*Album des Ch. Vénéneux et Comestibles* de
Richon et Roze.

- XXVI. Stropharia Cotonea. *Quélet.*
XXVII. Cortinarius Orellanus. *Fries.*
XXVIII. Cortinarius Cotoneus. *Fries.*
XXIX. Cortinarius Purpurascens. *Quélet.*
XXXI. Cortinarius Claricolor. *Fries.*
XXXII. Cortinarius Dibaphus. *Fries.*
XXXIII. Cortinarius Torvus. *Fries.*
XXXIV. Cortinarius Sanguineus. *Fries.*
XXXV. Cortinarius Cinnabarinus. *Fries.*

- XXXVI. Cortinarius Saturninus. *Fries.*
XXXVII. Hygrophorus Penarius. *Fries.*
XXXVIII. Hygrophorus Pudorinus. *Quélet.*
XXXIX. Hygrophorus Unguinus. *Fries.*
XL. Hygrophorus Chrysodon. *Fries.*
XLI. Hygrophorus Streptopus. *Fries.*
XLII. Lactarius Turpis. *Fries.*
XLIII. Marasmius Globularis. *Quélet.*
XLIV. Boletus Boudieri. *Quélet.*
XLV. Boletus Æstivalis. *Fries.*
XLVI. Polyporus Leucomelas. *Pers.*
XLVII. Polyporus Schweinitzii. *Fries.*
XLVIII. Polyporus Betulinus. *Bull.*
XLIX. Polyporus Evonymi. *Bern.*
L. Polyporus Aureolus. *Fries.*
LI. Trametes Pini. *Fries.*
LII. Hydnum Acre. *Quélet.*
LIII. Hydnum Imbricatum. *Fries.*
LIV. Hydnum Fuligineo-Album. *Fries.*
LV. Hydnum Velutinum. *Fries.*
LVI. Tremellodon Gelatinosum. *Fries.*
LVII. Odontia Fimbriata. *Pers.*
LXIII. Craterellus Pusillus. *Fries.*
LIX. Stereum Disciforme. *Pers.*
LX. Corticum Mougeoti. *Fries.*

- LXI. Cyphella Digitalis. *Alb. et Schw.*
LXII. Clavaria Crispula. *Fries.*
LXIII. Tremella Viscosa. *Berk.*
LXIV. Polysaccum Crassipes. *D. C.*
LXV. Utraria Cælata. *Bull.*
LXVI. Geaster Fimbriatus. *Fries.*
LXVII. Battarea Giucciardiana. (pour mémoire. —
Espèce étrangère).
LXVIII. Morchella Deliciosa. *Fries.*
LXIX. Gyromitra Esculenta. *Pers.*
LXX. Helvella Monachella. *Pers.*
LXXI. Sparassis Laminosa. *Fries.*
LXXII. Peziza Wrightii. *Cooke.*
LXXIII. Geoglossum Peckianum. *Boud.*
LXXIV. Trichoglossum Hirsutum. *Pers.*
LXXV. Microglossum Olivaceum. *Pers.*
LXXVI. Mitrula Paludosa. *Fries.*
LXXVII. Cudonia Circinans. *Pers.*
LXXVIII. Ombrophila Sigilliformis. *Boudier.*
LXXIX. Mniæcia Jungermannia. *Boudier.*
LXXX. Sclerotinia Tuberosa. *Hedw.*
LXXXI. Sclerotinia Curreyana. *B.*
LXXXII. Phialea Squamicola. *Quél.*
LXXXIII. Phialea Echinophila. *Boud.*
LXXXIV. Dasyscypha Pygmæa. *B. Fries.*

- LXXXV. Dasyscypha Godroniana. *Mont.*
LXXXVI. Dasyscypha Schumacheri. *Boud.*
LXXXVII. Tapesia Aurelia. *Pers.*
LXXXVIII. Tapesia Sanguinea. *Pers.*
LXXXIX. Mollisia Collematis. *Boud.*
LC. Rhytisma Andromedæ. *D. C.*
LCI. Tuber Æstivum. *Witt.*
LCII. Tuber Magnatum. *Picol.*
LCIII. Tuber Brumale. *Witt.*
LCIV. Tuber Uncinatum. *Chatin.*
LCV. Tuber (Oogaster) Cibarium. *Witt.*
LCVI. Elaphomyces Leveillei. *Tul.*
LCVII. Elaphomyces Aculeatus. *Witt.*
LCVIII. Queletia Mirabilis. *Fries.*
LCIX. Lepiota Carneifolia. *Gillet.*
C. Pleurotus Olearius. *Fries.*
CI. Mollisia Retincola. *Fuckel.*
-

Les dessins de toutes les espèces indiquées sur cette liste font suite à mon album et portent le même N° en chiffres romains.

LISTE
DES CHAMPIGNONS ALIMENTAIRES
DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE.

LISTE DES CHAMPIGNONS ALIMENTAIRES

DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE.

N ^o D'ORDRE	GENRES	ESPÈCES
1.	AMANITA.	Cesarea. Scop. — RARE. — <i>Noms vulgaires</i> , ORANGE, JAZERAN, DORADE. — Été-Automne. — <i>Localités</i> , Forêts de Reims, Charmont, Trois-Fontaines, terrains sablonneux, calcaires siliceux.
2.	AMANITA.	Ovoidea. Bull. — RARE. — <i>Noms vulgaires</i> , ORANGE BLANCHE, COQUEMELLE. — Automne. — <i>Localité</i> , Forêt de Reims.
3.	AMANITA.	Rubescens. Scop. — COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , GOLEMOTTE, COULEMELLE. — Été-Automne. — Forêts de Charmont, Trois-Fontaines, etc.
4.	AMANITA.	Vaginata. Bull. — COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , COUCOUMELLE GRISE, JAUNE, GRISSETTE. — Bois et Forêts humides d'AY, de Reims, Charmont, etc.
5.	LEPIOTA.	Procera. Scop. — ASSEZ RARE. — <i>Noms vulgaires</i> , GRANDE COULEMELLE COULEUVRÉE. — Été-Automne. — Forêt de Sermaize.
6.	LEPIOTA.	Naucina. Fries. — ASSEZ RARE. — <i>Nom vulgaire</i> , COLOMBETTE. — Fin de l'Été. Automne. — Solitaire ou peu nombreux. — Bords des bois-taillis. — Sermaize, St-Amand.
7.	ARMILLARIA.	Mellea. Wahl. — TRÈS COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , AGARIC ANNULAIRE. — Été-Automne. — Sur les troncs coupés à ras de terre. — On l'appelle aussi TÊTE DE MÉDUSE. — Comestible suivant Quétel, et dangereux suivant Roques.

8. **TRICHOLOMA.** *Columbetta.* *Fries.* — ASSEZ RARE. — *Localités*, Forêts de Cheminon à Sermaize, de Reims.
9. **TRICHOLOMA.** *Georgii.* *L.* — PEU COMMUN. — *Nom vulgaire*, MOUSSERON. — *Localités*, Prés avoisinant les Forêts de Cheminon, St-Eulien. — Avril-Mai.
10. **TRICHOLOMA.** *Pessundatum.* *Fr.* — ASSEZ RARE. — *Localité*, Forêt de Trois-Fontaines — Automne.
11. **TRICHOLOMA.** *Sordidum.* *Fr.* — PEU COMMUN. — *Localités*, Bois de Pins où il croît ça et là. — St-Amand, Bassu, Soulanges. — Automne.
12. **TRICHOLOMA.** *Nudum.* *Bull.* — TRÈS COMMUN. — *Localités*, Bois de Pins et taillis. — Par-tout. — Automne.
13. **TRICHOLOMA.** *Acerbum.* *Fr.* — PEU COMMUN. — *Localités*, Forêts de Charmont, Vanault-les-Dames. — Automne.
14. **CLITOCYBE.** *Odorus.* *Bull.* — COMMUN. — *Nom vulgaire*, CHAMPIGNON ANISÉ. — *Localités*, Bois et taillis où il croît ça et là, isolé. — Charmont, Sermaize, bois d'Epernay à Reims, etc. — Automne.
15. **CLITOCYBE.** *Laccata.* *Scop.* — TRÈS COMMUN. — *Localités*, dans les bois et taillis, allées des Forêts. — Sermaize, St-Amand, Charmont, etc.
16. **COLLYBIA.** *Fusipes.* *Bull.* — ASSEZ COMMUN. — *Nom vulgaire*, AGARIC PIED-FU, CHIENIER VENTRU. — *Localités*, au pied des vieux arbres, dans les forêts. — Cheminon, Charmont, forêt d'Epernay à Reims, etc. — Automne.
17. **PLEUROTUS.** *Ostreatus.* *Jacq.* — COMMUN. — *Noms vulgaires*, COUVROSE, OREILLE DE NOIR-RET. — *Localités*, St-Amand, Soulanges, Bassu, etc. — Sur les vieux troncs de Noyers et de Peupliers. — Automne et Hiver doux.
18. **PLEUROTUS.** *Ulmarius.* *Bull.* — RARE. — *Nom vulgaire*, OREILLE D'ORME. — *Localités*, St-Amand, Aulnay-l'Aître, sur les vieux troncs d'Orme mourants.

N ^o D'ORDRE	GENRES	ESPÈCES
19.	PLEUROTUS.	Eryngii. D. C. — RARE. — <i>Noms vulgaires</i> , OREILLE DE CHARDON, RAGOULE. — <i>Localité</i> , Omev, termes vis-à-vis le Château. — Fin de l'Été.
20.	VOLVARIA.	Bombycina. Scheff. — RARE. — <i>Nom vulgaire</i> , AGARIC INCARNAT. — <i>Localité</i> , Bassu, dans le creux des Noyers. — Automne.
21.	CLITOPILUS.	Orcella. Bull. — COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , ORCELLE, MOUSSERON. — <i>Localités</i> , Forêts du département. — Croît en cercles, dans les sentiers, sous les arbres. — Automne.
22.	PHOLIOTA.	Precox. Pers. — COMMUN. — <i>Localités</i> , bords des chemins herbus, champs de Luzerne. — St-Amand, Bassuet, etc. — Printemps et Été.
23.	PHOLIOTA.	Attenuatus. D. C. — PEU COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , PIVOULADE. — <i>Localité</i> , sur troncs de Peuplier coupés à ras de terre, St-Amand, St-Lumier.
24.	PHOLIOTA.	Cylindraceus. D. C. — COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , PIVOULADE, sur vieux troncs de Sureaux. — St-Amand, St-Lumier. — Automne.
25.	PHOLIOTA.	Mutabilis. Scheff. — TRÈS COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , AGARIC DES TRONCS. — <i>Localités</i> , dans tous pays, sur les vieux troncs coupés près de terre. — Été-Automne.
26.	PSALLIOTA.	Arvensis. Scheff. — TRÈS COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , CHAMPIGNON DE COUCHE. — <i>Localités</i> , Jardins, tas de fumier, de terreau. — Partout. — Été-Automne.
27.	PSALLIOTA.	Campestris. Lin. — COMMUN. — Se trouvent ici représentées les variétés Vaporarius et Cryptarum . — <i>Habitat</i> , autour des granges et des bergeries, et après les murs des

- pestris.** — *Habitat.* Decombres, detritus des jardins, voisinage des habitations. — Automne. — Pargny-sur-Saulx.
29. **PSALLIOTA.** **Sylvatica.** *Scheff.* — ASSEZ COMMUN. — *Habitat.* Forêts ombragées, Sermaize, Charmont, etc. — Été-Automne.
30. **COPRINUS.** **Comatus.** *Batt.* — TRÈS COMMUN. — Espèce très fragile et fugace. — Comestible très jeune, avant son épanouissement, lieux herbus, azotes, bords des routes. — Automne.
31. **COPRINUS.** **Ovatus.** *Scheff.* — RARE. — Voisin du précédent, mais de forme ovoïde. — *Habitat.* champs nouvellement fumés. — St-Amand. — Mêmes précautions à prendre.
32. **COPRINUS.** **Sterquilinus.** *Fr.* — COMMUN. — Moins robuste et encore plus fragile que les espèces précédentes, habite les jardins, les couches nouvelles. — St-Amand, etc. — Automne.
33. **CORTINARIUS.** **Violaceus.** *L.* — PEU COMMUN. — Habite les grandes forêts, sous les buissons de Houx. — Cheminon. — Automne.
34. **CORTINARIUS.** **Cinereo-Violaceus.** *Pers.* — COMMUN. — *Habitat.* Forêts de Sermaize. Charmont, Epernay. — Été-Automne.
35. **GOMPHIDIUS.** **Glutinosus.** *Scheff.* — TRÈS COMMUN. — Dans les bois et forêts de Pins sylvestres. — Partout. — Automne.
36. **GOMPHIDIUS.** **Viscidus.** *Lin.* — RARE. — Plantations de *Picea*. — Ablancourt. — Automne.
37. **PAXILLUS.** **Involutus.** *Batsch.* — COMMUN. — *Habitat.* bords des chemins, des champs. — St-Amand, La Chaussée, Vavray, etc. — Automne.
38. **PAXILLUS.** **Leptopus.** *Fries.* — PLUS RARE. — Habite les forêts de Sermaize, Charmont. Vavray, etc. — Automne.
39. **HYGROPHORUS.** **Virgineus.** *Wulf.* — COMMUN. — Collines herbues, bords des bois, prairies. — Automne.

- | N ^o
D'ORDRE | GENRES | ESPÈCES |
|---------------------------|---------------------|---|
| 40. | HYGROPHORUS. | Niveus. — COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , AGARIC DES BRUYÈRES. — Bois de Pins, lieux herbus des collines. — Soulanges, St-Amand, Bassu, etc. — Automne. |
| 41. | LACTARIUS. | Controversus. Pers. — Assez COMMUN. — <i>Habitat</i> . Forêts de Sermaize, Vanault-le-Châtel, Charmont. — Été-Automne. — <i>Noms vulgaires</i> , LATYRON, ROUSSETTE. |
| 42. | LACTARIUS. | Piperatus. L. — COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , AUBURON VACHE BLANCHE. — <i>Habitat</i> , toutes les forêts du département. — Été-Automne. |
| 43. | LACTARIUS. | Volemus. Pers. — COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , VEAU, ROUGEOLE A LAIT DOUX. — <i>Habitat</i> , dans les forêts de Sermaize, Vanault-les-Dames. — Été-Automne. |
| 44. | LACTARIUS. | Deliciosus. L. — PEU COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , AGARIC DÉLICIEUX. — <i>Habitat</i> , dans les forêts. — St-Amand, Soulanges, Sermaize, etc. — Automne. |
| 45. | LACTARIUS. | Subdulcis. Bull. — Très COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , AGARIC DOUCE-ATRE. — Sur la mousse, au pied des Chênes dans les forêts. — Partout. — Été-Automne. |
| 46. | RUSSULA. | Virescens. Schæff. — Assez COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , VERDET, VERT BONNET. — <i>Habitat</i> , Forêts de Sermaize, Vanault, Charmont, etc. — Été-Automne. |
| 47. | RUSSULA. | Rosacea. Fries. — Assez COMMUN. — <i>Habitat</i> , bois de Pins à Aulnay-l'Aître. — Automne. |
| 48. | RUSSULA. | Cyanoxantha. Schæff. — COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , CHARBONNIER. — <i>Habitat</i> . Bois de Charmont, Vanault, Sermaize, etc. — Été-Automne. |
| 49. | RUSSULA. | Aurata. Fr. — PEU COMMUN. — Bois de Sermaize et de la montagne de |

50. RUSSULA. { **Integra.** Fr. TRÈS COMMUN. — *Nom vulgaire*, CUL ROUGE. — *Habitat*, Bois de Charmont, Cheminon, Maurupt, etc. — Été-Automne.
51. RUSSULA. { **Alutacea.** *Roques.*
52. RUSSULA. **Lactea.** Pers. — RARE. — *Habitat*, Bois des terrains sablonneux et siliceux. — Août. — Montagne de Reims, Trois-Fontaines.
53. CANTHARELLUS. **Lepida.** Fries. — ASSEZ RARE. — *Habitat*, Bois de Pins à Aulnay-l'Attre, Forêt de Sermaize. — Automne.
54. BOLETUS. **Cantharellus.** Lin. — TRÈS COMMUN. — *Noms vulgaires*, CHANTERELLE, GIROLE, JAUNORTE. — *Habitat*, dans toutes les forêts du Département. — Fin de l'Été, Automne.
55. BOLETUS. **Luteus.** Lin. — TRÈS COMMUN. — *Nom vulgaire*, BOLET ANNULAIRE. — *Habitat*, plantations de Pins sylvestres. — Dans tout l'arrondissement de Vitry. — Automne.
56. BOLETUS. **Granulatus.** Lin. — TRÈS COMMUN. — *Habitat*, Plantations de Pins. — Sans anneau. — Disposé en cercles. — Mêmes localités que le précédent. — Automne.
57. BOLETUS. **Badius.** Fries. — PEU COMMUN. — *Habitat*, Forêts de Sermaize, de Reims, lieux sablonneux et siliceux. — Été-Automne.
58. BOLETUS. **Subtomentosus.** L. — ASSEZ COMMUN. — *Habitat*, Forêts de Trois-Fontaines, Charmont, Vanault, etc. — Été-Automne.
59. BOLETUS. **Variegatus.** Sow. — ASSEZ COMMUN. — *Habitat*, Bois de Pins, taillis. — St-Amand. Soulanges, Vavray. — Automne.
60. BOLETUS. **Edulis.** Bull. — TRÈS COMMUN. — *Noms vulgaires*, CÈPE, BRUGUET, POLONAIS. — *Habitat*, les forêts de tout le Département. — Été-Automne.
61. BOLETUS. **Reticulatus.** Boud. — PEU COMMUN. — *Noms vulgaires*, confondu avec le précédent, porte les mêmes noms. — Forêts de Charmont, Vanault-les-Dames, etc. — Automne.
62. BOLETUS. **Scaber.** Fr. — TRÈS COMMUN. — *Noms vulgaires*, ROUSSELE, GYROLE. — *Habitat*, forêts du Département. — Bois et taillis les avoisinant. — Été-Automne.

- | N ^o
D'ORDRE | GENRES | ESPÈCES |
|---------------------------|-------------------|---|
| 62. | BOLETUS. | Aurantiacus. <i>Fr.</i> — TRÈS COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , ROUSSILE, GIROLE ROUGE. — Mêmes localités que le précédent. |
| 63. | POLYPORUS. | Squamosus. <i>Huds.</i> — ASSEZ COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , MIELLIN. OREILLE DE NOYER. — <i>Habitat</i> , sur les troncs languissants des Noyers. — Été-Automne. |
| 64. | POLYPORUS. | Umbellatus. <i>Fr.</i> — ASSEZ RARE. — <i>Nom vulgaire</i> , EICHASE. — <i>Habitat</i> . Forêt de Sermaize, dans les bois de haute futaie, au pied des Chênes. — Automne, temps pluvieux. |
| 65. | POLYPORUS. | Intybaceus. <i>Fr.</i> — ASSEZ RARE. — <i>Noms vulgaires</i> , POULE DE BOIS, COUVEUSE. COUILLIER EN BOUQUET. — <i>Habitat</i> , forêts de Chênes. — Automne humide. — St-Remy-en-Bouzemont. |
| 66. | POLYPORUS. | Sulfureus. <i>Bull.</i> — PEU COMMUN. — <i>Habitat</i> , croît sur les troncs de Saule. de Cerisier. — Aulnay-l'Aître, Vitry-le-François, Soulanges. — Automne, fin de l'Été. |
| 67. | FISTULINA. | Hepatica. <i>Schaff.</i> — PEU COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , LANGUE DE BŒUF. — <i>Habitat</i> , Croît dans les cicatrices des vieux Chênes. — Epernay, Cheminon. — Été-Automne. |
| 68. | HYDNUM. | Repandum. <i>L.</i> — TRÈS COMMUN. — <i>Noms vulgaires</i> , RIGNOCHÉ, PIED DE MOULTON, BARBE DE CHÈVRE. — <i>Habitat</i> , dans toutes les forêts, autour des Chênes. — Automne. |
| 69. | HYDNUM. | Imbricatum. <i>L.</i> — PEU COMMUN. — <i>Nom vulgaire</i> , CHEVROTINE ÉCAILLEUSE. — <i>Habitat</i> , forêt de Trois-Fontaines. — Lieux humides. — Automne. |
| 70. | HYDNUM. | Erinaceum. <i>Bull.</i> — RARE. — <i>Noms vulgaires</i> , HÉRISSE, HOUPPE DES ARBRES. — <i>Habitat</i> , sur les vieux troncs de Noyers vivants, Bassu, Bassuet. — Hiver. |

71. **HYDNUM.** **Coralloides.** Scop. — TRÈS RARE. — *Nom vulgaire*, CORAIL. — *Habitat*, St-Quentin-les-Marais, sur un vieux tronc de Noyer abattu. — Automne, Hiver; temps humide.
72. **CRATERELLUS.** **Cornucopioides.** L. — COMMUN. — *Nom vulgaire*, TROMPETTE DES MORTS. — *Habitat*, lieux couverts des forêts de Sernaize, Charmont, Reims, etc. — Automne.
73. **CLAVARIA.** **Flava.** Fr. — RARE. — *Habitat*, Forêt de Sernaize à Trois-Fontaines. — Automne.
74. **CLAVARIA.** **Botrytis.** Pers. — ASSEZ COMMUN. — *Nom vulgaire*, MAINOTTE ROSE. — *Habitat*, Forêts de Cheminon, de Sernaize, Vanault, etc. — Automne.
75. **CLAVARIA.** **Amethystea.** Bull. — ASSEZ RARE. — *Nom vulgaire*, MAINOTTE VIOLETTE. — *Habitat*, Forêt de Sernaize. Charmont. — Automne.
76. **CLAVARIA.** **Aurea.** Schæff. — COMMUN. — *Noms vulgaires*, TRIPETTE, MAINOTTE JAUNE. — *Habitat*, Forêts du Département. — Automne.
77. **CLAVARIA.** **Cinerea.** Bull. — COMMUN. — *Nom vulgaire*, MAINOTTE GRISE. — *Habitat*, mêmes localités. — Automne.
78. **CLAVARIA.** **Formosa.** Pers. — ASSEZ COMMUN. — *Habitat*, Forêts de Cheminon, de Charmont, Vanault. — Automne.
79. **MORCHELLA.** 1 **Esculenta.** Witt. — COMMUNE. — *Nom vulgaire*, MORILLE. — *Habitat*, Bois, bosquets, taillis.
2 **Villatica.** — PEU COMMUN. — Plantations de Pins. — St-Amand, Soulanges, Courtisols. — Printemps.
3 **Pineticola.** B. — ASSEZ COMMUN. — La Var. **Villatica** croît dans les bois de St-Amand, ainsi que la Var. **Semilibera**
4 **Semilibera.** D. C. — COMMUN. — de 15 jours plus tardive.
80. **HELVELLA.** **Crispa.** Fr. — COMMUN. — *Habitat*, Bois, taillis, plantations de Pins. — Jardins. — Partout. — Printemps et Été. — Les variétés blanches et brunes réunies.

N ^o D'ORDRE	GENRES	ESPÈCES
81.	HELVELLA.	Lacunosa. Fr. — ASSEZ COMMUN. — <i>Habitat</i> , Plantations de Pins sylvestres sur les collines de Bayarne; Francheville, etc. — Été-Automne.
82.	HELVELLA.	Elastica. Bull. — ASSEZ COMMUN. — <i>Habitat</i> , lieux humides des bois et forêts. — St-Amand, Sermaize, Charmont. — Fin du Printemps, Été.
83.	VERPA.	Digitaliformis. Pers. — ASSEZ RARE. — <i>Habitat</i> , Bois, taillis, broussailles. — Soulanges, St-Amand. — Printemps.
84.	PEZIZA.	Acetabulum. L. — ASSEZ COMMUN. — <i>Habitat</i> , sur la terre des bois frais, ombragés. — St-Amand, St-Lumier. — Printemps.
85.	PEZIZA.	Venosa. Pers. — ASSEZ COMMUN. — <i>Habitat</i> , Bois-taillis, parcs, jardins. — Aulnay-l'Aître, St-Amand, St-Lumier. — Printemps.
86.	PEZIZA.	Corona. Jacq. — ASSEZ RARE. — <i>Habitat</i> , Plantations de Pins. — Aulnay-l'Aître, Francheville. — Printemps.
87.	LYCOPERDON.	Giganteum. (Globaria). Rotsch. — RARE. — <i>Habitat</i> , Dans les plaines de Châlons-sur-Marne. — Récolté par M. Royer. — Automne. — <i>Nom vulgaire</i> , GRANDE VESSE DE LOUP.
88.	LYCOPERDON.	Hirtum (Utraria.) Batsch. — COMMUN. — <i>Habitat</i> , Forêts du Département, au pied des Chênes. — Été-Automne. — <i>Nom vulgaire</i> , VESSE DE LOUP.
89.	TUBER.	Cibarium. Sibth. — RARE. — <i>Nom vulgaire</i> , TRUFFE. — <i>Habitat</i> , bois de Verzy, Verzenay, sous les Chênes, là très abondant. Novembre-Février.
90.	TUBER.	Borchii. Cord. — RARE. — <i>Habitat</i> , mêmes localités et sous les Peupliers — Vitry-le-François.
91.	TUBER.	Mesentericum. Cord. — RARE. — <i>Habitat</i> , lieux sablonneux de la montagne de Reims. — Octobre.

LISTE
DES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX ET SUSPECTS
DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE.

LISTE DES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX ET SUSPECTS

DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE.

N^o
D'ORDRE GENRES ESPÈCES

1. **AMANITA.**
Phalloides *Fries.* — COMMUN. — **V.** — *Nom vulgaire*, ORONGE CIGUE. — *Localités*, Bois et forêts de Chênes, de Charmes et de Hêtres. — Sermaize, Charmont. — Forêt d'Épernay à Reims. etc. — Automne.

2. **AMANITA.**
Verna. *Fries.* — RARE. — **V.** — *Nom vulgaire*, ORONGE PRINTANIÈRE. — *Localités*, Bois de Maurupt, Trois-Fontaines. — Mai-Juin.

3. **AMANITA.**
Spissa. *Fries.* — ASSEZ RARE. — **S.** — *Nom vulgaire*, ORONGE PERLÉE. — *Localités*, Bois et Forêts à sol siliceux. — Epernay, Verzy. — Automne.

4. **AMANITA.**
Mappa. *Fries.* — COMMUN. — **V.** — *Nom vulgaire*, ORONGE CIGUE. — *Localités*, Forêts de toute essence. — Charmont, Sermaize, Reims. — Été-Automne.

5. **AMANITA.**
Muscaria. *L.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — *Nom vulgaire*, FAUSSE ORONGE. — *Localités*, Lieux ombragés et humides des forêts du Département. — Fin de l'Été, Automne.

6. **AMANITA.**
Pantherina. *D. C.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — *Noms vulgaires*, GOMMELE et FAUSSE GOMMELE. — *Localités*, Forêts de Charmont, Trois-Fontaines, etc. — Fin de l'Été, Automne.

7. **LEPIOTA.**
Clypeolaria. *Bull.* — ASSEZ COMMUN. — **S.** — *Nom vulgaire*, COULEMELE D'EAU. — *Localités*, Lieux ombragés et humides des forêts. — Cheminon, Sermaize, etc. — Automne.

8. **LEFIOIA.** **Cristata.** *Bull.* L'EU COMMUN. — **S.** — *Localités*, Bois et taillis. — Soulanges, Sermaize, etc. — Fin de l'Été, Automne.
9. **TRICHOLOMA.** **Saponaceum.** *Fries.* — ASSEZ COMMUN. — **S.** — *Localités*, Forêts de Vanault, Charmont, Sermaize, hautes futaies, bords des tranchées. — Automne.
10. **TRICHOLOMA.** **Sulfureum.** *Bull.* — COMMUN. — **V.** — *Localités*, Forêts de Cheminon, Vanault, St-Remy-en-Bouzemont, etc. — Dans les taillis et autour des Chênes. — Fin de l'Été, Automne.
11. **TRICHOLOMA.** **Bufoium.** *Fries.* — ASSEZ RARE. — **S.** — *Localités*. Forêts de Vanault, Cheminon, etc. — Automne, Fin de l'Été.
12. **TRICHOLOMA.** **Album.** *Fries.* — ASSEZ RARE. — **S.** — *Localités*, Bois de Charmont. — Automne.
13. **CLITOCYBE.** **Nebularis.** *Batsch.* — PEU COMMUN. — **S.** — *Localités*, Bois de Trois-Fon-
taines, Charmont. — Automne.
14. **COLLYBIA.** **Dryophila.** *Bull.* — TRÈS COMMUN. — **S.** — *Localités*, dans les forêts du
Département et les plantations de Pins, sur les
feuilles et dans la mousse. — Automne.
15. **PLEUROTUS.** **Geogenius.** *Fries.* — TRÈS RARE. — **S.** — *Localités*, Soulanges, chemins her-
bus, le long des bois de Sapins. — Fin de l'Été.
16. **PLUTEUS.** **Cervinus.** *Scheff.* — COMMUN. — **S.** — *Localités*, Forêts de Cheminon, Char-
mont, Vanault-les-Dames, etc. — Principalement
sur les sciures de bois. — Automne.
17. **ENTOLOMA.** **Lividum.** *Bull.* ASSEZ COMMUN. **V.** — *Localités*, Forêts de Sermaize, Char-
mont, Reims, etc. — Été-Automne.
18. **INOCYBE.** **Rimosa.** *Bull.* — TRÈS COMMUN. — **V.** *Localités*, Dans tous les bois et
forêts, notamment dans les plantations de Pins. —
Automne.
19. **HEBELOMA.** **Crustuliniformis.** *Bull.* — TRÈS COMMUN. — **V.** — *Nom vulgaire*, ECHAUDÉ,
— *Localités*, Forêts et surtout dans les bois de
Pins où il croît en cercles. — Automne.

- | N ^o
D'ORDRE | GENRES | ESPÈCES |
|---------------------------|--------------|---|
| 20. | HEBELOMA. | Elatum. <i>Batsch.</i> — RARE. — V. — <i>Localités.</i> Bois de Vavray-le-Petit, Vanault-les-Dames, etc. — Été-Automne. |
| 21. | FLAMMULA. | Carbonaria. <i>Fries.</i> — ASSEZ COMMUN. — S. — <i>Localités.</i> Forêts. — Lieux où l'on a fait du charbon. — Vanault, Charmont, etc. — Automne. |
| 22. | FLAMMULA. | Conissans. <i>Fries.</i> — TRÈS COMMUN. — V. — <i>Localités.</i> Dans tous les bois sur les troncs coupés, les racines superficielles, les palissades. — Automne. |
| 23. | VOLVARIA. | Pusilla. <i>Fries.</i> — PEU COMMUN. — V. — <i>Localités.</i> Lieux herbus et humides, Gazons des parcs, prairies, jardins. — La Chaussée, St-Lumier, etc. — Automne. |
| 24. | VOLVARIA. | Speciosa. <i>Fries.</i> — PEU COMMUN. — V. — <i>Localités.</i> Solitaire sur les détritès des jardins, les décombres. — Ponthion, Favresse, St-Quentin. — Été. |
| 25. | VOLVARIA. | Gloiocephala. <i>Fries.</i> — ASSEZ RARE. — V. — <i>Localités.</i> Vanault-les-Dames. — Bords des routes, dans les bois, sur les sciures en tas. — Été-Automne. |
| 26. | STROPHARIA. | Æruginosa. <i>Curt.</i> — COMMUN. — V. — <i>Localités.</i> Dans tous les bois et les plantations de Pins; sur la mousse et l'herbe fraîche. — Été-Automne. |
| 27. | STROPHARIA. | Semiglobata. <i>Botsch.</i> — ASSEZ COMMUN. — V. — <i>Localités.</i> Sur le crottin de cheval en plein air. — St-Amand, Francheville, Soulanges, etc. — Été-Automne. |
| 28. | HYGROPHORUS. | Conicus. <i>Scop.</i> — TRÈS COMMUN. — V. — <i>Localités.</i> Collines herbes, sapinières, vergers, prairies. — Partout. — Automne. |

29. **LACTARIUS.** *Terminosus.* *Schoeff.* — ASSEZ COMMUN. — **S.** — *Noms vulgaires.* MORTON. RAFFOU. — *Localités.* Bois, taillis, broussailles, sapinières. — St-Amand, Aulnay, etc. — Automne.
30. **LACTARIUS.** *Zonarius.* *Bull.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — *Localités.* Allées des forêts. — Charmont, Vanault-les-Dames, Vavray, etc. — Automne.
31. (AZONITES). **Lact. Azonites.** *Bull.* — COMMUN. — **V.** — *Localités.* Forêts de Sermaize, Charmont, St-Remy-en-Bouzemont, etc. — Automne. — Bords des bois herbus.
32. **LACTARIUS.** *Pyrogalus.* *Bull.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — *Localités.* Dans les forêts, sous les chênes. — Charmont, Sermaize, Vanault, etc. — Automne. — Fin de l'Été.
33. **LACTARIUS.** *Theiogalus.* *Bull.* — ASSEZ COMMUN. — **S.** — *Localités.* Forêts de Cheminon, Possesse, Sermaize. — Automne, Été.
34. **LACTARIUS.** *Blennius.* *Kromb.* — COMMUN. — **S.** — *Localités.* Bois de la montagne de Reims, St-Remy-en-Bouzemont, Cheminon, etc. — Automne.
35. **RUSSULA.** *Nigricans.* *Bull.* — COMMUN. — **S.** — *Localités.* Forêts de Vanault. Charmont, Trois-Fontaines, Reims, etc. — Été-Automne.
36. **RUSSULA.** *Furcata.* *Fries.* — RARE. — **V.** — *Localités.* Bois de Charmont. Trois-Fontaines. — Été. — Peut être confondu avec le **CHARBONNIER.**
37. **RUSSULA.** *Sanguinea.* *B.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — *Localités.* Lieux humides des bois. — Cheminon, Possesse, etc. — Automne-Été.
38. **RUSSULA.** *Ochroleuca.* *Pers.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — *Localités.* Forêts de Sermaize, Vanault-les-Dames, Charmont, etc. — Été-Automne.
39. **RUSSULA.** *Fragilis.* *Pers.* — ASSEZ COMMUN. — **V.** — Forêt de Trois-Fontaines, Cheminon, Possesse. — Automne.

50. **BOLETUS.** **Pachypus.** *Fries.* — RARE. — **V.** *Localités.* Forêt de St-Remy-en-Bouze-
mont, Lieux humides. — Automne.
51. **BOLETUS.** **Felleus.** *Bull.* — ASSEZ RARE. — **V.** — *Localités.* Bois de Vavray, dans une
tranchée, Vanault-les-Dames, Francheville. — Fin
de l'Été.
52. **BOLETUS.** **Chrysantheron.** *B.* — ASSEZ RARE. — **S.** — *Localité.* Bois de Cheminon,
près l'Abbaye. — Automne.
53. **BOLETUS.** **Strobilaceus.** *Scop.* — RARE. — **S.** — *Localité.* Forêt de Cheminon à Mau-
rupt. — Automne. — Trouvé aussi à Sermaize.
54. **SCLERODERMA. Verrucosum.** *Bull.* — TRÈS COMMUN. — **V.** *Localités.* Bois taillis et forêts.
— Sermaize. Possesse, etc. — Été-Automne.
55. **ELAPHOMYCES.** { **Granulatus et** RARE. — **V.** *Localités.* Forêt de la montagne de Reims,
Variegatus. *Fr. et Lév.* Verzy, — Mémes lieux pour la Truffe. --
Automne-Printemps.

TABLE.

	Pages.
INTRODUCTION.....	I
CLASSIFICATION DES CHAMPIGNONS. — Disposition générale des familles suivie de planches repré- sentant les types principaux.....	4
ESSAI D'UNE CLASSIFICATION DES AGARICINÉES , E.Roze, tableaux et dessins à l'appui.....	49
CHAMPIGNONS : Hyméniés.....	25
— Péridiés.....	124
— Plasmodiophores.....	130
— Hypodermés.....	139
— Phycomycètes.....	173
— Asconémés.....	180
— Onigénés.....	181
— Cupulés.....	183
— Nucléés.....	229
— Spheropsidés.....	353
— Mélanconiés.....	400
— Hyphomycètes.....	441
— Mycelia Sterilia.....	493
— Exanthemata.....	498

LISTE ALPHABÉTIQUE DES GENRES AVEC LES DESSINS	
DES SPORES.....	501
SUPPLÉMENT AU CATALOGUE.....	544
CONTRIBUTION A LA FLORE MYCOLOGIQUE GÉNÉRALE.	555
LISTE DES CHAMPIGNONS RÉCOLTÉS DANS LES PAYS	
CIRCONVOISINS DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE.	561
CHAMPIGNONS ALIMENTAIRES.....	568
CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX ET SUSPECTS.....	578

E R R A T A .

Pages	Lig.	
59,	20,	Erinicea, <i>Lisez</i> : Erinacea.
100,	14,	vieux troncs, <i>Lisez</i> : sur les vieux troncs.
129,	11,	Leptoniasporus, <i>Lisez</i> : Leptoniæsporus.
131,	5,	anasthomosées, <i>Lisez</i> : anastomosées.
151,	26,	recouverts, <i>Lisez</i> : recouvertes.
196,	26,	Zimia, <i>Lisez</i> : Zinnia.
204,	3,	pourrissantes <i>Lisez</i> : pourrissants.
238,	9,	Zophia, <i>Lisez</i> : Zopfia.
277,	27,	Rhinchospora, <i>Lisez</i> : Rhynchospora.
373,	11,	Evonimus Europeus, <i>Lisez</i> : Evonymus Europæus
385.	22,	aculiformes, <i>Lisez</i> : Aculeiformes.
389,	7,	Porum, <i>Lisez</i> : Porrum.
431,	25,	Spirea, <i>Lisez</i> : Spiræa.
447,	11,	Dans lieux sombres, <i>Lisez</i> : dans les lieux sombres.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 067878741